


(12) 第2002-60351 (P2002-60351A)



(式中、スパーサーを介して医薬化合物が結合した薬物担体の部分を繰り返し単位として記載したが、この標記は便宜上かつ模式的なものであり、例6で得られる化合物がこの構成単位の単なる繰り返しからなる化合物であると解釈してはならない。他の化合物の類似の標記についても同様である。)

【0060】CM-デキストランポリアルコール水溶液(平均分子量300K、CM化度0.40、濃度 27.8 mg/ml) 33 mlに、例5で得た化合物120 mgおよび1-ヒドロキシベンゾトリアゾール (HOBtと略) 25 mgのメタノール溶液 (50 ml) を加え、次いで1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド・塩酸塩 (EDC) 35 mgを加えた後、反応液を1 N水酸化ナトリウム水溶液でpH 7.4付近に調整した。室温で2時間攪拌した後、EDC 35 mgを追加し、室温で更に20時間攪拌した。GPC分析(カラム: 東ソーTSK Ge1 PW-4000XL、溶離液: 20%アセトニトリル-0.1M酢酸ナトリウム水溶液 (pH 5)) で反応の終了を確認した後、反応液に1 N水酸化ナトリウムを加え、pH 11付近に調整し、1時間攪拌した後、バイオマックス-50膜を用いて脱塩、および低分子有機化合物を除去した。膜を通過しない残留溶液をミリポアフィルター (0.22 μm) で濾過した後、凍結乾燥して標記化合物802 mgを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を水: アセトニトリル=1:1 中での308 nmにおける吸光度に基づいて定量したところ5.5%であった。

【0061】例7
9H-フルオレン-9-イルメチル 13-((1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)-7-ベンジル-2,5,8,11-テトラオキソ-3,6,9,12-テトラアザトリデク-1-イルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Phe-Gly-AM-薬物(1)}
例1-2で得た化合物65 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Phe-OH 9

3 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物123 mgを得た。


$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.5-2.6 (m, 4 H), 2.61 (s, 3 H), 3.0-3.1 (m, 1 H), 3.18 (d, 2 H, $J = 7.8$ Hz), 3.2-3.3 (m, 5 H), 3.8-3.9 (m, 3 H), 3.9-4.0 (m, 5 H), 4.2-4.3 (m, 2 H), 4.4-4.5 (m, 3 H), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.7-4.9 (m, 3 H), 6.02 (dt, 1 H, $J = 15.9, 6.6$ Hz), 6.05 (s, 1 H), 6.25 (t, 1 H, $J = 8.3$ Hz), 6.3-6.4 (m, 3 H), 7.1-7.3 (m, 7 H), 7.38 (t, 2 H, $J = 7.3$ Hz), 7.5-7.6 (m, 2 H), 7.69 (s, 1 H), 7.73 (d, 2 H, $J = 7.3$ Hz)。

【0062】例8
2-((2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル)アミノ)-N-(2-[[[1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ)-2-オキソエチル)-3-フェニルプロパナミド {H-Gly-Gly-Phe-Gly-AM-薬物(1)}
例7で得た化合物 123 mgを用いて、例5と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物 71 mgを得た。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.5-2.6 (m, 4 H), 2.62 (s, 3 H), 3.17 (d, 2 H, $J = 7.8$ Hz), 3.2-3.3 (m, 7 H), 3.3-3.4 (m, 1 H), 3.8-3.9 (m, 2 H), 3.9-4.0 (m, 4 H), 4.2-4.3 (m, 2 H), 4.4-4.5 (m, 1 H), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.7-4.9 (m, 3 H), 6.02 (dt, 1 H, $J = 15.9, 6.6$ Hz), 6.09 (s, 1 H), 6.24 (t, 1 H, $J = 8.3$ Hz), 6.3-6.4 (m, 3 H), 7.1-7.3 (m, 5 H), 8.01 (s, 1 H)。

【0063】例9
CM-Dex-PA-Gly-Gly-Phe-Gly-AM-薬物(1)
【化6】

(13) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0064】例8で得た化合物130 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール862 mgと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物834 mgを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ5.8%であった。

【0065】例10

9H-フルオレン-9-イルメチル 13-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)-7-(sec-ブチル)-2,5,8,11-テトラオキソ-3,6,9,12-テトラアザトリデク-1-イルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Ile-Gly-AM-薬物(1)}

例1-2で得た化合物110 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Ile-OH 140 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物92 mgを得た。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) δ : 0.90 (t, 3 H, $J = 7.4$ Hz), 0.94 (d, 3 H, $J = 6.9$ Hz), 1.1-1.3 (m, 1 H), 1.5-1.6 (m, 1 H), 1.8-1.9 (m, 1 H), 2.64 (s, 3 H), 2.7-2.8 (m, 4 H), 3.19 (d, 2 H, $J = 7.8$ Hz), 3.2-3.3 (m, 4 H), 3.8-3.9 (m, 3 H), 3.9-4.0 (m, 3 H), 4.0-4.1 (m, 3 H), 4.2-4.3 (m, 3 H), 4.44 (d, 2H, $J = 6.6$ Hz), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.7-4.8 (m, 2 H), 4.7-4.9 (m, 3 H), 6.02 (dt, 1 H, $J = 15.9, 6.6$ Hz), 6.04 (s, 1 H), 6.26 (t, 1 H, $J = 8.3$ Hz), 6.36 (d, 2 H, $J = 8.3$ Hz), 6.37 (d, 1 H, $J = 15.9$ Hz), 7.2-7.3

(m, 2 H), 7.40 (t, 2 H, $J = 7.3$ Hz), 7.5-7.6 (m, 2 H), 7.73 (s, 1 H), 7.75 (d, 2 H, $J = 7.3$ Hz).

【0066】例11

2-([2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル]アミノ)-N-(2-[[[1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ)-2-オキソエチル)-3-メチルペンタナミド {H-Gly-Gly-Ile-Gly-AM-薬物(1)}

例10で得た化合物240 mgを用いて、例5と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物138 mgを得た。


$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) δ : 0.92 (t, 3 H, $J = 7.4$ Hz), 0.93 (d, 3 H, $J = 6.9$ Hz), 1.1-1.3 (m, 1 H), 1.5-1.6 (m, 1 H), 1.8-1.9 (m, 1 H), 2.62 (s, 3 H), 2.7-2.8 (m, 4 H), 3.19 (d, 2 H, $J = 7.8$ Hz), 3.2-3.3 (m, 4 H), 3.39 (d, 2H, $J = 1.0$ Hz), 3.8-4.0 (m, 6 H), 4.13 (d, 1 H, $J = 7.3$ Hz), 4.2-4.3 (m, 2 H), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.76 (d, 2 H, $J = 2.7$ Hz), 6.00 (dt, 1 H, $J = 15.9, 6.6$ Hz), 6.01 (s, 1 H), 6.26 (t, 1 H, $J = 8.3$ Hz), 6.37 (d, 2 H, $J = 8.3$ Hz), 6.38 (d, 1 H, $J = 15.9$ Hz), 7.1-7.2 (m, 1 H), 7.75 (s, 1 H).

【0067】例12

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Ile-Gly-AM-薬物(1)

【化7】

(14) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0068】例11で得た化合物138 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール987 mgと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物1.14 gを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ6.1%であった。

【0069】例13

9H-フルオレン-9-イルメチル 13-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)-7-イソプロピル-2,5,8,11-テトラオキソ-3,6,9,12-テトラアザトリデク-1-イルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Val-Gly-AM-薬物(1)}

例1-2で得た化合物190 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Val-OH 250 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物233 mgを得た。¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.98 (d, 6 H, J = 5.6 Hz), 2.1-2.2 (m, 1 H), 2.61 (s, 3 H), 2.7-2.8 (m, 4 H), 3.19 (d, 2 H, J = 7.8 Hz), 3.2-3.3 (m, 4 H), 3.8-3.9 (m, 4 H), 3.9-4.0 (m, 2 H), 4.0-4.1 (m, 3 H), 4.2-4.3 (m, 3 H), 4.43 (d, 2 H, J = 6.6 Hz), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.7-4.8 (m, 2 H), 6.03 (dt, 1H, J = 15.9, 6.6 Hz), 6.04 (s, 1 H), 6.26 (t, 1 H, J = 8.3 Hz), 6.38 (d, 2 H, J = 8.3 Hz), 6.39 (d, 1 H, J = 15.9 H

z), 7.27 (t, 2 H, J = 7.3 Hz), 7.39 (t, 2 H, J = 7.3 Hz), 7.58 (d, 2 H, J = 7.3 Hz), 7.73 (s, 1 H), 7.75 (d, 2 H, J = 7.3 Hz).

【0070】例14

2-([2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル]アミノ)-N-(2-[[[1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ)-2-オキソエチル)-3-メチルブタナミド {H-Gly-Gly-Val-Gly-AM-薬物(1)}

例13で得た化合物311 mgを用いて、例5と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物237 mgを得た。


¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.96 (d, 6 H, J = 5.6 Hz), 2.2-2.3 (m, 1 H), 2.62 (s, 3 H), 2.7-2.8 (m, 4 H), 3.17 (d, 2 H, J = 7.8 Hz), 3.2-3.3 (m, 4 H), 3.8-3.9 (m, 4 H), 3.9-4.0 (m, 2 H), 4.0-4.1 (m, 3 H), 4.2-4.3 (m, 2 H), 4.5-4.6 (m, 1 H), 4.7-4.8 (m, 1 H), 4.8-4.9 (m, 1 H), 5.0-5.1 (m, 1 H), 6.02 (dt, 1 H, J = 15.9, 6.6 Hz), 6.06 (s, 1 H), 6.24 (t, 1 H, J = 8.3 Hz), 6.3-6.4 (m, 3 H), 7.72 (s, 1 H).

【0071】例15

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Val-Gly-AM-薬物(1)

【化8】

(15) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0072】例14で得た化合物237 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール1.724 gと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物1.88 gを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ6.0%であった。

【0073】例16

9H-フルオレン-9-イルメチル (1S)-1-[(2-[[[1-(2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ]-2-オキソエチル)アミノ]カルボニル]-3-(メチルスルファニル)プロピルカルバメート {Fmoc-Met-Gly-AM-薬物(1)}

例1-2で得た化合物100 mgおよびFmoc-Met-OH 131 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物196 mgを得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ: 1.92-2.22 (m, 5 H), 2.52-2.58 (m, 2 H), 2.61 (s, 3 H), 2.73-2.75 (m, 4 H), 3.21-3.28 (m, 6 H), 3.74-5.08 (m, 13 H), 6.01-6.07 (m, 3 H), 6.24 (tt, 1 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.36 (dd, 2 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.40 (d, 1 H, J = 16.1 Hz), 7.27-7.29 (m, 2H), 7.37 (t, 2 H, J = 7.6 Hz), 7.54 (d, 2 H, J = 7.6 Hz), 7.70 (d, 2 H, J = 7.6 Hz), 7.75 (s, 1 H).

【0074】例17

(2S)-2-アミノ-N-(2-[[[1-(2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ]-2-オキソエチル)-4-(メチルスルファニル)ブタナミド {H-Met-Gly-AM-薬物(1)}

例16で得た化合物196 mgを1,4-ジオキサン20 mlに溶解

し、ピペリジン2 ml, およびDMF 1 mlを加え、室温で30分間撹拌した。溶媒を留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム:メタノール:水 = 7 : 3 : 1の下層にて展開し、目的物を含む画分を濃縮することにより標記化合物117 mgを得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ: 1.80-1.89 (m, 1 H), 2.10 (s, 3 H), 2.17-2.21 (m, 1 H), 2.63-2.64 (m, 9 H), 3.18-3.24 (m, 6 H), 3.61-3.64 (m, 1H), 3.93-3.97 (m, 4 H), 4.23-4.27 (m, 2 H), 4.55-4.58 (m, 1 H), 4.76-4.78 (m, 2 H), 6.05(dt, 1 H, J = 15.9 Hz, 6.9 Hz), 6.10 (s, 1 H), 6.24 (dt, 1 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.36 (dd, 2 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.40 (d, 1 H, J = 16.9 Hz), 7.73 (s, 1 H).

【0075】例18

9H-フルオレン-9-イルメチル (7S)-13-([1-(2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)-7-[2-(メチルスルファニル)エチル]-2,5,8,11-テトラオキソ-3,6,9,12-テトラアザトリデク-1-イルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Met-Gly-AM-薬物(1)}

例17で得た化合物117 mgおよびFmoc-Gly-Gly-OH 118 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物182 mgを得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ: 1.92-2.22 (m, 5 H), 2.48-2.52 (m, 2 H), 2.55-2.68 (m, 7H), 3.21-3.28 (m, 6 H), 3.82-4.81 (m, 17 H), 5.98-6.05 (m, 3 H), 6.25 (dt, 1 H, J = 8.8 Hz, 1.9 Hz), 6.36 (dd, 2 H, J = 8.6 Hz, 1.9 Hz), 6.39 (d, 1 H, J = 17.1 Hz), 7.24-7.29 (m, 2H), 7.36 (t, 2 H, J = 7.3 Hz), 7.53(d, 2 H, J = 9.3 Hz), 7.70-7.73 (m, 3 H).

【0076】例19

(2S)-2-([2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル]アミ

(16) 第2002-60351 (P2002-60351A)

ノ)-N-(2-[[[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ)-2-オキシエチル)-4-(メチルスルファニル)ブタナミド {H-Gly-Gly-Met-Gly-AM-薬物(1)}

例18で得た化合物182 mgを用いて、例17と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物135 mgを得


た。

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$: 1.92-2.20 (m, 5 H), 2.45-2.70 (m, 9 H), 3.11-3.27 (m, 6H), 3.58-4.78 (m, 14 H), 5.94-6.07 (m, 3 H), 6.23 (t, 1 H, $J = 8.8 \text{ Hz}$), 6.33-6.36 (m, 3 H), 7.71 (s, 1 H)。

【0077】例20

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Met-Gly-AM-薬物(1)

【化9】



【0078】例19で得た化合物135 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール870 mgと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物956 mgを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ4.7%であった。

【0079】例21

tert-ブチル2-[[[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ)-2-オキシエチル(メチル)カルバメート {Boc-Sar-AM-薬物(1)}

例21-1

((2-[(tert-ブトキシカルボニル)(メチル)アミノ]アセチル)アミノ)メチル アセテート

Boc-ザルコシルシルグリシン4.11gおよび四酢酸鉛 {Pb(OAc)₄} 9.20 gを用いて、例1-1と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物3.20 gを得た。

$^1\text{H NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$: 1.47 (s, 9 H), 2.07 (s, 3 H), 2.93 (s, 3 H), 3.88 (brs, 2 H), 5.26 (d, 2 H, $J = 7 \text{ Hz}$)。

【0080】例21-2

tert-ブチル2-((1-(1-ベンズヒドリル-3-アゼチジニル)

オキシ]メチル]アミノ)-2-オキシエチル(メチル)カルバメート

1-ベンズヒドリル-3-アゼチジノール479 mgおよび例21-1で得た化合物520 mgを用いて、例1-3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物223 mgを得た。

$^1\text{H NMR}(\text{CDCl}_3) \delta$: 1.43 (s, 9 H), 2.86 (brs, 3 H), 2.91 (dd, 2 H, $J = 6 \text{ Hz}$, 9 Hz), 3.48 (dd, 2 H, $J = 7 \text{ Hz}$, 9 Hz), 3.82 (s, 2 H), 4.26 (m, 1 H), 4.33 (s, 1 H), 4.70 (d, 2 H, $J = 7 \text{ Hz}$), 7.15-7.40 (m, 10 H)。

【0081】例21-3

tert-ブチル2-[[[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ)-2-オキシエチル(メチル)カルバメート {Boc-Sar-AM-薬物(1)}

例21-2で得た化合物 223 mg (0.51 mmol)をエタノール50 mlに溶解させた後、10% パラジウム-炭素(50%含水)200 mgを加え、加圧下(5 kg/cm²)で16 時間接触水素添加を行った。不溶物を濾過により除き、濾液を濃縮乾固した後、残渣をジメチルホルムアミド20 mlに溶解させ、4-クロロ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピ

(17) 第2002-60351 (P2002-60351A)

ラゾール-1-イル)-2-ピリミジニルアミン183 mgおよびトリエチルアミン0.057 mlを加えた後、80℃で48時間攪拌した。反応液を減圧下で濃縮した後、得られた残渣をプレパラティブ薄層クロマトグラフィーに付し10% メタノール-クロロホルムの混合溶媒で展開することにより、標記化合物137 mgを得た。

¹H NMR(CDCl₃) δ: 1.47 (s, 9 H), 2.61-2.64 (m, 7 H), 2.96 (s, 3 H), 3.18(d, 2 H, J = 6.1 Hz), 3.21-3.24 (m, 4 H), 3.88 (s, 2 H), 3.95 (dd, 2 H, J = 9.8 Hz, 3.8 Hz), 4.24-4.28 (m, 2 H), 4.56-4.61 (m, 1 H), 4.74-4.79 (m, 4 H), 6.03 (dt, 1H, J = 15.9 Hz, 7.8 Hz), 6.11 (s, 1 H), 6.24 (dt, 1H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.35-6.39 (m, 3 H), 7.73 (s, 1 H).

【0082】例22

2-アミノ-N-[[[1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]-2-(メチルアミノ)アセトアミド {H-Sar-AM-薬物(1)}

例21-3で得た化合物137 mgに氷冷下、5% トリフルオロ酢酸-塩化メチレン溶液10 ml を加え、室温で1時間攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下で溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム:メタノール:水=20 : 3: 1の下層で展開し、目的物を含む画分を濃縮することにより、標記化合物58 mgを得た。

¹H NMR(CDCl₃) δ: 2.46 (s, 3 H), 2.48 (s, 3 H), 2.68-2.72 (m, 4 H), 3.18(d, 2 H, J = 6.1 Hz), 3.25-3.28 (m, 4 H), 3.34 (s, 2 H), 3.95-3.97 (m, 2H, J = 9.8 Hz, 3.8 Hz), 4.25-4.29 (m, 2 H), 4.58-4.72 (m, 1 H), 4.78 (d, 2 H, J = 8.3 Hz), 4.80-4.85 (m, 2 H), 6.05 (dt, 1H, J = 17.1 Hz, 7.5 Hz), 6.11 (s, 1 H), 6.26 (t, 1 H, J = 8.3 Hz), 6.35-6.42 (m, 3 H), 7.74 (s, 1 H).

【0083】例23

9H-フルオレン-9-イルメチル (7S)-13-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)- 7-ベンジル-9-メチル-8-メチレン-2,5,11-トリオキソ-3,6,9,12-テトラアザトリデク-1-イルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Phe-Sar-AM-薬物(1)}

例22で得た化合物58 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Phe-OH 100 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物43 mgを得た。

¹H NMR(CDCl₃) δ: 2.58-2.69 (m, 10 H), 3.08-3.25 (m, 8 H), 3.69-4.74 (m, 16 H), 5.97-6.07 (m, 2 H, C H=CHCH₂), 6.24 (t, 1 H, J = 8.6 Hz), 6.31-6.36 (m, 3 H), 7.16-7.73 (m, 9 H).

【0084】例24

2-アミノ-N-[2-[[[1S]-2-[[[2-[[[1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ]メチル]アミノ]-2-オキソエチル](メチル)アミノ]-1-ベンジル-2-プロペニル]アミノ)-2-オキソエチル]アセタミド {H-Gly-Gly-Phe-Sar-AM-薬物(1)}

例23で得た化合物43 mgをDMF 6 mlに溶解させ、ピペリジン4 mlを加え、室温で2日間攪拌した。減圧下で溶媒を留去した後、HPLC {カラム: CAPCELL PAK C18、溶離液: 40 % (1/2=MeOH/CH₃CN)/ 0.1% TFA水溶液、流速: 8 ml / min} を用いて精製することにより、標記化合物16 mgを得た。


¹H NMR(CDCl₃) δ: 2.61-2.64 (m, 7 H, Me), 2.79 (s, 3 H), 2.79-3.10 (m, 2H), 3.16-3.22 (m, 6 H), 3.40 (s, 2 H), 3.84-4.69 (m, 10 H), 4.78-4.80 (m, 2 H), 5.99-6.09 (m, 2 H), 6.24 (dt, 1 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.34-6.37 (m, 3 H), 7.71 (s, 1 H).

【0085】例25

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Phe-Sar-AM-薬物(1)

【化10】

(18) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0086】例24で得た化合物16 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール92 mgと結合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物103 mgを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ4.4%であった。

【0087】例26

tert-ブチル1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチルカルバメート {Boc-11e-AM-薬物(1)}

例26-1

((2-[(tert-ブトキシカルボニル)アミノ]-3-メチルベンタノイル)アミノ)メチルアセテート

Boc-イソロイシルグリシン4.26 g および四酢酸鉛 {Pb(OAc)₄} 8.14 gを用いて、例1-1と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物3.64 gを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.91 (t, 3 H, J = 7.3 Hz), 0.93 (d, 3 H, J = 6.8 Hz), 1.05-1.20 (m, 1 H), 1.35-1.55 (m, 1 H), 1.44 (s, 9 H), 1.85-2.00 (m, 1H), 2.06 (s, 3 H), 3.95-4.05 (m, 1 H), 4.95-5.05 (m, 1 H), 5.20-5.30 (m, 2 H), 7.00-7.10 (m, 1 H).

【0088】例26-2

tert-ブチル1-([[(1-ベンズヒドリル-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチルカルバメート

1-ベンズヒドリル-3-アゼチジノール1.08gおよび例26-1で得た化合物1.36gを用いて、例1-3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物690 mgを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.86 (t, 3 H, J = 7.3 Hz), 0.91 (d, 3 H, J = 6.8 Hz), 1.00-1.15 (m, 1 H), 1.30-1.50 (m, 1 H), 1.40 (s, 9 H), 1.80-1.95 (m, 1H), 2.91 (dd, 2 H, J = 9 Hz, 6 Hz), 3.47 (dd, 2 H, J = 9 Hz, 6 Hz), 3.91 (dd, 1 H, J = 9 Hz, 6 Hz), 4.24-4.30 (m, 1 H), 4.33 (s, 1 H), 4.66 (d, 2 H, J = 7 Hz), 4.90-5.00 (m, 1 H), 6.70-6.80 (m, 1 H), 7.10-7.40 (m, 10H).

【0089】例26-3

tert-ブチル1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチルカルバメート {Boc-11e-AM-薬物(1)}

例26-2で得た化合物335 gをエタノール20 mlに溶解させた後、10%パラジウム-炭素(50%含水) 300 mgを加え、加圧下(5kg/cm²)で20時間接触水素添加を行った。不溶物を濾過により除き、濾液を濃縮した後、残渣に酢酸エチルを加え1時間攪拌した。析出物を濾取した後、メタノール:クロロホルム(1:9)混合溶媒に溶解させ、飽和食塩水-飽和炭酸水素ナトリウム水溶液の混合溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、溶媒を減圧下で留去することにより、白色固体141 mgを得た。得られた固体141 mgおよび4-クロロ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-2-ピリミジニルアミン 199 mgをジメチルホルムアミド 10mlに溶解させ、トリエチルアミン0.063 mlを加えた後、80℃で36時間攪拌した。反応液を減圧下で濃縮した後、残渣をクロロホルムに溶解させ、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、次いで飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、減圧下で濃縮した後、残渣を

(19) 第2002-60351 (P2002-60351A)

シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、メタノール：クロロホルム（2：98）混合溶媒で展開し、目的物を含む画分を濃縮することにより、標記化合物205 mgを得た。

^1H NMR (CDCl_3) δ : 0.93 (t, 3 H, $J = 7.6$ Hz), 0.95 (d, 3 H, $J = 6.8$ Hz), 1.05-1.25 (m, 1 H), 1.40-1.60 (m, 1 H), 1.45 (s, 9 H), 1.90-2.00 (m, 1H), 2.63 (t, 4 H, $J = 5$ Hz), 2.65 (s, 3 H), 3.18 (d, 2 H, $J = 7$ Hz), 3.23 (t, 4 H, $J = 5$ Hz), 3.90-4.00 (m, 3 H), 4.20-4.30 (m, 2 H), 4.55-4.65 (m, 1 H), 4.70-4.85 (m, 4 H), 4.90-5.00 (m, 1 H), 6.03 (dt, 1 H, $J = 16$ Hz, 7 Hz), 6.12 (s, 1 H), 6.25 (tt, 1 H, $J = 9$ Hz, 2 Hz), 6.30-6.45 (m, 3 H), 6.75-6.85 (m, 1 H), 7.73 (s, 1 H).

【0090】例27

2-アミノ-N-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]-3-メチルペンタナミド {H-Ile-AM-薬物(1)}

例26-3で得た化合物481 mgを用いて例2と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより標記化合物307 mgを得た。

^1H NMR (CDCl_3) δ : 0.92 (t, 3 H, $J = 7.3$ Hz), 0.99 (d, 3 H, $J = 6.8$ Hz), 1.05-1.20 (m, 1 H), 1.25-1.45 (m, 1 H), 2.00-2.15 (m, 1 H), 2.63 (t, 4H, $J = 5$ Hz), 2.65 (s, 3 H), 3.18 (d, 2 H, $J = 7$ Hz), 3.23 (t, 4 H, $J = 5$ Hz), 3.90-4.00 (m, 2 H), 4.20-4.40 (m, 3 H), 4.55-4.65 (m, 1 H), 4.70-4.90 (m, 4 H), 6.03 (dt, 1 H, $J = 16$ Hz, 7 Hz), 6.11 (s, 1 H), 6.24 (tt, 1 H, $J = 9$ Hz, 2 Hz), 6.30-6.45 (m, 3 H), 7.74 (s, 1 H), 8.15-8.25 (m, 1 H).

【0091】例28

9H-フルオレン-9-イルメチル-2-([2-[(2S)-2-([1R,2R)-1-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチル]アミノ]カルボニル)ピロリジニル]-2-オキソエチル]アミノ)-2-オキソエチルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Pro-Ile-AM-薬物(1)}

例27で得た化合物303 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Pro-OH 219 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物368 mgを得た。 ^1H -NMR (CDCl_3) δ : 0.86-0.92 (m, 6 H), 1.10-2.18 (m, 7 H), 2.61-2.64 (m, 7H), 3.16-3.22 (m, 6 H), 3.48-3.53 (m, 1 H), 3.67-3.71 (m, 1 H), 3.82-4.31 (m, 10 H), 4.40 (t, 1 H, $J = 7.3$ Hz), 4.52-4.61 (m, 3 H), 4.80-4.89 (m, 4 H), 6.02 (dt, 1H, $J = 15.9$ Hz, 5.6 Hz), 6.12 (s, 1 H), 6.24 (t, 1 H, $J = 8.8$ Hz), 6.34-6.37 (m, 3 H), 7.28 (t, 2H, $J = 7.4$ Hz), 7.37 (t, 2H, $J = 7.4$ Hz), 7.52-7.57 (m, 2 H), 7.71-7.75 (m, 3 H).

【0092】例29

(2S)-1-[2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル]-N-([1R,2R)-1-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチル]-2-ピロリジンカルボキサミド {H-Gly-Gly-Pro-Ile-AM-薬物(1)}

例28で得た化合物368 mgを用いて、例17と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物178 mgを得た。


^1H -NMR (CDCl_3) δ : 0.86-0.92 (m, 6 H), 1.09-1.52 (m, 2 H), 1.98-2.21 (m, 5H), 2.61-2.64 (m, 7 H), 3.16-3.22 (m, 6 H), 3.38 (s, 2 H), 3.48-3.81 (m, 2 H), 3.78-3.94 (m, 4 H), 4.08-4.15 (m, 1 H), 4.17-4.25 (m, 2 H), 4.31 (t, 1 H, $J = 6.8$ Hz), 4.52-4.58 (m, 2 H), 4.68-4.88 (m, 2 H), 5.08-5.12 (m, 2 H), 6.02 (dt, 1H, $J = 15.9$ Hz, 5.8 Hz), 6.08 (s, 1 H), 6.24 (t, 1 H, $J = 8.8$ Hz), 6.34-6.37 (m, 3 H), 7.72 (s, 1 H).

【0093】例30

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Pro-Ile-AM-薬物(1)

【化11】

(20) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0094】例29で得た化合物178 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール1.18 gと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物1.34 gを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ7.3%であった。

【0095】例31

tert-ブチル1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-3-メチルブチルカルバメート {Boc-Leu-AM-薬物(1)}

例31-1

((2-[(tert-ブトキシカルボニル)アミノ]-4-メチルペンタノイル)アミノ)メチルアセテート

Boc-ロイシルグリシン10.95 g および四酢酸鉛 {Pb(OAc)₄} 20.9 gを用いて、例1-1と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物6.58 gを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.93 (d, 3 H, J = 6 Hz), 0.94 (d, 3 H, J = 6 Hz), 1.44 (s, 9 H), 1.40-1.75 (m, 3 H), 2.06 (s, 3 H), 4.05-4.15 (m, 1 H), 4.75-4.85 (m, 1 H), 5.20-5.30 (m, 2 H), 7.15-7.25 (m, 1 H)。

【0096】例31-2

tert-ブチル1-([[(1-ベンズヒドリル-3-アゼチジニルオキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-3-メチルブチルカルバメート

1-ベンズヒドリル-3-アゼチジノール3.38 gおよび例31-1で得た化合物2.68 gを用いて、例1-3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物1.20 gを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.89 (d, 3 H, J = 6 Hz), 0.90

(d, 3 H, J = 6 Hz), 1.35-1.50 (m, 1 H), 1.40 (s, 9 H), 2.90-2.95 (m, 2 H), 3.45-3.55 (m, 2 H), 4.00-4.10 (m, 1 H), 4.20-4.30 (m, 1 H), 4.33 (s, 1 H), 4.65-4.70 (m, 2 H), 4.70-4.80 (br, 1 H), 6.75-6.85 (m, 1 H), 7.10-7.50 (m, 10 H)。

【0097】例31-3

tert-ブチル1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-3-メチルブチルカルバメート {Boc-Leu-AM-薬物(1)}

例31-2で得た化合物1.20 gをエタノール50 mlに溶解させた後、10%パラジウム-炭素(50%含水) 600 mgを加え、加圧下(5kg/cm²)で20時間接触水素添加を行った。不溶物を濾過により除き、濾液を濃縮した後、残渣に酢酸エチルを加え、1時間攪拌した後、析出物を濾取することにより、白色固体490 mgを得た。得られた固体288 mgおよび4-クロロ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロベニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-2-ピリミジニルアミン326 mgをジメチルホルムアミド9 mlに溶解させ、トリエチルアミン0.153 mlを加えた後、80°Cで36時間攪拌した。反応液を減圧下で濃縮した後、残渣をクロロホルムに溶解させ、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、次いで飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、メタノール：クロロホルム(2:98)混合溶媒で展開し、目的物を含む画分を濃縮することにより、標記化合物327 mgを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.94 (d, 3 H, J = 6 Hz), 0.96 (d, 3 H, J = 6 Hz), 1.40-1.60 (m, 1 H), 1.49 (s, 9 H), 1.60-1.80 (m, 2 H), 2.60-2.70 (m, 4 H), 2.65

(21) 2002-60351 (P2002-60351A)

(s, 3 H), 3.19 (d, 2 H, J = 7 Hz), 3.24 (t, 4 H, J = 5 Hz, 3.90-4.00 (m, 2 H), 4.05-4.15 (m, 1 H), 4.20-4.30 (m, 2 H), 4.55-4.60 (m, 1 H), 4.70-4.90 (m, 5 H), 6.03 (dt, 1 H, J = 16 Hz, 7 Hz), 6.12 (s, 1 H), 6.25 (tt, 1 H, J = 9 Hz, 2 Hz), 6.35-6.40 (m, 2 H), 6.38 (d, 1 H, J = 16 Hz), 6.90-7.00 (m, 1 H), 7.73 (s, 1 H).

【0098】例32

2-アミノ-N-([1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]-4-メチルペンタナミド {H-Leu-AM-薬物(1)}

例31-3で得た化合物327 mgを用いて例2と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより標記化合物153 mgを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.95 (d, 3 H, J = 6 Hz), 0.99 (d, 3 H, J = 6 Hz), 1.30-1.50 (m, 1 H), 1.70-1.85 (m, 2 H), 2.60-2.70 (m, 4 H), 2.65 (s, 3 H), 3.19 (d, 2 H, J = 7 Hz), 3.20-3.30 (m, 4 H), 3.43 (dd, 1 H, J = 10 Hz, 3 Hz), 3.90-4.00 (m, 2 H), 4.20-4.30 (m, 2 H), 4.55-4.65 (m, 1 H), 4.70-4.90 (m, 4 H), 6.04 (dt, 1 H, J = 16 Hz, 7 Hz), 6.12 (s, 1 H), 6.24 (t, 1 H, J = 9 Hz), 6.30-6.45 (m, 3 H), 7.74 (s, 1 H), 8.10-8.25 (m, 1 H).

【0099】例33

9H-フルオレン-9-イルメチル-2-([2-[(2S)-2-([[(1S)-1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチル]アミノ]カルボニル)ピロリジニル]-2-オキソエチル]アミノ)-2-オキソエチルカルバメート {Fmoc-Gly-Gly-Pro-Leu-AM-薬物(1)}

例32で得た化合物208 mgおよびFmoc-Gly-Gly-Pro-OH 150 mgを用いて、例3と同様の反応、後処理、および精製を行うことにより、標記化合物228 mgを得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.88 (d, 3 H, J = 6.4 Hz), 0.93 (d, 3 H, J = 6.4 Hz), 1.58-1.85 (m, 3 H), 1.93-2.22 (m, 4 H), 2.58-2.67 (m, 7 H), 3.16-3.21 (m, 6 H), 3.53-3.68 (m, 2 H), 3.82-5.02 (m, 16 H), 5.99-6.08 (m, 3 H), 6.24 (t, 1 H, J = 8.8 Hz), 6.34-6.37 (m, 3 H), 7.24-7.28 (m, 2 H), 7.36 (t, 2 H, J = 7.6 Hz), 7.54 (d, 2 H, J = 7.6 Hz), 7.71 (s, 1 H), 7.72 (d, 2 H, J = 7.6 Hz).

【0100】例34

(2S)-1-[2-[(2-アミノアセチル)アミノ]アセチル]-N-[(1S)-1-([[(1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-5-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチジニル]オキシ)メチル]アミノ]カルボニル)-2-メチルブチル]-2-ピロリジンカルボキサミド {H-Gly-Gly-Pro-Leu-AM-薬物(1)}

例33で得た化合物228 mgを用いて、例17と同様の反応、および後処理を行うことにより、標記化合物140 mgを得た。


¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.90 (d, 3 H, J = 6.6 Hz), 0.95 (d, 3 H, J = 6.5 Hz), 1.58-1.85 (m, 3 H), 1.93-2.38 (m, 4 H), 2.61-2.63 (m, 7 H), 3.17-3.23 (m, 6 H), 3.30 (s, 2 H), 3.58 (dd, 1 H, J = 17.1 Hz, 7.5 Hz), 3.76 (dd, 1 H, J = 15.6 Hz, 5.6 Hz), 3.86-4.95 (m, 13 H), 6.03 (dt, 1 H, J = 15.9 Hz, 6.8 Hz), 6.09 (s, 1 H), 6.24 (tt, 1 H, J = 8.8 Hz, 2.2 Hz), 6.35-6.39 (m, 3 H), 7.72 (s, 1 H).

【0101】例35

CM-Dex-PA-Gly-Gly-Pro-Leu-AM-薬物(1)

【化12】

(22) 第2002-60351 (P2002-60351A)



【0102】例34で得た化合物140 mgを用いて、例6と同様の方法でCM-デキストランポリアルコール929 mgと縮合させた後、例6と同様の方法で後処理、精製および凍結乾燥を行うことにより、標記化合物986 mgを得た。本化合物の医薬化合物残基の含量を例6と同様の方法で定量したところ3.6%であった。

【0103】試験例1：DDS化合物からの医薬化合物の遊離

40℃のMeth Aホモジネート中、緩衝液中、または37℃のマウス血清中に被検化合物を溶解させ（500 μ g/ml）、20時間後に遊離された1-[2-アミノ-6-(4-[(E)-3-[4-(3,5-ジフルオロフェニル)-1-ピペラジニル]-1-プロペニル]-1H-ピラゾール-1-イル)-4-ピリミジニル]-3-アゼチ


ジノール（薬物(1)）を定量した。試験結果を表2に示す。試験を行った化合物は弱酸性のMeth Aホモジネート中でペプチド配列に依存した薬物遊離率を示し、弱酸性緩衝液中およびマウス血清中ではほとんど薬物を遊離しなかった。これに対して、比較化合物A：CM-Dex-PA-Ile-薬物(1)及び比較化合物B：CM-Dex-PA-Gly-Gly-Phe-Gly-PABC-薬物(1)（PABCはパラアミノベンジルオキシカルボニルリンカーを示す：Dubowchik, G.M., et al., J.B ioorg. Med. Chem. Lett., 8, 3347, 1998）は弱酸性緩衝液中およびマウス血清中で高い遊離率を示した。

【0104】


【化13】

(23) 冊2002-60351 (P2002-60351A)

比較化合物 A



比較化合物 B



【0105】

【表2】

化合物	Meth A細胞（pH 4.5）	緩衝液（pH 4.5）	マウス血清
例3の化合物	89 %	< 1 %	NT
例6の化合物	69 %	< 1 %	< 1 %
例9の化合物	77 %	< 1 %	< 1 %
例12の化合物	29 %	< 1 %	NT
例1bの化合物	41 %	< 1 %	NT
例20の化合物	7 %	< 1 %	NT
例35の化合物	3 %	< 1 %	NT
比較化合物A	NT	4 % (pH 7.0)	23 %
比較化合物B	NT	25 % (pH 7.0)	57 %

NT: 試験を実施しなかった。

【0106】試験例2：DDS化合物の抗腫瘍活性
Meth A細胞（Murine fibrosarcoma Meth A）をBALB/c系
マウスに移植してMeth A担癌マウスを作成し、移植後7

日に薬物を単回尾静脈内投与した。腫瘍の重量を21日
目に測定して、腫瘍増殖抑制効果と毒性を評価した。結
果を表3に示す。表中 * はダネット検定で有意差有り

(24) 第2002-60351 (P2002-60351A)

と判定された群を示し (** P<0.001, ** P0.01)、投与量は薬物(1)の無水遊離塩基の重量に換算して示した。また、IRは腫瘍の縮小率を示す。本発明のDDS化合物は用量依存的に腫瘍の縮小効果を発揮し、薬物(1)

自体を用いた場合に比べて副作用である下痢の発現が回避されていることが明らかである。

【0107】

【表3】

化合物	投与量 (mg/kg)	腫瘍重量 平均値 (g)	IR (%)	BWLmax ^a (%) [day]	下痢 [day]	N ^b
5% ケーロス	0	1.390±0.201		< 0	-	0/1
例9の 化合物	14.3	0.128±0.026***	88.8	17.9 [11]	-	0/1
	10	0.308±0.068***	73.2	7.3 [8]	-	0/7
	7	0.650±0.100	43.5	2.4 [8]	-	0/7
例35の 化合物	12	0.095±0.020***	92.0	7.3 [11]	-	1/7
	8.4	0.103±0.023***	91.4	< 0 [8]	-	0/7
	5.9	0.230±0.065***	80.7	< 0 [8]	-	0/7
薬物 (1)	12.2	0.094±0.021***	93.3	20.8 [10]	+ [8, 9]	4/7
	8.55	0.191±0.062***	86.3	10.6 [9]	+ [8, 9]	0/7
	5.99	0.610±0.167**	53.9	6.7 [8]	+ [8, 9]	0/1

^a: 最大体重減少率 (括弧内は最大減少が観察された日)

^b: 死亡したマウス/使用したマウス

【0108】

【発明の効果】本発明のDDS化合物は血清中での安定性に優れ、有効成分である医薬化合物を腫瘍部位などに

対して部位選択的に移行させることができ、その結果、副作用を低減できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	(参考)
A 6 1 P 35/00		A 6 1 P 35/00	
C 0 7 K 5/103	Z N A	C 0 7 K 5/103	Z N A
(72) 発明者 内藤 博之		F ターム (参考)	4C076 AA95 CC04 CC27 EE30 EE41 EE59 FF36
東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社東京研究開発センター内			4C086 AA01 AA02 AA03 BC42 GA07 MA03 MA05 MA07 MA08 NA05 NA06 NA13 ZB11 ZB26 4H045 AA30 BA13 EA22 EA28
(72) 発明者 廣谷 賢志			
東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社東京研究開発センター内			

J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2005-511627**(P2005-511627A)**(43) 公表日 **平成17年4月28日(2005. 4. 28)**(51) Int. Cl. ⁷

F 1

テーマコード (参考)

A 6 1 K 39/395

A 6 1 K 39/395

D

4 C 0 8 4

A 6 1 K 31/7088

A 6 1 K 39/395

C

4 C 0 8 5

A 6 1 K 38/00

A 6 1 K 39/395

L

4 C 0 8 6

A 6 1 K 48/00

A 6 1 K 39/395

N

A 6 1 P 1/16

A 6 1 K 31/7088

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 128 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-545264 (P2003-545264)
 (86) (22) 出願日 平成14年11月20日 (2002. 11. 20)
 (85) 翻訳文提出日 平成16年5月18日 (2004. 5. 18)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2002/037223
 (87) 国際公開番号 W02003/043583
 (87) 国際公開日 平成15年5月30日 (2003. 5. 30)
 (31) 優先権主張番号 60/331, 750
 (32) 優先日 平成13年11月20日 (2001. 11. 20)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 503188759
 シアトル ジェネティクス, インコーポレ
 ーテッド
 アメリカ合衆国 98021 ワシントン
 州, ボセル, エス. イー., 30ティーエ
 イチ ドライブ 21823
 (74) 代理人 100091096
 弁理士 平木 祐輔
 (74) 代理人 100096183
 弁理士 石井 貞次
 (74) 代理人 100118773
 弁理士 藤田 節

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 抗CD30抗体を使用する免疫学的疾患の治療

(57) 【要約】

本発明は、癌以外の免疫学的疾患の治療方法であって、CD30に結合し活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼす能力で特徴付けられたタンパク質を投与することを含む方法に関する。こうしたタンパク質には、モノクローナル抗体AC10およびHeFi1、AC10およびHeFi-1の誘導体、およびAC10およびHeFi-1とCD30への結合を競合する抗体が含まれる。他のこうしたタンパク質には、多価の抗CD30抗体および細胞傷害性薬剤とコンジュゲートした抗CD30抗体が含まれる。本発明の抗体による治療方法も提供される。

(2)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼす第1の抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を、治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項 2】

第1の抗体が、ヒト抗体、ヒト化抗体またはキメラ抗体である請求項1に記載の方法。

【請求項 3】

第1の抗体が、多価である請求項1に記載の方法。

10

【請求項 4】

第1の抗体が、CD30への結合についてモノクローナル抗体AC10またはHeFi-1と競合する請求項1に記載の方法。

【請求項 5】

第1の抗体が、細胞傷害性薬剤と結合せずに細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすことができる請求項1に記載の方法。

【請求項 6】

第1の抗体が、活性化リンパ球以外の細胞の不在下で細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすことができる請求項1に記載の方法。

【請求項 7】

第1の抗体が、単一特異性抗体として細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすことができる請求項1に記載の方法。

20

【請求項 8】

第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する薬剤の投与をさらに含む請求項1に記載の方法。

【請求項 9】

第2の抗体の投与をさらに含む請求項1に記載の方法。

【請求項 10】

第2の抗体が、活性化リンパ球上で発現した第2の受容体または受容体複合体を認識する請求項1に記載の方法。

30

【請求項 11】

第2の抗体が、第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項10に記載の方法。

【請求項 12】

第2の抗体が、活性化リンパ球にシグナルを送達することにより第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項11に記載の方法。

【請求項 13】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項10または11に記載の方法。

40

【請求項 14】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1またはICOSである請求項13に記載の方法。

【請求項 15】

TNF受容体スーパーファミリーメンバーが、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4、またはAPO-3である請求項1

50

(3)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

3 に記載の方法。

【請求項 16】

インテグリンが、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103 または CD104 である請求項 13 に記載の方法。

【請求項 17】

レクチンが、C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプのレクチンである請求項 13 に記載の方法。

【請求項 18】

第1の抗体が、二重特異性抗体である請求項 1 に記載の方法。

10

【請求項 19】

二重特異性抗体が、CD30、および活性化リンパ球上で発現した第2の受容体または受容体複合体、に結合する請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

第2の受容体または受容体複合体に結合する二重特異性抗体の部分が、CD30 に結合する二重特異性抗体の部分の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】

二重特異性抗体の第2の受容体または受容体複合体への結合が、活性化リンパ球にシグナルを送達することにより、CD30 に結合する二重特異性抗体の部分の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項 20 に記載の方法。

20

【請求項 22】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF 受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項 19 または 20 に記載の方法。

【請求項 23】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152 / CTLA-4、PD-1、またはICOS である請求項 22 に記載の方法。

30

【請求項 24】

TNF 受容体スーパーファミリーメンバーが、CD27、CD40、CD95 / Fas、CD134 / OX40、CD137 / 4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、APO2 / TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4 または APO-3 である請求項 22 に記載の方法。

【請求項 25】

インテグリンが、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103、または CD104 である請求項 22 に記載の方法。

40

【請求項 26】

レクチンが、C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプのレクチンである請求項 22 に記載の方法。

【請求項 27】

活性化リンパ球上で発現した受容体または受容体複合体に結合するリガンドを投与することをさらに含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 28】

リガンドが、第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項 27 に記載の方法。

【請求項 29】

50

(4)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

リガンドが、活性化リンパ球にシグナルを送達することにより、第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を増強する請求項28に記載の方法。

【請求項30】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項27または28に記載の方法。

【請求項31】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1またはICOSである請求項30に記載の方法。

10

【請求項32】

TNF受容体スーパーファミリーメンバーが、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4またはAPO-3である請求項30に記載の方法。

【請求項33】

インテグリンが、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103、またはCD104である請求項30に記載の方法。

20

【請求項34】

レクチンが、C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプのレクチンである請求項30に記載の方法。

【請求項35】

第1の抗体が、抗体ではない第2のタンパク質のアミノ酸配列を含む融合タンパク質である請求項1に記載の方法。

【請求項36】

第2のタンパク質が、第1の抗体に多価結合性を付与する請求項35に記載の方法。

【請求項37】

さらに免疫抑制剤の投与を含む請求項1、9、10、18または27に記載の方法。

30

【請求項38】

免疫抑制剤が、ガンシクロビル、エタナセプト、シクロスポリン、タクロリムスまたはラパマイシンである請求項37に記載の方法。

【請求項39】

免疫抑制剤が、アルキル化剤である請求項37に記載の方法。

【請求項40】

アルキル化剤が、シクロホスファミドである請求項39に記載の方法。

【請求項41】

免疫抑制剤が、代謝拮抗剤である請求項37に記載の方法。

40

【請求項42】

代謝拮抗剤が、プリンアンタゴニストである請求項41に記載の方法。

【請求項43】

プリンアンタゴニストが、アザチオプリンまたはミコフェノレートモフェチルである請求項42に記載の方法。

【請求項44】

代謝拮抗剤が、ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤である請求項41に記載の方法。

【請求項45】

ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤が、メトトレキサートである請求項44に記載の方法。

【請求項46】

50

(5)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

免疫抑制剤が、グルココルチコイドである請求項 37 に記載の方法。

【請求項 47】

グルココルチコイドが、コルチゾールまたはアルドステロンである請求項 46 に記載の方法。

【請求項 48】

免疫抑制剤が、グルココルチコイド類似体である請求項 37 に記載の方法。

【請求項 49】

グルココルチコイド類似体が、プレドニゾンまたはデキサメタゾンである請求項 48 に記載の方法。

【請求項 50】

免疫抑制剤が、抗炎症剤である請求項 37 に記載の方法。

【請求項 51】

抗炎症剤が、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リポキシゲナーゼ阻害剤またはロイコトリエン受容体アンタゴニストである請求項 50 に記載の方法。

【請求項 52】

第1の抗体が、細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 に記載の方法。

【請求項 53】

細胞傷害性薬剤が、エネジイン、レキシトロブシン、デュオカルマイシン、タキサン、ピューロマイシン、ドラスタチン、メイタンシノイド、DNA 副溝結合剤、DNA 副溝アルキル化剤およびピンカアルカロイドからなる群から選択される請求項 52 に記載の方法

。

【請求項 54】

細胞傷害性薬剤が、パクリタキセル、ドセタキセル、CC-1065、SN-38、トポテカン、モルホリノードキソルピシン、リゾキシシン、シアノモルホリノードキソルピシン、ドラスタチン-10、エキノマイシン、コンブレタスタチン、カリケアマイシン、メイタンシン、DM-1、オーリスタチンE、AEB、AEVB、AEFP、MMAEまたはネトロブシンである請求項 52 に記載の方法。

【請求項 55】

細胞傷害性薬剤が、抗チューブリン剤である請求項 52 に記載の方法。

【請求項 56】

細胞傷害性薬剤が、ピンカアルカロイド、ポドフィロトキシン、タキサン、バッカチン誘導体、クリプトフィシン、メイタンシノイド、コンブレタスタチンまたはドラスタチンである請求項 55 に記載の方法。

【請求項 57】

細胞傷害性薬剤が、ピンクリスチン、ピンブラスチン、ビンデシン、ピンオレルピン、VP-16、カンプトテシン、パクリタキセル、ドセタキセル、エピチロンA、エピチロンB、ノコダゾール、コルヒチン、コルチミド、エストラムスチン、セマドチン、ディスコデルモリド、メイタンシン、DM-1、オーリスタチンE、AEB、AEVB、AEFP、MMAEまたはエロイテロピンである請求項 55 に記載の方法。

【請求項 58】

細胞傷害性薬剤が、MMAEである請求項 52 に記載の方法。

【請求項 59】

細胞傷害性薬剤が、AEFPである請求項 52 に記載の方法。

【請求項 60】

第1の抗体が、ペプチドリナーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 52 に記載の方法。

【請求項 61】

第1の抗体が、val-citリンカーまたはphe-lysリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 52 に記載の方法。

【請求項 62】

10

20

30

40

50

(6)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

第1の抗体が、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項52に記載の方法。

【請求項63】

コンジュゲートがc A C 1 0 - v a l - c i t - M M A Eである請求項52に記載の方法。

【請求項64】

コンジュゲートがc A C 1 0 - v a l - c i t - A E F Pである請求項52に記載の方法。

【請求項65】

第1の抗体が、5.5未満のpHで加水分解可能なリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項52に記載の方法。 10

【請求項66】

リンカーが5.0未満のpHで加水分解可能である請求項65に記載の方法。

【請求項67】

リンカーが、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリンカーである請求項65に記載の方法。

【請求項68】

第1の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なリンカーによって細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項52に記載の方法。

【請求項69】

第1の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なペプチドリンカーによって細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項52に記載の方法。 20

【請求項70】

プロテアーゼが、膜結合プロテアーゼである請求項68に記載の方法。

【請求項71】

プロテアーゼが、細胞内プロテアーゼである請求項68に記載の方法。

【請求項72】

プロテアーゼが、エンドソームのプロテアーゼである請求項68に記載の方法。

【請求項73】

プロテアーゼが、リソソームのプロテアーゼである請求項68に記載の方法。 30

【請求項74】

第1の抗体が、モノクローナル抗体、キメラ抗体、ヒト抗体、ヒト化抗体、グリコシル化抗体、多重特異性抗体、1本鎖抗体、F a b 断片、F (a b ') 断片、F (a b ') ₂ 断片、F d、1本鎖F v、ジスルフィド連結F v、V_Lドメインを含む断片、C D 3 0 に特異的に結合するポリペプチド、またはV_Hドメインを含む断片である請求項52に記載の方法。

【請求項75】

第1の抗体が、免疫抑制剤にコンジュゲートされる請求項1に記載の方法。

【請求項76】

免疫抑制剤が、ガンシクロビル、エタナセプト、シクロスポリン、タクロリムスまたはラパマイシンである請求項75に記載の方法。 40

【請求項77】

免疫抑制剤が、アルキル化剤である請求項75に記載の方法。

【請求項78】

アルキル化剤が、シクロホスファミドである請求項77に記載の方法。

【請求項79】

免疫抑制剤が、代謝拮抗剤である請求項75に記載の方法。

【請求項80】

代謝拮抗剤が、プリンアンタゴニストである請求項79に記載の方法。

【請求項81】

50

(7)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

プリンアンタゴニストが、アザチオプリンまたはミコフェノレートモフェチルである請求項 8 0 に記載の方法。

【請求項 8 2】

代謝拮抗剤が、ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤である請求項 7 9 に記載の方法。

【請求項 8 3】

ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤が、メトトレキサートである請求項 8 2 に記載の方法。

【請求項 8 4】

免疫抑制剤が、グルココルチコイドである請求項 7 5 に記載の方法。

【請求項 8 5】

グルココルチコイドが、コルチゾールまたはアルドステロンである請求項 8 4 に記載の方法。 10

【請求項 8 6】

免疫抑制剤が、グルココルチコイド類似体である請求項 7 5 に記載の方法。

【請求項 8 7】

グルココルチコイド類似体が、プレドニゾンまたはデキサメタゾンである請求項 8 6 に記載の方法。

【請求項 8 8】

免疫抑制剤が、抗炎症剤である請求項 7 5 に記載の方法。

【請求項 8 9】

抗炎症剤が、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リボキシゲナーゼ阻害剤またはロイコトリエン受容体アンタゴニストである請求項 8 8 に記載の方法。 20

【請求項 9 0】

免疫学的疾患が、 T_h2 -リンパ球関連疾患である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9 1】

免疫学的疾患が、アトピー性皮膚炎、全身紅斑性狼瘡、アトピー性喘息、鼻結膜炎、アレルギー性鼻炎、オーメン症候群、全身性硬化症または慢性の移植片対宿主病である請求項 9 0 に記載の方法。

【請求項 9 2】

免疫学的疾患が、 T_h1 -リンパ球関連疾患である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9 3】

免疫学的疾患が、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、ショーグレン症候群、橋本甲状腺炎、グレイブ病、原発性胆汁性肝硬変、ウェゲナーの肉芽腫症、結核または急性移植片対宿主病である請求項 9 2 に記載の方法。 30

【請求項 9 4】

免疫学的疾患が、ウイルス感染に起因するものである請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9 5】

ウイルス感染が、エプスタイン-バーウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、ヒトT白血病ウイルス、B型肝炎ウイルスまたは麻疹ウイルスを含む請求項 9 4 に記載の方法。

【請求項 9 6】

免疫学的疾患が、活性化Bリンパ球に関連する疾患である請求項 1 に記載の方法。 40

【請求項 9 7】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)リンパ球においてCD30シグナル伝達を誘導する第1の抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項 9 8】

第1の抗体が、ヒト抗体、ヒト化抗体またはキメラ抗体である請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 9 9】

第1の抗体が、多価である請求項 9 7 に記載の方法。 50

(8)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【請求項 1 0 0】

第 1 の抗体が、C D 3 0 への結合についてモノクローナル抗体 A C 1 0 または H e F i - 1 と競合する請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 0 1】

第 1 の抗体は、リンパ球以外の細胞の不在下で C D 3 0 シグナル伝達を誘導することができる請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 0 2】

第 1 の抗体が、単一特異性抗体として C D 3 0 シグナル伝達を誘導することができる請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 0 3】

第 2 の抗体の投与をさらに含む請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 0 4】

第 2 の抗体が、活性化リンパ球上で発現した第 2 の受容体または受容体複合体を認識する請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 0 5】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、T N F 受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項 1 0 4 に記載の方法。

【請求項 1 0 6】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、C D 2、C D 3、C D 4、C D 8、C D 1 9、C D 2 2、C D 2 8、C D 7 9、C D 9 0、C D 1 5 2 / C T L A - 4、P D - 1 または I C O S である請求項 1 0 5 に記載の方法。

【請求項 1 0 7】

T N F 受容体スーパーファミリーメンバーが、C D 2 7、C D 4 0、C D 9 5 / F a s、C D 1 3 4 / O X 4 0、C D 1 3 7 / 4 - 1 B B、T N F - R 1、T N F R - 2、R A N K、T A C I、B C M A、オステオプロテゲリン、A p o 2 / T R A I L - R 1、T R A I L - R 2、T R A I L - R 3、T R A I L - R 4、または A P O - 3 である請求項 1 0 5 に記載の方法。

【請求項 1 0 8】

インテグリンが、C D 1 1 a、C D 1 1 b、C D 1 1 c、C D 1 8、C D 2 9、C D 4 1、C D 4 9 a、C D 4 9 b、C D 4 9 c、C D 4 9 d、C D 4 9 e、C D 4 9 f、C D 1 0 3 または C D 1 0 4 である請求項 1 0 5 に記載の方法。

【請求項 1 0 9】

レクチンが、C - タイプ、S - タイプまたは I - タイプのレクチンである請求項 1 0 5 に記載の方法。

【請求項 1 1 0】

第 1 の抗体が、二重特異性抗体である請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 1 1】

二重特異性抗体が、C D 3 0 および活性化リンパ球上で発現した第 2 の受容体または受容体複合体に結合する請求項 1 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 1 2】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、T N F 受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項 1 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 1 3】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、C D 2、C D 3、C D 4、C D 8、C D 1 9、C D 2 2、C D 2 8、C D 7 9、C D 9 0、C D 1 5 2 / C T L A - 4、P D - 1、または I C O S である請求項 1 1 2 に記載の方法。

10

20

30

40

50

(9)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【請求項 114】

TNF 受容体スーパーファミリーメンバーが、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4 またはAPO-3 である請求項 112 に記載の方法。

【請求項 115】

インテグリンが、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103、またはCD104 である請求項 112 に記載の方法。

10

【請求項 116】

レクチンが、C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプのレクチンである請求項 112 に記載の方法。

【請求項 117】

活性化リンバ球上で発現した受容体または受容体複合体に結合するリガンドを投与することをさらに含む請求項 97 に記載の方法。

【請求項 118】

受容体または受容体複合体が、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF 受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含む請求項 117 に記載の方法。

20

【請求項 119】

免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーが、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1 またはICOS である請求項 118 に記載の方法。

【請求項 120】

TNF 受容体スーパーファミリーメンバーが、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4 またはAPO-3 である請求項 118 に記載の方法。

30

【請求項 121】

インテグリンが、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103、またはCD104 である請求項 118 に記載の方法。

【請求項 122】

レクチンが、C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプのレクチンである請求項 118 に記載の方法。

【請求項 123】

第1の抗体が、抗体ではない第2のタンパク質のアミノ酸配列を含む融合タンパク質である請求項 97 に記載の方法。

40

【請求項 124】

第2のタンパク質が、第1の抗体に多価結合性を付与する請求項 123 に記載の方法。

【請求項 125】

さらに免疫抑制剤の投与を含む請求項 97、103、104、110 または 111 に記載の方法。

【請求項 126】

免疫抑制剤が、ガンシクロビル、エタナセプト、シクロスポリン、タクロリムスまたはラパマイシンである請求項 125 に記載の方法。

【請求項 127】

50

(10)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

免疫抑制剤が、アルキル化剤である請求項 1 2 5 に記載の方法。

【請求項 1 2 8】

アルキル化剤が、シクロホスファミドである請求項 1 2 7 に記載の方法。

【請求項 1 2 9】

免疫抑制剤が、代謝拮抗剤である請求項 1 2 5 に記載の方法。

【請求項 1 3 0】

代謝拮抗剤が、プリンアンタゴニストである請求項 1 2 9 に記載の方法。

【請求項 1 3 1】

プリンアンタゴニストが、アザチオプリンまたはミコフェノレートモフェチルである請求項 1 3 0 に記載の方法。

10

【請求項 1 3 2】

代謝拮抗剤が、ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤である請求項 1 2 9 に記載の方法。

【請求項 1 3 3】

ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤が、メトトレキサートである請求項 1 3 2 に記載の方法。

【請求項 1 3 4】

免疫抑制剤が、グルココルチコイドである請求項 1 2 5 に記載の方法。

【請求項 1 3 5】

グルココルチコイドが、コルチゾールまたはアルドステロンである請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 3 6】

免疫抑制剤が、グルココルチコイド類似体である請求項 1 2 5 に記載の方法。

20

【請求項 1 3 7】

グルココルチコイド類似体が、プレドニゾンまたはデキサメタゾンである請求項 1 3 6 に記載の方法。

【請求項 1 3 8】

免疫抑制剤が、抗炎症剤である請求項 1 2 5 に記載の方法。

【請求項 1 3 9】

抗炎症剤が、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リポキシゲナーゼ阻害剤またはロイコトリエン受容体アンタゴニストである請求項 1 3 8 に記載の方法。

【請求項 1 4 0】

第 1 の抗体が、細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 9 7 に記載の方法。

30

【請求項 1 4 1】

細胞傷害性薬剤が、エネジイン、レキシトロブシン、デュオカルマイシン、タキサン、ピューロマイシン、ドラスタチン、メイタンシノイド、DNA 副溝結合剤、DNA 副溝アルキル化剤およびピンカアルカロイドからなる群から選択される請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 4 2】

細胞傷害性薬剤が、パクリタキセル、ドセタキセル、CC-1065、SN-38、トポテカン、モルホリノードキソルピシン、リゾキシシン、シアノモルホリノードキソルピシン、ドラスタチン-10、エキノマイシン、コンブレタスタチン、カリケアマイシン、メイタンシン、DM-1、オーリスタチン E、AEB、AEVB、AEFP、MMAE またはネトロブシンである請求項 1 4 0 に記載の方法。

40

【請求項 1 4 3】

細胞傷害性薬剤が、抗チューブリン剤である請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 4 4】

細胞傷害性薬剤が、ピンカアルカロイド、ポドフィロトキシシン、タキサン、バッカチン誘導体、クリプトフィシン、メイタンシノイド、コンブレタスタチンまたはドラスタチンである請求項 1 4 3 に記載の方法。

【請求項 1 4 5】

細胞傷害性薬剤が、ピンクリスチン、ピンブラスチン、ピンデシン、ピンオレルビン、

50

(11)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

V P- 1 6、カンプトテシン、バクリタキセル、ドセタキセル、エビチロン A、エビチロン B、ノコダゾール、コルヒチン、コルチミド、エストラムスチン、セマドチン、ディスコデルモリド、メイタンシン、DM- 1、オーリスタチン E、A E B、A E V B、A E F P、M M A E またはエロイテロピンである請求項 1 4 3 に記載の方法。

【請求項 1 4 6】

細胞傷害性薬剤が、M M A E である請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 4 7】

細胞傷害性薬剤が、A E F P である請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 4 8】

第 1 の抗体が、ペプチドリinker によって細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。 10

【請求項 1 4 9】

第 1 の抗体が、v a l - c i t リンカーまたは p h e - l y s リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 0】

第 1 の抗体が、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリinker を介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 1】

第 1 の抗体が、5 . 5 未満の p H で加水分解可能なリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。 20

【請求項 1 5 2】

リンカーが 5 . 0 未満の p H で加水分解可能である請求項 1 5 1 に記載の方法。

【請求項 1 5 3】

リンカーが、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリinker である請求項 1 5 1 に記載の方法。

【請求項 1 5 4】

第 1 の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なリンカーによって細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 5】

第 1 の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なペプチドリinker によって細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 1 4 0 に記載の方法。 30

【請求項 1 5 6】

プロテアーゼが、膜結合プロテアーゼである請求項 1 5 4 に記載の方法。

【請求項 1 5 7】

プロテアーゼが、細胞内プロテアーゼである請求項 1 5 4 に記載の方法。

【請求項 1 5 8】

プロテアーゼが、エンドソームのプロテアーゼである請求項 1 5 4 に記載の方法。

【請求項 1 5 9】

プロテアーゼが、リソソームのプロテアーゼである請求項 1 5 4 に記載の方法。

【請求項 1 6 0】 40

第 1 の抗体が、モノクローナル抗体、キメラ抗体、ヒト抗体、ヒト化抗体、グリコシル化抗体、多重特異性抗体、1 本鎖抗体、F a b 断片、F (a b ') 断片、F (a b ') ₂ 断片、F d、1 本鎖 F v、ジスルフィド連結 F v、V_L ドメインを含む断片、C D 3 0 に特異的に結合するポリペプチド、または V_H ドメインを含む断片である請求項 1 4 0 に記載の方法。

【請求項 1 6 1】

第 1 の抗体が、免疫抑制剤にコンジュゲートされる請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 1 6 2】

免疫抑制剤が、ガンシクロビル、エタナセプト、シクロスポリン、タクロリムスまたはラパマイシンである請求項 1 6 1 に記載の方法。 50

(12)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

- 【請求項 1 6 3】
免疫抑制剤が、アルキル化剤である請求項 1 6 1 に記載の方法。
- 【請求項 1 6 4】
アルキル化剤が、シクロホスファミドである請求項 1 6 3 に記載の方法。
- 【請求項 1 6 5】
免疫抑制剤が、代謝拮抗剤である請求項 1 6 1 に記載の方法。
- 【請求項 1 6 6】
代謝拮抗剤が、プリンアンタゴニストである請求項 1 6 5 に記載の方法。
- 【請求項 1 6 7】
プリンアンタゴニストが、アザチオプリンまたはミコフェノレートモフェチルである請求項 1 6 6 に記載の方法。 10
- 【請求項 1 6 8】
代謝拮抗剤が、ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤である請求項 1 6 5 に記載の方法。
- 【請求項 1 6 9】
ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤が、メトトレキサートである請求項 1 6 8 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 0】
免疫抑制剤が、グルココルチコイドである請求項 1 6 1 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 1】
グルココルチコイドが、コルチゾールまたはアルドステロンである請求項 1 7 0 に記載の方法。 20
- 【請求項 1 7 2】
免疫抑制剤が、グルココルチコイド類似体である請求項 1 6 1 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 3】
グルココルチコイド類似体が、プレドニゾンまたはデキサメタゾンである請求項 1 7 2 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 4】
免疫抑制剤が、抗炎症剤である請求項 1 6 1 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 5】
抗炎症剤が、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リボキシゲナーゼ阻害剤またはロイコトリエン受容体アンタゴニストである請求項 1 7 4 に記載の方法。 30
- 【請求項 1 7 6】
免疫学的疾患が、 Th_2 -リンパ球関連疾患である請求項 9 7 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 7】
免疫学的疾患が、アトピー性皮膚炎、全身紅斑性狼瘡、アトピー性喘息、鼻結膜炎、アレルギー性鼻炎、オーメン症候群、全身性硬化症または慢性の移植片対宿主病である請求項 1 7 6 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 8】
免疫学的疾患が、 Th_1 -リンパ球関連疾患である請求項 9 7 に記載の方法。
- 【請求項 1 7 9】
免疫学的疾患が、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、ショーグレン症候群、橋本甲状腺炎、グレイブ病、原発性胆汁性肝硬変、ウェゲナーの肉芽腫症、結核または急性移植片対宿主病である請求項 1 7 8 に記載の方法。 40
- 【請求項 1 8 0】
免疫学的疾患が、ウイルス感染に起因するものである請求項 9 7 に記載の方法。
- 【請求項 1 8 1】
ウイルス感染が、エプスタイン-バーウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、ヒトT白血病ウイルス、B型肝炎ウイルスまたは麻疹ウイルスを含む請求項 1 8 0 に記載の方法。
- 【請求項 1 8 2】
免疫学的疾患が、活性化Bリンパ球に関連する疾患である請求項 9 7 に記載の方法。
- 【請求項 1 8 3】 50

(13)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)CD30への結合についてモノクローナル抗体AC10またはHeFi-1と競合する第1の抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項184】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)配列番号2を含む抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項185】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)配列番号4、配列番号6および配列番号8の1つ、2つまたは全部を含む抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

10

【請求項186】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)配列番号18を含む抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項187】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)配列番号20、配列番号22および配列番号24の1つ、2つまたは全部を含む抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

20

【請求項188】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a)(i)免疫特異的にCD30に結合し、(ii)モノクローナル抗体AC10またはHeFi-1とCD30との結合に関して競合し、細胞傷害性薬剤とコンジュゲートしている抗体と、(b)薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項189】

細胞傷害性薬剤が、エネジイン、レキシトロブシン、デュオカルマイシン、タキサン、ピューロマイシン、ドラスタチン、メイタンシノイド、DNA副溝結合剤、DNA副溝アルキル化剤およびピンカアルカロイドからなる群から選択される請求項188に記載の方法。

30

【請求項190】

細胞傷害性薬剤が、パクリタキセル、ドセタキセル、CC-1065、SN-38、トポテカン、モルホリノードキソルピシン、リゾキシシン、シアノモルホリノードキソルピシン、ドラスタチン-10、エキノマイシン、コンプレタスタチン、カリケアマイシン、メイタンシン、DM-1、オーリスタチンE、AEB、AEVB、AEFP、MMAEまたはネトロブシンである請求項188に記載の方法。

【請求項191】

細胞傷害性薬剤が、抗チューブリン剤である請求項188に記載の方法。

40

【請求項192】

細胞傷害性薬剤が、ピンカアルカロイド、ポドフィロトキシシン、タキサン、バッカチン誘導体、クリプトフィシン、メイタンシノイド、コンプレタスタチンまたはドラスタチンである請求項191に記載の方法。

【請求項193】

細胞傷害性薬剤が、ピンクリスチン、ピンブラスチン、ピンデシン、ピンオレルビン、VP-16、カンプトテシン、パクリタキセル、ドセタキセル、エピチロンA、エピチロンB、ノコダゾール、コルヒチン、コルチミド、エストラムスチン、セマドチン、ディスコデルモリド、メイタンシン、DM-1、オーリスタチンE、AEB、AEVB、AEF

50

(14)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

P、MMAEまたはエロイテロピンである請求項 191 に記載の方法。

【請求項 194】

細胞傷害性薬剤が、MMAEである請求項 188 に記載の方法。

【請求項 195】

細胞傷害性薬剤が、AEFPである請求項 188 に記載の方法。

【請求項 196】

第 1 の抗体が、ペプチドリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。

【請求項 197】

第 1 の抗体が、val-citリンカーまたはphe-lysリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。 10

【請求項 198】

第 1 の抗体が、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。

【請求項 199】

第 1 の抗体が、5.5 未満の pH で加水分解可能なリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。

【請求項 200】

リンカーが 5.0 未満の pH で加水分解可能である請求項 199 に記載の方法。

【請求項 201】

リンカーが、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリンカーである請求項 199 に記載の方法。 20

【請求項 202】

第 1 の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。

【請求項 203】

第 1 の抗体が、プロテアーゼによって切断可能なペプチドリンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートされる請求項 188 に記載の方法。

【請求項 204】

プロテアーゼが、膜結合プロテアーゼである請求項 202 に記載の方法。 30

【請求項 205】

プロテアーゼが、細胞内プロテアーゼである請求項 202 に記載の方法。

【請求項 206】

プロテアーゼが、エンドソームのプロテアーゼである請求項 202 に記載の方法。

【請求項 207】

プロテアーゼが、リソソームのプロテアーゼである請求項 202 に記載の方法。

【請求項 208】

第 1 の抗体が、モノクローナル抗体、キメラ抗体、ヒト抗体、ヒト化抗体、グリコシル化抗体、多重特異性抗体、1 本鎖抗体、Fab 断片、F(ab') 断片、F(ab')₂ 断片、Fd、1 本鎖 Fv、ジスルフィド連結 Fv、VL ドメインを含む断片、CD30 に特異的に結合するポリペプチド、または VH ドメインを含む断片である請求項 188 に記載の方法。 40

【請求項 209】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a) val-cit-MMAE と、(b) 薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。

【請求項 210】

被験体における癌ではない免疫学的疾患の治療方法であって、(a) val-cit-AEFP と、(b) 薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で該被験体に投与することを含む上記方法。 50

(15)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる2001年11月20日出願の米国仮出願第60/331,750号の米国特許法第119条(e)に基づく利益を主張する。

【0002】

1. 発明の分野

本発明は、CD30結合タンパク質を使用する、活性化リンパ球における細胞死または静止状態を誘導する方法および組成物、ならびにこれらの方法および組成物の自己免疫、アレルギー、慢性炎症反応および移植宿主片病(GVHD)などの免疫学的疾患の治療への適用に関する。さらに、本発明は、CD30結合タンパク質と細胞傷害性薬剤のコンジュゲートを使用してCD30発現リンパ球を除去することによる免疫学的疾患の治療方法および組成物に関する。本発明の方法および組成物における有用な典型的なCD30結合タンパク質の例としては、抗CD30抗体であるAC10およびHeFi-1、ならびにAC10またはHeFi-1と細胞傷害性薬剤とのコンジュゲートが含まれる。

10

【背景技術】

【0003】

2. 発明の背景2.1 リンパ球

20

抗原刺激および細胞増殖(cellular expansion)の後、ナイーブT細胞は表現型が異なるエフェクター細胞へと発達可能である。IFN γ やリンホトキシンなどの前炎症性サイトカインを分泌するエフェクターT細胞(ヘルパーT細胞または細胞傷害性T細胞)は、総称してTh₁またはTc₁細胞と呼ばれ、また、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10およびIL-13を分泌するエフェクターT細胞は、Th₂またはTc₂として知られている。Th₁/Tc₁サイトカインは、CTLおよび単球/マクロファージの活性化を含む細胞媒介性応答を誘導し、Th₂/Tc₂サイトカインはB細胞によって抗体産生を増強することにより体液性免疫反応を誘導する。結果として、無制御のTh₁/Tc₁応答は、通常、関節リウマチや糖尿病などの器官特異的自己免疫応答として顕れる。一方、無制御のTh₂/Tc₂応答は、通常、全身性紅斑性狼瘡などの、アレルギー反応および全身性の自己免疫疾患と関連する。これらの2極化されたT細胞サブセットは、互いに相手の各活性を相反的に調節することが可能であり、Th₂/Tc₂サイトカインが存在すると、細胞媒介性の自己免疫に起因する症状をある程度緩和することが可能であり、その逆も同様である(SederとMosmann、1999、「Fundamental Immunology」、4版、879~908頁;O' GaraとArai、2000、Trends Cell Biol. 10:542~550頁)。

30

【0004】

2.2 CD30

白血球活性化マーカーCD30は、105~120kDaの膜内在性糖タンパク質であり、腫瘍壊死因子受容体(TNFR)スーパーファミリーのメンバーである。この重要な免疫調節分子ファミリーは、CD27、CD40、CD95、OX40、TNFR1およびTNFR2を含む。もともとCD30は、Ki-1モノクローナル抗体(mAb)(Steinら、1985、Blood、66、848~858頁;Laudewitzら、1986、J. Invest. Dermatol. 86:350~354頁)を使用して、ホジキン病(HD)のリード-シュテルンベルク(Reed-Sternberg)細胞上で同定されたものであるが、その後、非ホジキン性リンパ腫(NHL)のサブセットである未分化大細胞リンパ腫(ALCL:anaplastic large cell lymphoma)上ならびに胚性癌腫および精巣悪性腫瘍などの希少な固形癌中에서도見出されている(Chiarleら、1999、Clin. Immunol. 90

40

50

(16)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

：157～164頁）。正常な条件下では、CD30の発現は活性化TおよびB細胞に限定され、休止期のリンパ球、休止期の単球、および免疫系外の正常な細胞には見られない。CD30は自己免疫疾患において活性化細胞によって高レベルで発現し、これらの細胞から流出したCD30は、関節リウマチ（Gerliら、2000、J. Immunol. 164、4399～4407頁）、多発性硬化症（McMillanら、2000、Acta Neurol. Scand. 101：239～243頁）および全身性硬化症（Ihnら、J. Rheumatol. 27：698～702頁）を含む疾患に罹患している患者の循環系において検出できる。CD30発現についての組織学的検査によって、リンパ節、扁桃腺、胸腺、および胎盤境界面で脱落した子宮内膜細胞、の切片中に見られる希少な大リンパ系細胞が同定される（Durkopら、2000、J. Pathol. 190：613～618頁）。CD30は、有糸分裂促進物質活性化または抗原受容体架橋（HorieとWatanabe、1998、Sem. Immunol. 10：457～470頁）後の培養物中のT細胞上で一過的に発現され、ある種のウイルス感染（例えば、HIV）（Romagnaniら、1996、Immunol. Lett. 51：83～88頁）後では構成的に発現される。

【0005】

CD30に対するリガンド（CD30L）が同定されている。CD30LはII型の膜貫通タンパク質であり、これはTNFスーパーファミリーのメンバーと配列および構造の相同性がある（Smithら、1993、Cell、73、1349～1360頁）。CD30Lは、TNFαのように3量体としても存在すると考えられており、CD30L-CD30相互作用は、CD30の3量体化を誘導してCD30⁺細胞へのシグナル伝達を開始させる。CD30Lの発現は、活性化T細胞、好中球、好酸球、休止B細胞、上皮細胞および胸腺髄質のハッサル（Hassal）小体、ならびにある種の白血病細胞中で確認されている（Younesら、Br. J. Haematol.、93：569～571頁；Pintoら、1996、Blood、88：3299～3305頁；Grussら、1996、Am. J. Pathol. 149、469～481頁；Gatteiら、1997、Blood、89、2048～2059頁；Romagnaniら、1998、Blood 91：3323～3332頁；Wileyら、1996、J. Immunol.、157：3635～3639頁）。

【0006】

リンパ球表面抗原CD30は、活性化B細胞およびT細胞に一過的に提示される活性化マーカーであり、また、ある種の悪性な血液細胞および、いくつかの自己免疫疾患で慢性的に活性化された細胞上で構成的に発現される。リンパ球調節におけるその役割は、減衰的なものの一種であると考えられている。ロックアウト動物におけるCD30の欠損は免疫刺激への過剰応答をもたらし、胸腺中のトランスジーンの過剰発現は胸腺細胞消耗の増大をもたらすからである。したがって、CD30を標的とする療法によって活性化リンパ球を除去または減衰させることにより、自己免疫および慢性炎症性疾患の制御に効果を有し得る。

【0007】

CD30のリンパ球生存の調節は複雑なため、モデルシステムにおけるその作用についてはまったく異なる説明がなされている。DuckettとThompson（1997、Genes Dev. 11：2810～21頁）は、CD30シグナル伝達の初期の作用はTRAF1およびTRAF2の補給（recruitment）によって生存を促進することであることを示した。このシグナル伝達複合体はNF-κBを介して成長および生存遺伝子の発現を促進する。この活性化に続いて、CD30と複合体を形成したTRAFは、その後分解し、細胞がさらにNF-κBを活性化する能力を弱める。この結果、細胞は、TNF-R1の結合によって誘導されたアポトーシスに感受性を持つようになる（DuckettとThompson、1997、Genes Dev. 11：2810～21頁；Archら、2000、Biochem. Biophys. Res. Commun. 272：936～945頁）。感作は、CD30の細胞質ドメイン内のTRAF2結

10

20

30

40

50

(17)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

合部位に依存し、T R A F 2 の細胞分解はアポトーシスの開始と一致する。

【0008】

2.3 免疫系中のCD30の役割

2.3.1 正常免疫系

CD30の*in vivo*での機能は明らかにはわかっていない。*in vitro*でのCD30の結合は細胞の増殖または増殖抑制のいずれかを引き起こすことが示されている(Grussら、1994、Blood、83、2045~2056頁)。T細胞上のCD30の結合は様々な*in vitro*でのT細胞機能を調節することが実証されている。抗CD30 mAbは、T細胞抗原受容体結合を共同刺激して、抗原(Del Pre et al. 1995、J. Exp. Med.、182:1655~1661頁)または抗CD3抗体(Gilfillanら、1998、J. Immunol. 160:2180~2187頁)のいずれかによって開始されたT細胞の細胞増殖を増大させる。CD30シグナル伝達はまた、T細胞中のサイトカイン産生を促進する。インターロイキン(IL)-2、IL-4、IL-5、IFN γ およびTNF α の発現は、PHA活性化末梢T細胞(GrussとHermann、1996、Leukemia Lymphoma、20:397~409頁)、Tヘルパー(Th)クローン(Del Pre et al. 1995、J. Exp. Med.、182:1655~1661頁; Bengtssonら、2000、Scand. J. Immunol. 52、595~601頁)、細胞傷害性T細胞(Tc/CTL)系(Bowenら、1996、J. Immunol. 156:442~449頁)および $\gamma\delta$ T細胞(Biswasら、2000、Eur. J. Immunol. 30:2172~2180頁)におけるCD30シグナルによって増強される。CD30は、さらにHIV複製を刺激する上で重要な役割を果たしている可能性がある。mAbによるCD30の架橋は、HIVに慢性的に感染したT細胞系統によるNF- κ B活性化およびHIV産生を誘導する(Biswasら、1995、Immunity、2、587~596頁)。患者由来のCD4⁺、HIV-感染T細胞も、抗CD30 mAbまたはCD30L刺激に応答してHIVを産生する(Maggiら、1995、Immunity 3:251~255頁)。

【0009】

CD30は、T細胞の活性化誘導細胞死に関与している。T細胞ハイブリドーマ中で発現されたCD8-CD30キメラの結合は、T細胞抗原受容体によって媒介されるアポトーシスを増強した(Leeら、1996、J. Exp. Med. 183:669~674頁)。マウスのCD8⁺T細胞におけるアゴニスト撤退誘導アポトーシスの第2モデルでは、CD30-Ig融合タンパク質を用いてCD30シグナル伝達を阻止することにより、CD8⁺T細胞のアポトーシスが部分的ながら防止されている(Telfordら、1997、Cell Immunol. 182:125~136頁)。動物モデルから得られた結果からも、胸腺細胞におけるアポトーシス誘導、自動反応性T細胞の除去のネガティブ選別過程におけるCD30の役割が示唆される(Amakawaら、1996、Cell 84:551~562頁)。CD30^{-/-}ヌルマウスでは、ネガティブ選別が大幅に低減し胸腺細胞数の増加をもたらしており(Amakawaら、1996、Cell 84:551~562頁)、証明された1つの結果は、CD30欠損CD8陽性T細胞は、自己免疫性糖尿病を惹起するその能力において桁違いに高い自己反応性であるという点である(Kurtsら、1999、Nature 398:341~344頁)。反対に、CD30の過剰発現が胸腺細胞におけるプログラム化された細胞死を促進することが示されており、従って、胸腺における自動反応性T細胞のネガティブ選別を増強し(Chiarleら、1999、J. Immunol. 163:194~205頁)、末梢において非リンパ組織に対するT細胞自動応答を妨げる(Heathら、1999、Immunol. Rev. 169:23~29頁)。

【0010】

2.3.2 疾患状態

CD30がTh₂サイトカインを分泌するヒトT細胞クローン上で好ましく発現され(

(18)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

De l P r e t e ら、1995、F A S E B J . 9、81～86頁)、T細胞上のC D 3 0 の架橋がT h ₂ 様T細胞の発達を促す(De l P r e t e ら、1995、J . E x p . M e d .、182、1655～1661頁)ことが実証されたため、T h ₂ サイトカインがかかわる免疫学的疾患がC D 3 0 ⁺ T細胞の調節障害に起因するかもしれないという仮説が立てられた。

【0011】

C D 3 0 の発現は、アトピー性アレルギー(アトピー性皮膚炎、アトピー性喘息、鼻結膜炎、アレルギー性鼻炎)、全身性紅斑性狼瘡、全身性硬化症(強皮症)、宿主対移植片病(G V H D)、H I VおよびE B V伝染、麻疹、オーメン(O m e n n)症候群、潰瘍性大腸炎、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、橋本甲状腺炎、原発性胆汁性肝硬変、シ

10

。

【0012】

C D 3 0 ⁺ の浸潤T細胞は、アトピー性皮膚炎(C a p r o n i ら、1997、A l l e r g y 52:1063～1070頁;C a v a g n i ら、2000、A l l e r g y I m m u n o l . 121:224～228頁)、アトピー性喘息(B l a n c o Q u i r o s ら、1999、P e d i a t r . A l l e r g y I m m u n o l . 10:235～240頁)、G V H D (D' E l i o s ら、1997、J . L e u k o c . B i o l . 61:539～544頁)、結核(M u n k ら、1997、I n t . I m m u n o l . 9:713～720頁)、原発性胆汁性肝硬変(H a r a d a ら、1999、J . G a s t r o e n t e r o l . H e p a t o l . 14:1197～1202頁)、麻疹(V i n a n t e ら、1999、H a e m a t o l o g i c a 84:683～689頁)、関節リウマチ(G e r l i ら、2000、J . I m m u n o l . 164:4399～4407頁;G e r l i ら、1995、C l i n . E x p . I m m u n o l . 102:547～550頁)および乾癬(F e r e n c z i ら、2000、J . A u t o i m m u n . 14:63～78頁)の病巣および炎症部位で見ついている。C D 3 0 発現は、正常な状況では活性化リンパ球のわずかな割合に厳密に限られているが、アトピー性喘息およびアレルギー性鼻炎でC D 3 0 m R N A 発現の増加が報告されている(E s n a u l t ら、1996、C l i n . E x p . I m m u n o l . 106:67～72頁)。C D 3 0 の変化した発現と免疫疾患の間の相関性は、前述の疾患のうちの多くで見られる可溶性C D 3 0 (s C D 3 0 : s o l u b l e C D 3 0)の血漿中レベルが高いという点によりさらに強調される(G r u s s ら、1997、I m m u n o l . T o d a y 18:156～163頁;H o r i e とW a t a b a b e、1998、S e m . I m m u n o l . 10:457～470頁;B e n g t s s o n、2001、A l l e r g y 56:593～603頁;G e r l i ら、2001、T r e n d s I m m u n o l . 22:72～77頁)。

20

30

40

【0013】

いくつかの疾患には、T h ₂ サイトカインおよびC D 3 0 ⁺ T細胞の両者が関与していることが実証されている(D' E l i o s ら、1997、J . L e u k o c . B i o l . 61:539～544頁)。アトピー性皮膚炎患者のほとんどはT h ₂ サイトカインの産生増加と並行して血清I g Eレベルの増大および循環系中の好酸球数の増加を示す(L e u n g、1995、J . A l l e r g y C l i n . I m m u n o l . 96:302～3

50

(19)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

19頁)。IL-4、IL-5およびIL-13を産生するアレルゲン特異的Th₂細胞の出現率の増加も、アトピー性皮膚炎患者の末梢血中で検出できる(Kimuraら、1998、J. Allergy Clin. Immunol.、101、84~89頁)。CD30発現とTh₂サイトカイン産生との間の相関性は、アトピー性皮膚炎患者で認められており、これは循環系中のT細胞におけるCD30の発現が、Th₂が支配する症状に対するin vivoマーカーとして役立つかもしれないという示唆をもたらした(Yamamotoら、2000、Allergy、55、1011~1018頁)。アトピー性喘息におけるアレルゲン誘導性のIL-4産生は、アトピー性喘息被験体から単離されたPBMC中のCD30発現と関連する(Leonardら、1997、Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.、17、368~375頁)。これは、喘息患者由来の気管支肺胞の損傷γδT細胞中でも示されている(Spinozziら、1995、Mol. Med. 1:821~826頁)。同様に、全身性硬化症(これはsCD30の高い血清レベルおよび皮膚損傷中のCD30発現によって特徴づけられた疾患である)では、IL-4 mRNAが皮膚損傷部に浸潤したリンパ球中のin situハイブリダイゼーションによって検出可能である一方、皮膚浸潤部から生成したほとんどのCD4⁺T細胞クローンがTh₂サイトカインのプロファイルを示す(Mavaliarら、1997、Am. J. Path. 15、1751~1758頁)。HIVに感染した患者では、健康なドナーと比較した時、末梢血中でTh₂サイトカイン産生CD8⁺/CD30⁺細胞の不釣り合いに高い出現率が検出されることがある(Manettiら、1994、J. Exp. Med. 180:2407~2411頁)。HIVに感染した患者では、Th₂型免疫の緊急出現も、疾患の進行に伴う免疫病理と関連しているように思われる(Rizzardiら、1998、Clin. Exp. Immunol. 114:61~65頁)。

10

20

【0014】

Th₂に関連する疾患とは対照的に、Th₁に関連する疾患におけるCD30⁺の役割もわかっていない。多発性硬化症患者のCSFおよび関節リウマチ患者の循環系中には高レベルのsCD30が見出されている(McMillanら、2000、Acta Neurol. Scand. 101:239~243頁; Gerliら、2000、J. Immunol. 164:4399~4407頁)。これらの疾患では、Th₁サイトカインで駆動される応答および循環系中の高レベルのCD30は、両者とも、疾患寛解を伴っており、CD30⁺T細胞によるTh₂サイトカインが、Th₁サイトカイン病原性活性に対抗し得ることを示唆する(McMillanら、2000、Acta Neurol. Scand. 101:239~243頁; Gerliら、2000、J. Immunol. 164:4399~4407頁)。T細胞サブセット上でのCD30発現を調べたより最近の実験では、細胞の活性化に際して、Th₁細胞もCD30を発現することが確認されている(Hammanら、1996、J. Immunol. 156:1387~1391頁; Bengtssonら、1995、J. Leukoc. Biol. 58:683~689頁)。アゴニスト性抗CD30 mAbは、CD30⁺Th₁細胞中でTh₁サイトカインIFNγの産生を刺激することができる(Bengtssonら、2000、Scand. J. Immunol. 52:595~601頁)。アトピー性皮膚炎では、疾患の進行に伴って、T細胞浸潤皮膚損傷部によるTh₂サイトカイン産生が優勢な状態からTh₂とTh₁サイトカインの同時発現への移行を決定付ける証拠が得られる(Grewerら、1998、Immunol. Today 19:359)。したがって、CD30 T細胞もまた、Th₁関連疾患においてTh₁サイトカインの産生に役割を果たし得る。

30

40

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

2.4 免疫療法

自己抗原またはアレルゲンに対しリンパ球が活性化状態を持続したり、進行中の免疫応

50

(20)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

答が抗原の除去後に終了しないことが、自己免疫疾患、アレルギー反応および慢性炎症反応で見られた病理の根本原因である。自己免疫性の疾患、アレルギー性疾患および炎症性疾患の治療には、代謝拮抗剤、ステロイドおよび抗炎症剤を含む様々な治療レジメが利用可能である。これらの薬剤は症状の緩和に効果があるが、それらのいずれもそれらの病原性細胞を特異的になくすようには働かないし、その大半は患者に対し重い副作用をもたらす。

【 0 0 1 6 】

C D 3 0 を有する活性化リンパ球の除去または減衰は、自己免疫性の疾患および慢性の炎症性疾患の調節に効果があり得る。しかし、免疫疾患におけるC D 3 0 の役割についての上記の証拠にもかかわらず、m A b によりC D 3 0 を標的とすることは、そのような疾患を治療するのに有効であるとは実証されていない。C D 3 0 を有する活性化したリンパ球を除去または減退できる薬剤は、免疫学的疾患の治療において非常に望ましいであろう。

10

【課題を解決するための手段】

【 0 0 1 7 】

3 . 発明の概要

本発明は、驚くべきことに抗C D 3 0 抗体のあるクラスに関わる新規な活性を見出したことに基づく。この新規な活性は、ある例では、C D 3 0 受容体経路を介してシグナル伝達することにより、活性化リンパ球を死滅させるかその生育を阻害する抗C D 3 0 抗体の能力である。ある好ましい実施形態では、本発明の抗体は、細胞傷害性試薬への結合がない状態で、および/またはC D 3 0 - 発現リンパ球以外の細胞がない状態（例えば、エフェクター細胞がない状態）で、単一特異性抗体として活性化リンパ球のアポトーシスまたは生育停止を誘導することができる。

20

【 0 0 1 8 】

したがって、本発明は、被験体における免疫学的疾患（好ましくは免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（ a ）（ i ）免疫特異的にC D 3 0 に結合し、（ i i ）リンパ球においてC D 3 0 シグナル伝達を誘導し、かつ/または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼす第1の抗体と、（ b ）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。抗体はヒトのものでもよいし、ヒト化されたものでもよいし、キメラでもよい。1つの実施形態では、抗体は多価である。好ましい実施形態では、抗体はモノクローナル抗体A C 1 0 またはH e F i - 1 とC D 3 0 との結合に関して競合する。

30

【 0 0 1 9 】

本発明はさらに、被験体における免疫学的疾患（好ましくは免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（ a ）（ i ）免疫特異的にC D 3 0 に結合し、（ i i ）リンパ球においてC D 3 0 シグナル伝達を誘導し、かつ/または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼす第1の抗体と、（ b ）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法であって、第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を強めあるいは増す薬剤の投与をさらに含む方法を提供する。ある実施形態では、第1の抗体の細胞静止作用または細胞傷害作用を強める薬剤は、第2の抗体、活性化リンパ球上で発現される受容体または受容体複合体に結合するリガンドまたは免疫抑制剤である。そのような試薬およびそれらの使用方法の例についてはさらに以下に記載する。

40

【 0 0 2 0 】

したがって、本発明は、被験体における免疫学的疾患（好ましくは免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（ a ）（ i ）免疫特異的にC D 3 0 に結合し、（ i i ）リンパ球においてC D 3 0 シグナル伝達を誘導し、かつ/または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼす第1の抗体と、（ b ）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法であって、前記被験体への第2の抗体の投与をさらに含む方法を提供する。好ましい実施形態では、

50

(21)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

第2の抗体は、活性化リンパ球上で発現された非CD30受容体または受容体複合体を認識する。

【0021】

ある特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）モノクローナル抗体AC10またはHeFi-1とCD30との結合に関して競合する抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

【0022】

別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）配列番号2（抗CD30抗体AC10の重鎖可変領域）を含む抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

10

【0023】

別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）配列番号4、配列番号6および配列番号8（抗CD30抗体AC10の重鎖CDR）または配列番号4、配列番号6および配列番号8と1個、2個または3個のアミノ酸が異なる配列番号4、配列番号6および配列番号8の改変体の1つ、2つまたは全部を含む抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

20

【0024】

別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）配列番号18（抗CD30抗体HeFi-1の重鎖可変領域）を含む抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

【0025】

別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）配列番号20、配列番号22および配列番号24（抗CD30抗体HeFi-1の重鎖CDR）または配列番号20、配列番号22および配列番号24と1個、2個または3個のアミノ酸が異なる配列番号20、配列番号22および配列番号24の改変体の1つ、2つまたは全部を含む抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

30

【0026】

さらに別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）（i）免疫特異的にCD30に結合し、（ii）モノクローナル抗体AC10またはHeFi-1とCD30との結合に関して競合し、細胞傷害性薬剤とコンジュゲートしている抗体と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

40

【0027】

本発明のある特定の実施形態では、抗CD30抗体はアゴニスト抗体である。本発明の別の特定の実施形態では、抗CD30抗体は非アゴニスト抗体である。さらに別の特定の実施形態では、抗CD30抗体は、CD30へのCD30リガンドの結合を妨げない。

【0028】

好ましい実施形態では、非CD30受容体または受容体複合体を認識する第2の抗体を被験体に投与する場合、そのような抗体は、CD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止

50

(22)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

作用を増強することができる。何らかの理論に拘束されるものではないが、そのような第2の抗体は、活性化リンパ球に細胞静止性または細胞傷害シグナルを送達することにより、CD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強する。例示的な受容体または受容体複合体には、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質が含まれる。適当な免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1およびICOSである。適当なTNF受容体スーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン（osteoprotegerin）、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4およびAPO-3である。適当なインテグリン類の例（ただし、これらに限定されない）は、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103およびCD104である。適当なレクチンの例（ただし、これらに限定されない）は、C-タイプ、S-タイプおよびE-タイプのレクチンである。

【0029】

ある好ましい実施形態では、本発明の方法において有用な抗体、つまり、CD30に結合し、活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす抗体は、二重特異性（bispecific）抗体である。特定の実施形態では、二重特異性抗体は、CD30、および活性化リンパ球上で発現された非CD30受容体または受容体複合体の両方に結合する。好ましくは、非CD30受容体または受容体複合体に結合する、二重特異性抗体部分は、CD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強することができる。二重特異性抗体の非CD30結合部分は、好ましくは、活性化リンパ球に細胞静止性または細胞傷害シグナルを送達することによりCD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強する。受容体または受容体複合体は、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含むことができる。適当な免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1およびICOSである。適当なTNF受容体スーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4およびAPO-3である。適当なインテグリン類の例（ただし、これらに限定されない）は、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103およびCD104である。適当なレクチンの例（ただし、これらに限定されない）は、C-タイプ、S-タイプおよびE-タイプのレクチンである。

【0030】

他の実施形態では、本発明の治療方法は、非CD30抗体と同時にまたは連続的に、活性化リンパ球上で発現する受容体または受容体の複合体に結合するリガンドを被験体に投与することをさらに含む。好ましくは、リガンドは、例えば、活性化リンパ球に細胞静止または細胞傷害シグナルを送達することにより、CD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強することができる。受容体または受容体複合体は、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは

(23)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

補体制御タンパク質を含むことができる。適当な免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1およびICOSである。適当なTNF受容体スーパーファミリーメンバーの例（ただし、これらに限定されない）は、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4およびAPO-3である。適当なインテグリン類の例（ただし、これらに限定されない）は、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103およびCD104である。適当なレクチンの例（ただし、これらに限定されない）は、C-タイプ、S-タイプおよびI-タイプのレクチンである。前述の受容体に結合するリガンドは当業者に知られている。

10

【0031】

本発明の治療方法のある特定の実施形態では、抗CD30抗体は抗体でない第2のタンパク質のアミノ酸配列を含む融合タンパク質である。好ましい実施形態では、第2のタンパク質が、CD30抗体に多価結合特性を付与する。

【0032】

他の実施形態では、本発明の治療方法はさらに、被験体への細胞静止剤、細胞傷害性薬剤および/または免疫抑制剤の投与を含む。1つの実施形態では、免疫抑制剤は、ガンシクロビル、アシクロビル、エタナセプト、ラパマイシン、シクロスポリンまたはタクロリムスである。別の実施形態では、免疫抑制剤は、代謝拮抗剤、プリンアンタゴニスト（例えば、アザチオプリンまたはミコフェノレートモフェチル（mycophenolate mofetil））、ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤（例えば、メトトレキサート）、グルココルチコイド（例えば、コルチゾールまたはアルドステロン）、またはグルココルチコイド類似体（例えば、プレドニゾンまたはデキサメタゾン）である。さらに他の実施形態で、免疫抑制剤はアルキル化剤（例えば、シクロホスファミド）である。さらに他の実施形態で、免疫抑制剤は抗炎症剤であり、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リボキシゲナーゼ阻害剤およびロイコトリエン受容体アンタゴニストを含むが、これらに限定されない。

20

30

【0033】

ある好ましい実施形態では、本発明の方法において有用な抗体、つまり、CD30に結合し、リンパ球においてCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対する細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす抗体は、細胞静止剤、細胞傷害性薬剤または免疫抑制剤にコンジュゲートする。このようなコンジュゲートした抗体は、本明細書においては、抗CD30抗体-薬剤コンジュゲート（「ADC」または「ADC類」）、抗CD30抗体細胞傷害性薬剤/免疫抑制剤コンジュゲートと呼ぶこともある。

【0034】

ある好ましい実施形態では、細胞傷害性薬剤は、エネジイン（enediynes）、レキシトロプシン（lexitropsin）、デュオカルマイシン（duocarmycin）、タキサン（taxane）、ピューロマイシン（puromycin）、ドラスタチン（dolastatin）、メイタンシノイド（maytansinoid）およびピンカアルカロイドからなる群から選択される。あるより具体的な実施形態では、細胞傷害性薬剤は、バクリタキセル、ドセタキセル、CC-1065、SN-38、トボテカン、モルホリノドキシソルピシン、リゾキシシン、シアノモルホリノドキシソルピシン、ドラスタチン-10、エキノマイシン（echinomycin）、コンブレタスタチン（combrebastatin）、カリケアマイシン（calicheamicin）、メイタンシン（maytansine）、DM-1、オーリスタチン（auristatin）E、AEB、AEVB、AEFP、MMAEまたはネトロプシン（netropsin）である。AEB、AEVB、AEFPおよびMMAEの構造は下記の3.1節で示す

40

50

(24)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

。

【0035】

他の好ましい実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの細胞傷害性薬剤は、抗チューブリン剤である。より特定の実施形態では、細胞傷害性薬剤は、ピンカアルカロイド、ポドフィロトキシン (podophyllotoxin)、タキサン、バッカチン (baccatin) 誘導体、クリプトフィシン (cryptophysin)、メイタンシノイド、コンプレタスタチンおよびドラスタチンからなる群から選択される。より具体的な実施形態では、細胞傷害性薬剤は、ピンクリスチン、ピンブラスチン、ビンデシン、ビンオレルビン (vinorelbine)、VP-16、カンプトテシン、パクリタキセル、ドセタキセル、エピチロン (epithilone) A、エピチロン B、ノコダゾール (nocodazole)、コルヒチン、コルチミド (colcimide)、エストラムスチン (estramustine)、セマドチン (cemadotin)、ディスコデルモリド (discodermolide)、メイタンシン、DM-1、AEFP、オーリスタチン E、AEB、AEVB、AEFP、MMAE またはエロイテロビン (eleutherobin) からなる群から選択される。

10

【0036】

より具体的な実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの細胞傷害性薬剤は、MMAE である。別の具体的な実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの細胞傷害性薬剤は、AEFP である。

【0037】

特定の実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗CD30抗体は、リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートし、ここでリンカーはペプチド・リンカーである。特定の実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗CD30抗体は、リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートし、ここでリンカーは val-cit リンカー、phe-lys リンカー、ヒドラゾンリンカーまたはジスルフィドリンカーである。ある実施形態では、本発明の抗CD30抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗CD30抗体は、ペプチド・リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートする。

20

【0038】

ある実施形態では、本発明のコンジュゲートは、抗CD30-バリリン-シトルリン-MMAE (抗CD30-val-cit MMAE または抗CD30-val-cit MMAE) または抗CD30-バリリン-シトルリン-AEFP (抗CD30-val-cit AEFP または抗CD30-val-cit AEFP) である。特定の実施形態では、本発明のコンジュゲートは AC10-バリリン-シトルリン-MMAE (AC10-val-cit MMAE または AC10-val-cit MMAE) または AC10-バリリン-シトルリン-AEFP (AC10-val-cit AEFP または AC10-val-cit AEFP) である。

30

【0039】

別の実施形態では、本発明のコンジュゲートは、抗CD30-フェニルアラニン-リジン-MMAE (抗CD30-phe-lys MMAE または抗CD30-fk MMAE) または抗CD30-フェニルアラニン-リジン-AEFP (抗CD30-phe-lys AEFP または抗CD30-fk AEFP) である。特定の実施形態では、本発明のコンジュゲートは、AC10-フェニルアラニン-リジン-MMAE (AC10-phe-lys MMAE または AC10-fk MMAE) または AC10-フェニルアラニン-リジン-AEFP (AC10-phe-lys AEFP または AC10-fk AEFP) である。

40

。

【0040】

したがって、特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患 (ここで、免疫学的疾患は癌ではない) の治療方法であって、(a) cAC10-val-cit-MMAE と、(b) 薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

50

(25)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【 0 0 4 1 】

別の特定の実施形態では、本発明は、被験体における免疫学的疾患（ここで、免疫学的疾患は癌ではない）の治療方法であって、（a）c A C 1 0 - v a l - c i t - A E F P と、（b）薬学的に許容できる担体とを含む医薬組成物を治療上有効な量で前記被験体に投与することを含む方法を提供する。

【 0 0 4 2 】

ある実施形態では、本発明の抗 C D 3 0 抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗 C D 3 0 抗体は、リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートし、ここでリンカーは 5 . 5 未満の pH で加水分解され得る。特定の実施形態では、リンカーは 5 . 0 未満の pH で加水分解され得る。

10

【 0 0 4 3 】

ある実施形態では、本発明の抗 C D 3 0 抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗 C D 3 0 抗体は、リンカーを介して細胞傷害性薬剤にコンジュゲートし、ここでリンカーはプロテアーゼによって切断され得る。特定の実施形態では、プロテアーゼはリソソームのプロテアーゼである。他の特定の実施形態では、プロテアーゼは、とりわけ、膜結合プロテアーゼ、細胞内プロテアーゼまたはエンドソームの (e n d o s o m a l) プロテアーゼである。

【 0 0 4 4 】

ある実施形態では、本発明の抗 C D 3 0 抗体は、モノクローナル抗体、ヒト化されたキメラ抗体、キメラ抗体、ヒト化抗体、グリコシル化抗体、多重特異性抗体、ヒト抗体、1 本鎖抗体、F a b 断片、F (a b ') 断片、F (a b ') ₂ 断片、F d、1 本鎖 F v、ジスルフィド連結 F v、V_L ドメインを含む断片、または V_H ドメインを含む断片である。ある実施形態では、本発明の抗 C D 3 0 抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗 C D 3 0 抗体は、特に C D 3 0 に特異的に結合するポリペプチドである。ある実施形態では、抗体が二重特異性抗体である。他の実施形態では、抗体は二重特異性抗体ではない。

20

【 0 0 4 5 】

ある実施形態では、抗 C D 3 0 抗体は放射標識される。ある実施形態では、抗 C D 3 0 抗体-細胞傷害性薬剤コンジュゲートの抗 C D 3 0 抗体は放射標識される。特定の実施形態では、放射性標識は、⁹⁰Y、¹¹¹In、²¹¹At、¹³¹I、²¹²Bi、²¹³Bi、²²⁵Ac、¹⁸⁶Re、¹⁸⁸Re、¹⁰⁹Pd、⁶⁷Cu、⁷⁷Br、¹⁰⁵Rh、¹⁹⁸Au、¹⁹⁹Au または ²¹²Pb である。

30

【 0 0 4 6 】

本発明の方法によって包含される免疫学的疾患は、T h₂ リンパ球関連疾患（例えば、アトピー性皮膚炎、全身紅斑性狼瘡（「S L E」）、アトピー性喘息、鼻結膜炎、アレルギー性鼻炎、オーメン症候群、全身性硬化症および慢性の移植片対宿主病）；T h₁ リンパ球関連疾患（例えば、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、ショーグレン症候群、橋本甲状腺炎、グレイブ病、原発性胆汁性肝硬変、ウェゲナー肉芽腫症、結核および急性移植片対宿主病）；ウイルス感染に関連する疾患（例えば、エプスタイン-バーウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、ヒト T 白血病ウイルス、B 型肝炎ウイルスおよび麻疹ウイルス感染症）；および活性化 B リンパ球に関連する疾患（例えば、全身紅斑性狼瘡、グッドパスチャー (G o o d p a s t u r e) 症候群、関節リウマチ、および I 型糖尿病）である。

40

【 0 0 4 7 】


3 . 1 略語

「A E F P」という略語は、ジメチルバリン-バリン-ドライソロイン-ドラプロイン-フェニルアラニン-p-フェニレンジアミン、すなわち、以下に示すオーリスタチン E 誘導体を指す：

(26)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【化1】




10

AEFP

【0048】

「MMAE」という略語は、モノメチル・オーリスタチンE、すなわち、以下に示すオーリスタチンE誘導体を指す：

【化2】




20

MMAE

【0049】

「AEB」という略語は、オーリスタチンEをパラアセチル安息香酸と反応させることにより生産されるエステルを指し、その構造は以下に示す通りである：

【化3】



40

AEB

【0050】


「AEVB」という略語は、オーリスタチンEをベンゾイル吉草酸と反応させることにより生産されるエステルを指し、その構造は以下に示す通りである：

50

(27)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【化 4】



10

AEVB

【0051】

「fk」および「phe-lys」という略語は、リンカーであるフェニルアラニン-リジンを指す。

【0052】

「vc」および「val-cit」という略語は、リンカーであるバリン-シトルリンを指す。

20

【発明を実施するための最良の形態】

【0053】

4. 図面の簡単な説明

(後記の図面の簡単な説明の欄参照のこと)

5. 発明の詳細な説明

本発明は、CD30に結合し、リンパ球においてCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼすタンパク質の免疫学的疾患の治療または予防のための使用に関する。本発明はさらに、CD30との結合についてAC10またはHeFi-1と競合し、リンパ球においてCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用もしくは細胞傷害作用を及ぼすタンパク質に関する。1つの実施形態では、タンパク質は抗体である。実施形態の好ましい態様において、抗体はAC10またはHeFi-1であり、最も好ましくはAC10またはHeFi-1のヒト化形態またはキメラ形態である。

30

【0054】

ある実施形態では、本発明の抗CD30抗体は、細胞傷害性薬(例えば、小さな分子、毒素、放射性同位体)とコンジュゲートしていない状態で、および/またはCD30-発現リンパ球以外の細胞がない状態(例えば、ナチュラル・キラー細胞のようなエフェクター細胞が欠如した状態)で、単一特異性抗体として活性化リンパ球のアポトーシスまたは成長停止を誘導することができる。何らかの理論に拘束されるものではないが、本発明者は、CD30経路を介してシグナル伝達することにより、そのような抗体がアポトーシスまたは生育停止を誘導すると考える。

40

【0055】

本発明はさらに、AC10およびHeFi-1遺伝子のヌクレオチド配列によってコードされるタンパク質の免疫学的疾患の治療または予防のための使用に関する。本発明はさらに、そのようなAC10およびHeFi-1タンパク質の断片、および他の誘導体および類似体に関する。そのような断片または誘導体をコードする核酸も本発明の範囲内である。前述のタンパク質の産生は、例えば、遺伝子組み換え法によって提供される。

【0056】

50

(28)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

本発明はまた、A C 1 0 および H e F i - 1 タンパク質、および機能的に活性な、すなわち、C D 3 0 への結合を示し、かつ、活性化リンパ球に対する細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼし得る、融合 / キメラなタンパク質を含む誘導体の免疫学的疾患の治療または予防のための使用に関する。

【 0 0 5 7 】

その使用が本発明によって包含される C D 3 0 の抗体は、ヒト抗体、キメラ抗体またはヒト化抗体、ならびに、化学療法剤などの細胞傷害性薬剤にコンジュゲートしたそのような抗体を含む。

【 0 0 5 8 】

本発明はさらに、本発明のタンパク質または核酸を単独でまたは細胞傷害性薬剤（化学療法剤を含むがこれに限定されない）と組み合わせて含む組成物を投与することを含む免疫学的疾患の治療または予防方法に関する。

10

【 0 0 5 9 】

開示を明瞭にするために、本発明の詳細な説明を以下のサブセクションに分けるが、これらは本発明を限定するものではない。

【 0 0 6 0 】

5 . 1 本発明のタンパク質

本発明は、C D 3 0 に結合し、活性化リンパ球に対し細胞静止作用および / または細胞傷害作用を及ぼすタンパク質（抗体を含むが、これに限定されない）の免疫学的疾患の治療のための使用を包含する。本発明はさらに、C D 3 0 への結合に関し A C 1 0 または H e F i - 1 と競合し、活性化リンパ球に対し細胞静止作用および / または細胞傷害作用を及ぼすタンパク質の免疫学的疾患の治療のための使用に関する。

20

【 0 0 6 1 】

本発明はさらに H e F i - 1 の C D R （配列番号 2 0 、配列番号 2 2 ；配列番号 2 4 ；配列番号 2 8 、配列番号 3 0 または配列番号 3 2 ）または A C 1 0 の C D R （配列番号 4 ；配列番号 6 ；配列番号 8 ；配列番号 1 2 ；配列番号 1 4 ；または配列番号 1 6 ）を含むタンパク質の免疫学的疾患の治療のための使用を包含する。

【 0 0 6 2 】

本発明はさらに、H e F i - 1 の可変領域（配列番号 1 8 または配列番号 2 6 ）または A C 1 0 の可変領域（配列番号 2 または配列番号 1 0 ）を含むタンパク質の免疫学的疾患の治療のための使用を包含する。各配列番号が対応する A C 1 0 または H e F i - 1 の領域を次表に示す。

30

(29)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【表 1】

表 1

分子	ヌクレオチドまたはアミノ酸	配列番号
AC10重鎖可変領域	ヌクレオチド	1
AC10重鎖可変領域	アミノ酸	2
AC10重鎖-CDR1 (H1)	ヌクレオチド	3
AC10重鎖-CDR1 (H1)	アミノ酸	4
AC10重鎖-CDR2 (H2)	ヌクレオチド	5
AC10重鎖-CDR2 (H2)	アミノ酸	6
AC10重鎖-CDR3 (H3)	ヌクレオチド	7
AC10重鎖-CDR3 (H3)	アミノ酸	8
AC10軽鎖可変領域	ヌクレオチド	9
AC10軽鎖可変領域	アミノ酸	10
AC10軽鎖-CDR1 (L1)	ヌクレオチド	11
AC10軽鎖-CDR1 (L1)	アミノ酸	12
AC10軽鎖-CDR2 (L2)	ヌクレオチド	13
AC10軽鎖-CDR2 (L2)	アミノ酸	14
AC10軽鎖-CDR3 (L3)	ヌクレオチド	15
AC10軽鎖-CDR3 (L3)	アミノ酸	16
HeFi-1重鎖可変領域	ヌクレオチド	17
HeFi-1重鎖可変領域	アミノ酸	18
HeFi-1重鎖-CDR1 (H1)	ヌクレオチド	19
HeFi-1重鎖-CDR1 (H1)	アミノ酸	20
HeFi-1重鎖-CDR2 (H2)	ヌクレオチド	21
HeFi-1重鎖-CDR2 (H2)	アミノ酸	22
HeFi-1重鎖-CDR3 (H3)	ヌクレオチド	23
HeFi-1重鎖-CDR3 (H3)	アミノ酸	24
HeFi-1軽鎖可変領域	ヌクレオチド	25
HeFi-1軽鎖可変領域	アミノ酸	26
HeFi-1軽鎖-CDR1 (L1)	ヌクレオチド	27
HeFi-1軽鎖-CDR1 (L1)	アミノ酸	28
HeFi-1軽鎖-CDR2 (L2)	ヌクレオチド	29
HeFi-1軽鎖-CDR2 (L2)	アミノ酸	30
HeFi-1軽鎖-CDR3 (L3)	ヌクレオチド	31
HeFi-1軽鎖-CDR3 (L3)	アミノ酸	32

【 0 0 6 3 】

本発明はさらに、AC10およびHeFi-1の機能的な誘導体または類似体の免疫学的疾患の治療のための使用を含む。本明細書で使用する場合、本発明のペプチドまたはタンパク質に関連して「機能的な」という用語は、ペプチドまたはタンパク質が1)CD3

10

20

30

40

50

(30)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

0 に結合することができ、2) リンパ球中の C D 3 0 シグナル伝達を誘導しかつ / または、活性化リンパ球に対し細胞静止作用および / または細胞傷害作用を及ぼし得ることを示す。

【 0 0 6 4 】

一般に、本発明の方法を実施するのに適する抗体は、免疫特異的に C D 3 0 に結合し、リンパ球中の C D 3 0 シグナル伝達を誘導し、かつ / または活性化リンパ球に対し細胞静止作用と細胞傷害作用を及ぼす。本発明の方法を実施するのに適する抗体は、好ましくは、モノクローナルであり、多重特異的でもよく、ヒト抗体、ヒト化抗体またはキメラ抗体、1 本鎖抗体、F a b 断片、F (a b ') 断片、F a b 発現ライブラリーによって産生される断片、および上記のいずれかの C D 3 0 結合断片である。本明細書で使用する場合、
「抗体」という用語は、免疫グロブリン分子および免疫グロブリン分子の免疫学的に活性な部分、すなわち、免疫特異的に C D 3 0 に結合する抗原結合部位を含む分子を指す。本発明の免疫グロブリン分子は、いずれのタイプの免疫グロブリン分子（例えば、I g G、I g E、I g M、I g D、I g A および I g Y）、クラス（例えば I g G 1、I g G 2、I g G 3、I g G 4、I g A 1 および I g A 2）またはサブクラスでもよい。

10

【 0 0 6 5 】

本発明のある実施形態では、抗体は、本発明のヒト抗原結合抗体断片であり、F a b、F a b' および F (a b ')₂、F d、1 本鎖 F v (s c F v)、1 本鎖抗体、ジスルフィド連結 F v (s d F v) および、V_L ドメインまたは V_H ドメインのいずれかを含む断片を含む（ただし、これらに限定されない）。1 本鎖抗体を含む抗原結合抗体断片は、可変領域（単数または複数）を単独でまたは次のもの、すなわちヒンジ領域、C H 1、C H 2、C H 3 および C L ドメイン、の全体または一部と組み合わせて含み得る。また、可変領域（単数または複数）とヒンジ領域、C H 1、C H 2、C H 3 および C L ドメインとの組合せを含む抗原結合断片も本発明に含まれる。好ましくは、抗体は、ヒト、ネズミ科動物（例えば、マウスおよびラット）、ロバ、ヒツジ、ウサギ、ヤギ、モルモット、ラクダ科の動物、ウマまたはニワトリである。本明細書で使用する場合、「ヒト」抗体は、ヒト免疫グロブリンのアミノ酸配列を有する抗体を含み、ヒト免疫グロブリンライブラリー、ヒト B 細胞、または 1 種または複数のヒト免疫グロブリンに組み換えられたトランスジェニック動物から単離された抗体を含む（下記または例えば、K u c h e r l a p a t i r a による米国特許第 5, 9 3 9, 5 9 8 号に記載されているものなど）。

20

30

【 0 0 6 6 】

本発明の方法を実施するのに適する抗体は単一特異的でもよいし、二重特異的、三重特異的、またはより多重特異的でもよい。多重特異性抗体は C D 3 0 の異なるエピトープに対して特異的でもよいしまたは C D 3 0 と異種起源のタンパク質の両方に対して特異的でもよい。例えば国際公開 W O 9 3 / 1 7 7 1 5 ; W O 9 2 / 0 8 8 0 2 ; W O 9 1 / 0 0 3 6 0 ; W O 9 2 / 0 5 7 9 3 ; T u t t r a、1 9 9 1、J . I m m u n o l . 1 4 7 : 6 0 ~ 6 9 頁 ; 米国特許第 4, 4 7 4, 8 9 3 号 ; 米国特許第 4, 7 1 4, 6 8 1 号 ; 米国特許第 4, 9 2 5, 6 4 8 号 ; 米国特許第 5, 5 7 3, 9 2 0 号 ; 米国特許第 5, 6 0 1, 8 1 9 号 ; K o s t e l n y r a、1 9 9 2、J . I m m u n o l . 1 4 8 : 1 5 4 7 ~ 1 5 5 3 頁参照のこと。本発明を実施するのに有用な二重特異的および三重特異的な抗体を含む多重特異性抗体は、C D 3 0 (モノクローナル抗体 K i - 2、K i - 4、K i - 5、K i - 7、B e r - H 2、H R S - 1、H R S - 4、K i - 1、K i - 6、M 6 7、K i - 3、M 4 4、H e F i - 1 および A C 1 0 の C D R および / または重鎖を有する抗体を含むが、これらに限定されない) とリンパ球表面受容体または受容体複合体（例えば、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、T N F 受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチン (C - タイプ、S - タイプまたは E - タイプ)、または補体制御タンパク質など) の両者に免疫特異的に結合する抗体である。こうした分子の例および二重特異性抗体を誘導できるこのような分子に対する抗体の例は、下記の 5 . 1 2 . 2 節で示す。好ましい実施形態では、リンパ球の細胞表面分子または分子複合体に対する多重特異性抗

40

50

(31)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

体部分の結合は、活性化リンパ球に細胞静止シグナルまたは細胞傷害シグナルを送達することにより、抗CD30抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強する。

【0067】

本発明のある特定の実施形態では、抗CD30抗体はアゴニスト抗体である。本発明の別の特定の実施形態では、抗CD30抗体は非アゴニスト抗体ではない。別の特定の実施形態では、抗CD30抗体は、CD30リガンドがCD30に結合することを妨げない。

【0068】

本発明の方法において有用な抗体は、それらが含む特定のCDRで記載または特定され得る。ある実施形態では、本発明の抗体は、AC10および/またはHeFi-1の1つまたは2以上のCDRを含む。本発明は、重鎖または軽鎖可変ドメインを含む抗体またはその誘導体の使用を包含する。ここで、前記可変ドメインは、(a)モノクローナル抗体AC10またはHeFi-1に由来する3個のCDRのセット、および(b)モノクローナル抗体AC10またはHeFi-1のフレームワーク領域とはそれぞれ異なる4つのフレームワーク領域のセットを含み、前記抗体またはその誘導体は免疫特異的にCD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすものである。

10

【0069】

特定の実施形態では、本発明は、重鎖可変ドメインを含む抗体またはその誘導体の免疫学的疾患を治療するための使用を包含する。ここで、前記可変ドメインは、(a)配列番号4、6または8を含む3個のCDRのセット、および(b)モノクローナル抗体AC10のフレームワーク領域とはそれぞれ異なる4つのフレームワーク領域のセットを含み、前記抗体またはその誘導体は免疫特異的にCD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす。

20

【0070】

特定の実施形態では、本発明は、重鎖可変ドメインを含む抗体またはその誘導体の免疫学的疾患を治療するための使用を包含する。ここで、前記可変ドメインは、(a)配列番号20、22または24を含む3個のCDRのセット、および(b)モノクローナル抗体HeFi-1のフレームワーク領域とはそれぞれ異なる4つのフレームワーク領域のセットを含み、前記抗体またはその誘導体は免疫特異的にCD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす。

30

【0071】

特定の実施形態では、本発明は、軽鎖可変ドメインを含む抗体またはその誘導体の免疫学的疾患を治療するための使用を包含する。ここで、前記可変ドメインは、(a)配列番号12、14または16を含む3個のCDRのセット、および(b)モノクローナル抗体AC10のフレームワーク領域とはそれぞれ異なる4つのフレームワーク領域のセットを含み、前記抗体またはその誘導体は免疫特異的にCD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす。

40

【0072】

特定の実施形態では、本発明は、軽鎖可変ドメインを含む抗体またはその誘導体の免疫学的疾患を治療するための使用を包含する。ここで、前記可変ドメインは、(a)配列番号28、30または32を含む3個のCDRのセット、および(b)モノクローナル抗体HeFi-1のフレームワーク領域とはそれぞれ異なる4つのフレームワーク領域のセットを含み、前記抗体またはその誘導体は免疫特異的にCD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす。

【0073】

さらに、本発明の方法の中で使用され得る抗体は、それらの1次構造によって記載また

50

(32)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

は特定され得る。可変領域およびA C 1 0またはH e F i - 1に少なくとも5 0 %、少なくとも5 5 %、少なくとも6 0 %、少なくとも6 5 %、少なくとも7 0 %、少なくとも7 5 %、少なくとも8 0 %、少なくとも8 5 %、少なくとも9 0 %、少なくとも9 5 %、最も好ましくは少なくとも9 8 %の同一性（当技術分野で知られており本明細書に記載する方法を使用して計算される）を有する抗体も、免疫学的疾患を治療するための本発明の方法に含まれ得る。本発明の方法において有用な抗体は、C D 3 0へのそれらの結合親和性によって記載または特定され得る。好ましい結合親和性は、 5×10^{-2} M、 10^{-2} M、 5×10^{-3} M、 10^{-3} M、 5×10^{-4} M、 10^{-4} M、 5×10^{-5} M、 10^{-5} M、 5×10^{-6} M、 10^{-6} M、 5×10^{-7} M、 10^{-7} M、 5×10^{-8} M、 10^{-8} M、 5×10^{-9} M、 10^{-9} M、 5×10^{-10} M、 10^{-10} M、 5×10^{-11} M、 10^{-11} M、 5×10^{-12} M、 10^{-12} M、 5×10^{-13} M、 10^{-13} M、 5×10^{-14} M、 10^{-14} M、 5×10^{-15} Mまたは 10^{-15} M未満の解離定数すなわちK dをもつものを含む。

【0074】

本発明の抗体、すなわち、免疫学的疾患の治療に有用な抗体は、改変された誘導体、すなわち、任意のタイプの分子が抗体に共有結合により結合したもの（ただし、共有結合による結合は、抗体のC D 3 0への結合を妨げず、または活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすことを妨げない）を含む。例えば、抗体誘導体は、例えば、グリコシル化、アセチル化、P E G化（p e g y l a t i o n）、リン酸化、アミド化、公知の保護基またはブロック基、タンパク質分解性切断、細胞リガンドもしくは他のタンパク質への結合などによる誘導体化などによって修飾された抗体を含む（ただし、これらに限定されない）。多数の化学的修飾のうちのいずれも、知られている技術によって行うことができ、そうしたものとしては、化学的切断、アセチル化、ホルミル化、ツニカマイシン（t u n i c a m y c i n）などの代謝合成が含まれるが、これらに限定されない。さらに、誘導体は1種または2種以上の非古典的アミノ酸を含んでもよい。

【0075】

免疫学的疾患の治療に使用可能な抗体は、当技術分野で知られている任意の適当な方法によって作製できる。当技術分野でよく知られた様々な手順によって、C D 3 0に対するポリクローナル抗体を生産することができる。例えば、C D 3 0をウサギ、マウス、ラットなど（ただし、これらに限定されない）を含む様々な宿主動物に投与し、タンパク質に特異的のポリクローナル抗体を含む血清の生産を誘導する。宿主種に応じて様々なアジュバントを用いて免疫応答を増大させてもよく、フロイント（F r e u n d）の（完全および不完全）アジュバント、水酸化アルミニウムなどの鉱物性ゲル、リゾレシチンなどの界面活性物質、プルロニック（p l u r o n i c）多価アルコール、ポリアニオン、ペプチド、油性乳剤、キーホール・リンペット・ヘモシアニン、ジニトロフェノール、およびB C G（B a c i l l e C a l m e t t e - G u e r i n）およびコリネ細菌パルブムなどの潜在的に有用なヒト・アジュバントが含まれる（ただし、これらに限定されない）。このようなアジュバントも、当技術分野でよく知られている。

【0076】

モノクローナル抗体は、ハイブリドーマ、組換え体およびファージディスプレイ技術の使用を含む、知られている種々様々の技術、またはその組合せを使用して作製できる。例えば、モノクローナル抗体は、当技術分野で知られており、例えば、H a r l o wら、A n t i b o d i e s : A L a b o r a t o r y M a n u a l、（C o l d S p r i n g H a r b o r L a b o r a t o r y P r e s s、2版、1988）；H a m m e r l i n gら、in: M o n o c l o n a l A n t i b o d i e s a n d T - C e l l H y b r i d o m a s 563～681頁（E l s e v i e r、N . Y .、1981）（これらは参照によってその全体が本願明細書に組み入れられる）によって教示されているものを含むハイブリドーマ技術を使用し生産することができる。本願明細書で用いる場合、「モノクローナル抗体」という用語はハイブリドーマ技術によって生産された抗体に限定されない。「モノクローナル抗体」という用語は、任意の真核生物、原核生物ま

10

20

30

40

50

(33)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

たはファージクローンを含む、単一クローンに由来する抗体を指し、それが生産される方法ではない。

【0077】

ハイブリドーマ技術を使用して特異的抗体を生産およびスクリーニングする方法は、当技術分野においてルーチンになされるものでよく知られている。限定的な例ではないが、マウスはCD30またはCD30を発現する細胞またはその断片もしくは誘導体によって免疫感作することができる。免疫応答が検出された後、例えば、CD30に特異的な抗体がマウス血清中に検出された後、マウスの脾臓を採取して脾臓細胞を分離する。次いで、よく知られた技術によって、脾臓細胞を任意の適当なミエローマ細胞（例えば、ATCCから入手可能な細胞系統SP20由来の細胞）に融合する。ハイブリドーマを選択し、限界希釈によってクローン化する。次いで、ハイブリドーマクローンを、CD30に結合可能な活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼし得る抗体を分泌する細胞について当技術分野で知られている方法によってアッセイする。腹水（これは一般に高レベルの抗体を含む）は陽性ハイブリドーマクローンをマウスに注入することにより生成できる。

【0078】

特定のエピトープを認識する抗体断片は知られた技術によって作製し得る。例えば、本発明のFabと、F(ab')₂断片は、パパイン（Fab断片を生じる）またはペプシン（F(ab')₂断片を生じる）などの酵素を使用した、免疫グロブリン分子のタンパク質分解的切断によって生成され得る。F(ab')₂断片は、可変領域、軽鎖定常領域および重鎖のCH1ドメインを含む。

【0079】

例えば、本発明の方法において有用な抗体は、当技術分野で知られている様々なファージディスプレイ法を使用して作製することができる。ファージディスプレイ法では、機能的な抗体領域が、それらをコードする核酸配列を保有するファージ粒子の表面に提示される。特定の実施形態では、そのようなファージは、レパートリーすなわちコンビナトリアルな抗体ライブラリー（例えばヒトまたはネズミ科）から発現する抗原結合ドメインを提示するために利用することができる。ファージディスプレイ法では、機能的な抗体ドメインは、それらをコードする核酸配列を保有するファージ粒子の表面に提示される。特に、V_HまたはV_LドメインをコードするDNA配列が、動物のcDNAライブラリー（例えば、ヒトまたはネズミ科のリンパ系組織のcDNAライブラリー）から増幅される。V_HまたはV_LドメインをコードするDNA配列は、PCRによってscFvリンカーと共に組み換えによって得られ、ファージミッド・ベクター（例えば、pCANTAB 6またはpComb 3 HSS）中にクローン化される。ベクターは大腸菌中にエレクトロポレートされ、大腸菌にヘルパーファージを感染させる。これらの方法で使用されるファージは、典型的には線状ファージであり、Fab、Fvまたはジスルフィド安定化Fv抗体ドメイン（遺伝子組み換えによりファージ遺伝子IIIまたは遺伝子VIIIIタンパク質のいずれかに融合される）と共に、ファージから発現されるfdおよびM13結合ドメインを含む。CD30またはそのAC10もしくはHeFi-1結合部分に結合する抗原結合ドメインを発現するファージは、抗原、例えば、標識された抗原または固体の表面もしくはビーズに固定された抗原を使用して選択または識別できる。本発明の抗体の製造に使用することができるファージディスプレイ法の例は、Brinkmanら、1995、J. Immunol. Methods 182: 41~50頁；Amesら、1995、J. Immunol. Methods 184: 177~186頁；Kettlboroughら、1994、Eur. J. Immunol. 24: 952~958頁；Persicら、1997、Gene 187: 9~18頁；Burtonら、1994、Advances in Immunology, 191~280頁；国際特許出願PCT/GB 91/01134；国際公開WO90/02809；WO91/10737；WO92/01047；WO92/18619；WO93/11236；WO95/15982；WO95/20401；および米国特許第5,698,426号；米国特許第5,223,

10

20

30

40

50

(34)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

409号；米国特許第5,403,484号；米国特許第5,580,717号；米国特許第5,427,908号；米国特許第5,750,753号；米国特許第5,821,047号；米国特許第5,571,698号；米国特許第5,427,908号；米国特許第5,516,637号；米国特許第5,780,225号；米国特許第5,658,727号；米国特許第5,733,743号および米国特許第5,969,108号に開示されているものなどである。これらはいずれも参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる。

【0080】

上記の参照文献に記載されているように、ファージ由来の抗体コード領域は、ファージ選択後に分離し、ヒト抗体を含む全抗体または他の任意の所望の抗原結合断片を作製するのに使用することができ、例えば、下記に詳細に記載するように任意の所望の宿主（哺乳類細胞、昆虫細胞、植物細胞、酵母および細菌を含む）中で発現させることができる。例えば、国際公開WO92/22324；Mullinaxら、BioTechniques 1992、12(6)：864～869頁；およびSawaiら、1995、AJRI 34：26～34頁；およびBetterら、1988、Science 240：1041～1043頁に開示されるような当技術分野で知られた方法を用い、Fab、Fab' またはF(ab')₂断片を組み換えにより作製する技術を使用することができる。（これらは参照によってその全体が本明細書に組み入れられる）。

【0081】

1本鎖Fvsおよび抗体を生産するために使用することができる技術の例としては、米国特許第4,946,778号および米国特許第5,258,498号；Houstonら、1991、Methods in Enzymology 203：46～88頁；Shuら、1993、PNAS 90：7995～7999頁；およびSkerraら、1988、Science 240：1038～1040頁が挙げられる。ヒトでのin vivoでの抗体の使用およびin vitroでの増殖または細胞傷害性アッセイを含むいくつかの用途については、キメラ抗体、ヒト化抗体またはヒト抗体を使用することが好ましい。キメラ抗体は、例えば、ネズミ科のモノクローナル抗体およびヒト免疫グロブリン定常領域に由来する可変領域を有する抗体など、抗体の異なる部分が異なる動物種に由来する分子である。キメラ抗体を生産する方法は、当技術分野で知られている。例えば、Morrison、Science、1985、229：1202；Oiら、1986、BioTechniques 4：214；Gilliesら、1989、J. Immunol. Methods 125：191～202頁；米国特許第5,807,715号；米国特許第4,816,567号；および米国特許第4,816,397号参照のこと（これらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）。ヒト化抗体は、非ヒト種抗体由来の抗体分子であり、非ヒト種由来の1つまたは複数のCDRおよびヒト免疫グロブリン分子のフレームワークおよび定常領域を有する所望の抗原を結合するものである。しばしば、ヒトフレームワーク領域中のフレームワーク残基は、変更すべきCDRドナー抗体由来の対応する残基で置換され、好ましくは抗原結合性を改善する。これらのフレームワーク置換は当技術分野においてよく知られた方法によって同定され、例えば、CDRとフレームワーク残基の相互作用をモデル化することによって、抗原結合にとって重要なフレームワーク残基が同定され、配列比較によって特定位置での非一般的なフレームワーク残基が同定される（例えば、Queenら、米国特許第5,585,089号；Riechmanら、1988、Nature 332：323参照のこと。これらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）。抗体は、例えば、CDRグラフトイング（欧州特許第239,400号；国際公開WO91/09967；米国特許第5,225,539号；米国特許第5,530,101号；および米国特許第5,585,089号）、ベニアリング（veneer ing）、リサーフェイシング（resurfacing）（欧州特許第592,106号；欧州特許第519,596号；Padlan、Molecular Immunology、1991、28(4/5)：489～498頁；Studnickaら、1994、Protein Engineering 7

10

20

30

40

50

(35)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

(6) : 805 ~ 814 頁 ; Roguska . ら、1994、PNAS 91 : 969 ~ 973 頁) およびチェイン・シャフリング (米国特許第 5 , 565 , 332 号) を含む当技術分野で知られた様々な技術を用いてヒト化することができる。

【0082】

ヒト患者の治療には完全なヒト抗体が特に望ましい。ヒト免疫グロブリン配列に由来する抗体ライブラリーを用いて上記のファージディスプレイ法を含む、知られた様々な方法によってヒト抗体を作製できる。さらに米国特許第 4 , 444 , 887 号および米国特許第 4 , 716 , 111 号 ; また国際公開 WO 98 / 46645、WO 98 / 50433、WO 98 / 24893、WO 98 / 16654、WO 96 / 34096、WO 96 / 33735 および WO 91 / 10741 参照のこと。これらのいずれもが参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる。

10

【0083】

ヒト抗体は、ヒト免疫グロブリン遺伝子を発現するトランスジェニックマウスを使用して産生することもできる。例えば、ヒト重鎖および軽鎖の免疫グロブリン遺伝子複合体を、マウスの胚性幹細胞中にランダムにまたは相同的組み換えによって導入することができる。マウスの重鎖および軽鎖免疫グロブリン遺伝子は、相同的組み換えによってヒト免疫グロブリン遺伝子座の導入と別にまたは同時に非機能化することができる。特に、JH 領域の同型接合体欠失は内生的な抗体産生を妨げる。キメラなマウスを生産するためには、改変した胚性幹細胞を増殖させて胚盤胞中に顕微注入する。次いで、キメラマウスを交配させて、ヒト抗体を発現する同型接合体の子孫を生じさせる。選択された抗原 (例えば、CD30 のすべてまたは一部) によってトランスジェニックマウスを通常の方法で免疫する。抗原に対するモノクローナル抗体は、慣用のハイブリドーマ技術を使用して、免疫化したトランスジェニックマウスから得ることができる。トランスジェニックマウスが保有するヒト免疫グロブリン遺伝子は、B 細胞分化の間に再構成され、続いてクラススイッチングおよび体細胞変異を受ける。したがって、このような技術を使用して、治療上有用な IgG、IgA、IgM および IgE 抗体を生産することが可能である。ヒト抗体を生産するためのこの技術の概説については、Lonberg と Huszar、1995、Int. Rev. Immunol. 13 : 65 ~ 93 頁参照のこと。ヒト抗体およびヒトモノクローナル抗体を生産するためのこの技術の詳細な議論およびそのような抗体を生産するためのプロトコルについては、例えば、国際公開 WO 98 / 24893 ; WO 92 / 01047 ; WO 96 / 34096 ; WO 96 / 33735 ; 欧州特許第 0 , 598 , 877 号 ; 米国特許第 5 , 413 , 923 号 ; 米国特許第 5 , 625 , 126 号 ; 米国特許第 5 , 633 , 425 号 ; 米国特許第 5 , 569 , 825 号 ; 米国特許第 5 , 661 , 016 号 ; 米国特許第 5 , 545 , 806 号 ; 米国特許第 5 , 814 , 318 号 ; 米国特許第 5 , 885 , 793 号 ; 米国特許第 5 , 916 , 771 号 ; および米国特許第 5 , 939 , 598 号 (これらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる) を参照のこと。さらに、アブジェニクス (Abgenix) 社 (カリフォルニア州フリーモント所在 (Freemont, CA) およびメダレックス (Medarex) (ニュージャージー州プリンストン所在 (Princeton, NJ) などの会社は、上に記載したのと同様の技術を用いて、選択された抗原に対するヒト抗体の提供を行っている。

20

30

40

【0084】

選択されたエピトープを認識する完全なヒト抗体は「ガイドされた選択」と呼ばれる技術を使用して作製することができる。このアプローチでは、選択された非ヒト・モノクローナル抗体 (例えば、マウス抗体) を用いて、同じエピトープを認識する完全なヒト抗体の選択をガイドする (Jespersen ら、1994、Bio/technology 12 : 899 ~ 903 頁)。

【0085】

さらに、CD30 に対する抗体はその後、当業者によく知られた技術 (例えば、Green span と Bona、1989、FASEB J. 7 (5) : 437 ~ 444 頁 ; および Nissinoff、1991、J. Immunol. 147 (8) : 2429 ~ 2

50

(36)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

438頁参照)を使用して、本発明のタンパク質を「模倣する」抗イディオタイプ抗体を作製するのに利用できる。このような抗イディオタイプのFab断片は、活性化リンパ球上に存在するCD30に対する個体自身の免疫反応を誘発する治療レジメに使用することができる。

【0086】

上に示唆されるように、活性化リンパ球に対して治療または予防に有用なタンパク質は抗体である必要はない。したがって、本発明のタンパク質は、CD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対して細胞傷害作用および/または細胞静止作用を及ぼす抗体に由来する1つまたは2つ以上のCDRを含むことができる。好ましくは、本発明のタンパク質は多量体であり、最も好ましくは二量体である。本明細書で使用する場合、「本発明のタンパク質」は、CD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対して細胞傷害作用および/または細胞静止作用を及ぼす抗体を含むが、これに限定されない。

10

【0087】

本発明はまた、タンパク質を使用して免疫学的疾患を治療する方法であって、このタンパク質としては抗体を含み(ただし、これに限定されない)、当技術分野で知られている競合的結合の決定のための任意の方法(例えば、本明細書に記載された免疫測定法)によって決定されるCD30に対するAC10またはHeFi-1の結合を競合的に阻害するものである。好ましい実施形態では、タンパク質は、CD30へのAC10またはHeFi-1の結合を少なくとも50%、より好ましくは少なくとも60%、さらに好ましくは少なくとも70%、最も好ましくは少なくとも75%、競合的に阻害する。他の実施形態では、タンパク質は、CD30へのAC10またはHeFi-1の結合を少なくとも80%、少なくとも85%、少なくとも90%または少なくとも95%、競合的に阻害する。

20

【0088】

以下により詳細に論じるように、本発明は、活性化リンパ球に結合しリンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす抗体を含むタンパク質を使用して、免疫学的疾患を治療する方法を提供する。タンパク質は、免疫学的疾患の予防または治療において、単独でまたは他の組成物と組み合わせて投与することができる。タンパク質は、N末端またはC末端で異種起源のタンパク質に組み換えにより融合してもよいし、細胞傷害性薬剤、タンパク質または他の組成物に化学的に(共有結合的および非共有結合的コンジュゲーションを含む)コンジュゲートする。例えば、本発明の抗体は、化学療法または毒素として有用な分子に組み換えにより融合してもよいし、またはコンジュゲートしてもよいし、放射線療法として使用するための放射性核種を含む。例えば国際公開WO92/08495; WO91/14438; WO89/12624; 米国特許第5,314,995号; および欧州特許EP396,387号を参照のこと。

30

【0089】

本発明の方法において有用なタンパク質は、異種のタンパク質をコードする配列と共に本発明の抗体のCDRの1つまたは複数のコード領域を同一枠内で組み換えにより融合させることにより生産できる。異種のタンパク質は、次の1つまたは複数の特徴、すなわち治療上の利点の追加; 安定した発現の促進; 高収率での組み換え体発現を促進する手段の提供; または、多量体化ドメインの提供を提供し得る。

40

【0090】

CD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/またはリンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす抗体の1つまたは複数のCDRを含むタンパク質に加えて、本発明の治療方法において有用なタンパク質は、タンパク質-タンパク質相互作用についてスクリーニングするのに適する任意の方法を用いて同定することができる。まず、CD30に結合するタンパク質が同定され、次いで、活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすそれらの能力を決定することができる。使用することができる慣用法の中には、上記λgt11ライブラリーの抗体プロービング技術と同様のやり方で標識されたCD30を用いて発現ライブラリーのプロービングを行

50

(37)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

う「相互作用クローニング」技術がある。例としては、これは以下のように達成することができる（ただし、これに限定されない）。すなわち、CD30（またはそのAC10またはHeFi-1結合ドメイン）をコードするcDNAクローンを、心筋キナーゼ（HK）（Blananar & Rutter, 1992, Science 256:1014~1018頁）用のリン酸化部位の挿入により末端で改変することである。組み換えタンパク質を大腸菌中で発現させ、GDP親和性カラムで均質になるまで精製し（Ederlyら、1988, Gene 74:517~525頁）、 $\gamma^{32}\text{P}$ -ATPおよびウシ心筋キナーゼ（シグマ（Sigma））を比活性 $1 \times 10^8 \text{ cpm}/\mu\text{g}$ まで用いて標識し、「ファー-ウエスタンアッセイ」（BlananarとRutter, 1992, Science 256:1014~1018頁）においてヒト胎盤 $\lambda \text{gt}11$ cDNAライブラリーのスクリーニングに用いる。CD30プローブと相互作用するブランクを単離する。陽性 λ ブランクのcDNAインサートを放出させ、pBluescript KS（ストラタジーン（Stratagene））などの配列決定に適するベクター中にサブクローニングする。

10

【0091】

タンパク質相互作用を*in vivo*で検出する1つの方法、2-ハイブリッドシステムについて、詳細に説明するが、これは単に例示のためにすぎず、本発明を限定するものではない。このシステムの1つのバージョンは文献に記載されており（Chienら、1991, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88:9578~9582頁）、クローンテック（Clontech）（（カリフォルニア州パロアルト所在）（Palo Alto, CA）から市販されている。

20

【0092】

CD30-結合タンパク質が同定した後、活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を誘発するその能力（単独で、または二量体または多量体ドメインに多量化されるか融合されたとき）を、下記5.7節に記載された方法によって決定する。

【0093】

作用メカニズムに関して限定するものではないが、CD30に結合し、リンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすタンパク質は、好ましくは2以上のCD30-結合部位を有し、したがって活性化リンパ球表面上のCD30分子と架橋する能力を有する。CD30と結合するか、AC10またはHeFi-1とCD30との結合に対して競合するタンパク質は、二量体化または多量体化すれば、活性化リンパ球に対する細胞静止作用または細胞傷害作用を誘導する能力を獲得し得る。CD30-結合タンパク質がモノマーのタンパク質である場合、それは連なって（*in tandem*）発現することができ、それにより、多重のCD30結合部位を有するタンパク質が得られる。CD30結合部位は柔軟なリンカー領域により分離することができる。別の実施形態では、CD30結合タンパク質は、投与する前に、例えば、グルタルアルデヒドを使用して化学的に架橋することもできる。好ましい実施形態では、CD30結合領域を異種起源のタンパク質（ここで、異種起源のタンパク質は二量体化ドメインと多量体化ドメインを含む）と融合される。免疫学的疾患を治療または予防するために被験体に本発明のタンパク質を投与する前に、そのようなタンパク質をホモ二量体またはヘテロ二量体を形成する条件に曝露する。本明細書で使用する場合、ヘテロ二量体は、同一の二量体領域だが異なるCD30結合領域、同一のCD30結合領域だが異なる二量体化領域、または異なるCD30結合領域と異なる二量体化領域、を含み得る。

30

40

【0094】

特に好ましい二量体化領域は転写因子に由来するものである。

【0095】

1つの実施形態では、二量体化領域は塩基性領域ロイシンジッパー（「bZIP」）のそれである。bZIPタンパク質は特徴的には2つのドメインを有する。ロイシンジッパーの構造ドメインおよび塩基性アミノ酸に富んだ塩基性ドメインであり、これらは「フォ

50

(38)

JP 2005-511627 A 2005.4.28

ーク」ドメインによって隔てられている(C. Vins onら、1989、Science、246:911~916頁)。2つのbZIPタンパク質は、コイルド・コイル領域(そこではロイシンジッパードメインが二量体化している)の形成により二量体化する。したがって、これらのコイルド・コイル領域は、本明細書に記載する治療方法において有用なタンパク質に対する融合パートナーとして使用してもよい。

【0096】

特に有用なロイシンジッパードメインは、酵母転写因子GCN4、哺乳類の転写因子CAAT/エンハンサー結合タンパク質C/EBP、および、癌遺伝子における核形質転換、FosおよびJun(Landschultzら、1988、Science 240:1759~1764頁; BaxevanisとVinson、1993、Curr. Op. Gen. Devel., 3:278~285頁; およびO'Sheaら、1989、Science、243:538~542頁参照)のものである。

10

【0097】

別の実施形態では、二量体化ドメインは、塩基性-領域ヘリックス-ループ-ヘリックス(「bHLH」)タンパク質(Murreら、1989、Cell、56:777~783頁)である。bHLHタンパク質も個別のドメインからなり、それらはこの構造を採ることにより、特定のDNAの配列を認識し相互作用することが可能になる。ヘリックス-ループ-ヘリックス領域はbZIPタンパク質のロイシンジッパー領域の場合と同様に、その両親媒性の螺旋を通して二量化を促進する(Davisら、1990 Cell、60:733~746頁; VoronovaとBaltimore、1990 Proc. Natl. Acad. Sci. USA、87:4722~4726頁)。特に有用なbHLHタンパク質はmyc、maxおよびmacである。

20

【0098】

ヘテロ二量体は、FosとJunの間で(Bohmannら、1987、Science、238:1386~1392頁)、ATF/CREBファミリーのメンバー間で(Halra、1989、Genes Dev., 3:2083~2090頁)、C/EBPファミリーのメンバー間で(Caoら、1991、Genes Dev., 5:1538~1552頁; Williamsら、1991、Genes Dev., 5:1553~1567頁; およびRomanら、1990、Genes Dev., 4:1404~1415頁)およびATF/CREBファミリーとFos/Junファミリーのメンバー間で(HaiとCurran、1991、Proc. Natl. Acad. Sci. USA、88:3720~3724頁)で形成されることが知られている。したがって、本発明のタンパク質を異なる二量体化ドメインを含むヘテロ二量体として被験体に投与する場合、上記の任意の組合せが使用できる。

30

【0099】

好ましい態様では、本発明のタンパク質は、本発明の抗体-薬剤コンジュゲートを含み(ただし、これに限定されない)、実質的に純粋である(例えば、その効果を制限するか、望ましくない副作用を生じる物質を実質的に含まない)。ある特定の実施形態では、本発明のタンパク質は純度40%、より好ましくは、純度約50%、最も好ましくは純度約60%である。ある特定の実施形態では、本発明のタンパク質はおよそ60~65%、65~70%、70~75%、75~80%、80~85%、85~90%、90~95%または95~98%の純度である。別の特定の実施形態では、本発明のタンパク質はおよそ99%の純度である。

40

【0100】

5.1.1 AC10またはHeFi-1遺伝子の単離

本発明はAC10またはHeFi-1核酸の、例えば、免疫学的疾患の遺伝子治療のための、または抗体分子の組み換え発現(これは免疫学的疾患の治療のための使用となり得る)のための使用に関する。したがって、本発明は、AC10またはHeFi-1遺伝子配列の少なくとも8個のヌクレオチド(すなわち、ハイブリダイズさせることができる部分)からなる、精製された核酸を提供する。他の実施形態では、核酸は、AC10または

50

(39)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

H e F i - 1 配列の少なくとも 25 個の（連続する）ヌクレオチド、50 個のヌクレオチド、100 個または 200 個のヌクレオチドまたは A C 10 もしくは H e F i - 1 可変領域をコードする配列の全長からなる。同一または他の実施形態では、核酸は 50 個、75 個、100 個、または 200 個、または 5000 個未満の長さのヌクレオチドである。核酸は 1 本鎖でもよいし 2 本鎖でもよい。本発明はまた、前述の配列またはそれらの逆相補鎖にハイブリダイズさせることができるか相補的な核酸、特に、C D 30 に結合するか、C D 30 への結合について A C 10 または H e F i - 1 と競合し、かつ / または、C D 30 への C D 30 リガンドの結合を少なくとも 45 %、50 %、60 % または 65 % 増加させるタンパク質をコードするそうした核酸に関する。具体的態様では、A C 10 または H e F i - 1 可変領域遺伝子の少なくとも 10、25、50、100 または 200 個ヌクレオチドまたはコード領域全体に相補的な配列を含む核酸が提供される。

10

【0101】

A C 10 または H e F i - 1 タンパク質の誘導体および類似体をコードする核酸も、さらに提供される。

【0102】

5.1.2 クローニング操作

A C 10 または H e F i - 1 核酸のクローニングのための特定の実施形態は以下の通りである。特定の実施形態では、全 RNA を、m A b A C 10 または H e F i - 1 産生ハイブリドーマから単離し、ポリメラーゼ連鎖反応を用い、本明細書に示す配列に基づいたプライマーを使用して、所望の可変領域配列を増幅する。別の例としては、m RNA を m A b A C 10 または H e F i - 1 産生ハイブリドーマから単離し、c DNA を調製し、それを導入した宿主細胞によって発現され得るように、発現ベクター（例えば、バクテリオファージ誘導体）にライゲートする。次いで、発現産物について選択するために様々なスクリーニング・アッセイを使用することができる。1 つの実施形態では、選択は、A C 10 または H e F i - 1 遺伝子の一部、またはその RNA またはそれらの断片を表わす標識されたプローブへのハイブリダイゼーションに基づく（B e n t o n と D a v i s、1977、S c i e n c e 196:180、G r u n s t e i n と H o g n e s s、1975、P r o c . N a t l . A c a d . S c i . U . S . A . 72:3961）。プローブと実質的な相同性をもつそのような DNA 断片はハイブリダイズするであろう。制限酵素消化および（公知の制限地図が利用できる場合は）断片サイズをそうした制限地図によって予想したものと比較することによって、適当な断片を同定することも可能である。遺伝子の特性に基づいてさらに選択を行うこともできる。

20

30

【0103】

あるいは、所望の遺伝子の存在は、その発現産物の物理的特性、化学的特性、または免疫学的特性に基づくアッセイによって検出し得る。例えば、c DNA クローン、すなわち適当な m RNA をハイブリッド選択する DNA クローンは、例えば、A C 10 または H e F i - 1 タンパク質について知られているのと同様もしくは同一の電気泳動移動度、等電点電気泳動での挙動、タンパク質分解消化地図、および機能的な活性を有するタンパク質を生産するように選択し発現させることができる。例えば、C D 30 結合能力は E L I S A（酵素免疫測定吸着法）タイプの操作において検出することができる。

40

【0104】

核酸のハイブリダイゼーション後、i n v i t r oでの翻訳を用いて m RNA 選択により、A C 10 または H e F i - 1 遺伝子を同定することもできる。この操作では、断片を用いてハイブリダイゼーションによって相補的 m RNA を単離する。単離した m RNA の分離産物の i n v i t r oでの翻訳産物の機能的な分析（例えば、C D 30 への結合など）により、m RNA、したがって所望の配列を含む相補的な DNA 断片が同定される。

【0105】

別の実施形態では、A C 10 または H e F i - 1 核酸、最も好ましくは重鎖もしくは軽鎖の可変領域または重鎖もしくは軽鎖の C D R をコードする A C 10 または H e F i - 1

50

(40)

JP 2005-511627 A 2005.4.28

核酸を本明細書に開示する配列から化学的に合成することができる。例えば、当技術分野で知られている標準的方法、例えば、自動DNAシンセサイザー（それらはバイオサーチ（Biosearch）、アプライド・バイオシステムズ（Applied Biosystems）などから市販されている）を使用することによってAC10およびHeFi-1配列を合成することができる。あるいは、AC10またはHeFi-1核酸は、例えば、ブルー・ヘロン・バイオテクノロジー（Blue Heron Biotechnology）（ワシントン州ボッセル所在（Bothell, Washington））またはキアゲン（QIAGEN）社（カリフォルニア州バレンシア所在（Valencia, California））による商業的に利用可能なサービスによって合成することもできる。当業者に知られている、AC10またはHeFi-1遺伝子を単離する他の方法を使用することもできる。

10

【0106】

単離されたAC10またはHeFi-1核酸（例えば、AC10もしくはHeFi-1または1種または複数のそれらのCDRもしくは可変領域をコードする核酸）は、次いで、適当なクローニングベクター中に挿入することができる。当技術分野で知られている多数のベクター-宿主システムを使用することができる。可能なベクターは、プラスミドや改変ウイルスを含むが、これらに限定されない。ただし、ベクター・システムは使用されている宿主細胞と適合性を有しなければならない。そのようなベクターは、ラムダ誘導体などのバクテリオファージ、PBR322またはpUCのプラスミド誘導体またはBlue scriptベクター（ストラタジーン（Stratagene））などのプラスミドを含む（ただし、これらに限定されない）。クローニングベクター中への挿入は、例えば、相補的な付着末端を有するクローニングベクター中へDNA断片を結合することにより実施できる。しかし、DNAを断片とするために用いられる相補的な制限部位がクローニングベクター中に存在しない場合、DNA分子の末端を酵素で修飾してもよい。あるいは、DNA末端にヌクレオチド配列（リンカー）を結合することにより、所望の任意の部位を作製することもできる。これらの結合されるリンカーには、制限エンドヌクレアーゼ認識配列をコードする、特定の化学的に合成されたオリゴヌクレオチドを含めてもよい。別の方法では、切断されたベクターおよびAC10またはHeFi-1遺伝子を、ホモポリマー尾付加または適当な配列を含むプライマーによるPCRによって改変してもよい。組み換え分子は、形質転換、トランスフェクション、感染、エレクトロポレーションなどによって宿主細胞へ導入できる。その結果、遺伝子配列の多くのコピーを生成する。AC10またはHeFi-1に由来する1個または複数のCDRならびに異なる免疫グロブリン分子に由来するフレームワーク領域を含む抗体は、例えば、CDRグラフティング（欧州特許第239,400号；国際公開WO91/09967；米国特許第5,225,539号；米国特許第5,530,101号；および米国特許第5,585,089号）、ベニアリング（veneer ing）またはリサーフェイシング（resurfacing）（欧州特許第592,106号；欧州特許第519,596号；Padlan、Molecular Immunology、1991、28（4/5）：489～498頁；Studnickaら、1994、Protein Engineering 7（6）：805～814頁；Roguskaら、1994、PNAS 91：969～973頁）およびチェーン・シャフリング（米国特許第5,565,332号）を含む当技術分野で知られた様々な技術を用いて製造することができる。

20

30

40

【0107】

本発明の好ましい実施形態では、AC10またはHeFi-1核酸、例えばAC10またはHeFi-1の重鎖または軽鎖の可変領域をコードする核酸を、免疫グロブリン発現ベクター中にクローン化することができる。簡単に言えば、AC10またはHeFi-1核酸は、本願明細書に記載する方法のうちの任意の方法によって合成あるいは取得され、好ましくは、側部に適当な制限部位を有し、次いで、免疫グロブリン分子の発現に適するベクター中にクローン化される。例えば、同一枠内に、プロモーターに作動可能に連結される抗体可変領域をクローニングするのに適した免疫グロブリン定常領域および制限部位

50

(41)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

をコードする配列、および場合によっては所望の宿主細胞中での発現に有用なシグナル配列を含む多数のベクターが文献に記載されている。この目的のために設計されるベクターの例(ただし、限定的なものではない)は、McLeanら、2000、Mol Immunol. 37(14): 837~45頁; Liangら、2001、J. Immunol Methods 247(1-2): 119~30頁; Persicら、1997、Gene 187(1): 9~18頁; Skerraら、1994、Gene 141(1): 79~84頁; Wallisら、1993、Nucleic Acids Res 21(12): 2921~29頁; Colomaら、1992、J. Immunol. Methods 152(1): 89~104頁に記載されている。これらのベクターまたは同様に設計されるベクターは、発現目的用のAC10およびHeFi-1配列のクローン化に使用することができる。

10

【0108】

別の方法では、所望の遺伝子を、「ショットガン」法において適当なクローニングベクター中に挿入した後に同定し単離してもよい。例えば、クローニングベクターへ挿入前にサイズ分画によって所望の遺伝子の富化を行うことができる。

【0109】

特定の実施形態では、単離されたAC10またはHeFi-1遺伝子を組み込んだ組み換えDNA分子、cDNA、または合成DNA配列を有する宿主細胞の形質転換体が、遺伝子の複数のコピーの生成を可能にする。したがって、形質転換体を増殖させ、形質転換体から組み換えDNA分子を分離し、また必要な場合には、単離された組み換えDNAから挿入された遺伝子を回収することにより遺伝子が多量に得られ得る。

20

【0110】

本発明によって提供されるAC10またはHeFi-1配列は、天然のAC10またはHeFi-1可変領域に見出されるのと実質的に同一のアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列、機能的に等価なアミノ酸をもつアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列、ならびに、以下に、AC10またはHeFi-1誘導体または類似体について記載するような他のAC10またはHeFi-1誘導体または類似体をコードするヌクレオチド配列を含む。

【0111】

5.2 結合アッセイ

上に記載するように、本発明の方法による免疫学的疾患の治療に有用な抗体を含むタンパク質は、CD30に結合し、活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす。タンパク質のCD30への結合能力を実証する方法は本願明細書に記載する。

30

【0112】

抗体は、当技術分野で知られている任意の方法によってCD30への免疫特異的な結合についてアッセイを行うことができる。使用することができる免疫アッセイをいくつか挙げると、ウェスタンブロット、ラジオイムノアッセイ、ELISA(酵素結合免疫吸着法)、「サンドイッチ」免疫測定法、免疫沈降アッセイ、沈降反応、ゲル拡散沈降反応、免疫拡散アッセイ、凝集反応アッセイ、補体結合アッセイ、免疫放射定量測定法、蛍光免疫測定法、プロテインA免疫測定法などを含む競合的および非競合的アッセイシステムが含まれるが、これらに限定されるものではない。これらのアッセイは、当技術分野では日常的に行われるものでよく知られている(例えば、Ausubelら編、1994、Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1, John Wiley & Sons, Inc., New York参照のこと。これは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる)。典型的な免疫測定法を以下に簡単に説明するが、これらは発明を限定しようとするものではない。

40

【0113】

免疫沈殿プロトコルは、一般に、タンパク質ホスファターゼおよび/またはプロテアーゼ阻害剤(例えば、EDTA、PMSF、アプロチニン(aprotinin)、パナジン酸ナトリウム)を添加したRIPA緩衝液(1%NP-40またはトライトンX-10

50

(42)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

0、1%デオキシコール酸ナトリウム、0.1%SDS、0.15MNaCl、0.01Mリン酸ナトリウム(pH7.2)、1%トラシロール(Trasyolol)などの溶解緩衝液で細胞集団を溶解させ、細胞溶解物に抗体を加えて、一定時間(例えば、約1~4時間)4℃でインキュベートし、プロテインAおよび/またはプロテインGセファロースビーズを細胞溶解物に加え、約1時間以上4℃でインキュベートし、ビーズを溶解緩衝液で洗浄し、ビーズをSDS/試料緩衝液中に再懸濁することを含む。抗体がCD30を免疫沈殿させる能力は、例えば、ウェスタンブロット分析によって評価することができる。当業者は、CD30への抗体の結合を増加させ、バックグラウンド(例えば、セファロースビーズを用いる細胞溶解物の予備清浄化)を低減させるために変更できるパラメーターに関してよく知っているであろう。免疫沈殿プロトコルに関するさらなる議論については、例えばAusubelら編、1994、Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1 (John Wiley & Sons, Inc., New York)の10.16.1を参照のこと。

10

【0114】

ウェスタンブロット分析は、タンパク質試料を調製し、タンパク質試料をポリアクリルアミドゲル(例えば、抗原の分子量に応じて8%~20%のSDS-PAGE)中で電気泳動し、タンパク質試料をポリアクリルアミドゲルからニトロセルロース、PVDFまたはナイロンなどの薄膜に移し、薄膜をブロッキング溶液(例えば、3%BSAまたは無脂肪乳を含むPBS)中でインキュベートし、薄膜を洗浄緩衝液(例えば、PBSTウイーン-20)で洗浄し、薄膜をブロッキング緩衝液で希釈した第1の抗体(つまり、推定される抗CD30抗体)でブロットし、薄膜を洗浄緩衝液で洗浄し、ブロッキング緩衝液で希釈した酵素基質(例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼまたはアルカリフォスファターゼ)または放射性分子(例えば、³²Pまたは¹²⁵I)とコンジュゲートした第2の抗体(これは第1の抗体を認識する。例えば、抗ヒト抗体)と共に薄膜をインキュベートし、薄膜を洗浄緩衝液で洗浄し、第2の抗体の存在を検出することを一般に含む。当業者であれば、検出されるシグナルを増大させ、かつバックグラウンド・ノイズを低減させるために変更できるパラメーターに関してよく知っているであろう。ウェスタンブロットに関するさらなる議論については、例えば、Ausubelら編、1994、Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1、(John Wiley & Sons, Inc., New York)の10.8.1を参

20

30

【0115】

ELISAは、抗原(すなわち、CD30)を調製し、96穴マイクロタイタープレートのウェルをCD30でコーティングし、酵素(例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼまたはアルカリフォスファターゼ)などの検出可能な化合物にコンジュゲートした抗体をウェルに加えて一定期間インキュベートし、抗体の存在を検出することを含む。ELISAでは、検出可能な化合物に抗体をコンジュゲートさせなくてもよく、代わりに、検出可能な化合物にコンジュゲートした第2の抗体(それは目的の抗体を認識する)をウェルに加えてもよい。さらに、ウェルを抗原でコーティングする代わりに、抗体をウェルにコーティングしてもよい。この場合、検出可能な化合物にコンジュゲートした第2の抗体を、コーティングを施したウェルへのCD30タンパク質の添加に続いて加えてもよい。当業者は、検出されるシグナルを増大させるために変更できるパラメーターや当技術分野中で知られているELISAの他の変法に関してよく知っているであろう。ELISAに関するさらなる議論については、例えば、Ausubelら編、1994、Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1、(John Wiley & Sons, Inc., New York)の11.2.1を参照のこと。

40

【0116】

CD30への抗体の結合親和性および抗体CD30相互作用のオフ率(off-rate)は、競合結合アッセイによって決定することができる。競合結合アッセイの1つの例は、標識さ

50

(43)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

れていないCD30の量を増加させて存在させつつ、標識されたCD30（例えば、 ^3H または ^{125}I ）を目的の抗体と共にインキュベートし、標識されたCD30に結合した抗体を検出することを含むラジオイムノアッセイである。次いで、CD30に対する抗体の親和性および結合オフ率を、スキャッチャード（Scatchard）プロット分析によるデータから求めることができる。第2の抗体（AC10またはHeFi-1など）との競合もラジオイムノアッセイを使用して決定することができる。この場合、標識されていない第2の抗体の量を増加させて存在させつつ、CD30を、標識された化合物（例えば、 ^3H または ^{125}I ）にコンジュゲートした目的の抗体と共にインキュベートする。あるいはまた、その抗体のCD30に対する結合親和性ならびに抗体-CD30相互作用のオン率（on-rate）およびオフ率は、表面プラズモン共鳴により測定できる。

10

【0117】

本発明の方法において有用なタンパク質は、当技術分野で知られた標準的アッセイによってCD30へのその結合能力についてアッセイしてもよい。そのようなアッセイには、ファーウェスタンおよび酵母の2ハイブリッドシステムが含まれる。これらのアッセイは、上記5.2節に記載されている。上に記載したファーウェスタン法の別の変法は、ウェスタンブロットにおいて標識された候補タンパク質のCD30への結合能力の測定を伴う。ファーウェスタンブロットの1つの例（ただし、これに限定されない）では、CD30または目的のその断片を、さらにグルタチオン-S転移酵素（GST）およびプロテインセリン/トレオニンキナーゼ認識部位（cAMP依存性キナーゼ認識部位など）を含む融合タンパク質として発現させる。融合タンパク質はグルタチオン-セファロースビーズ（ファルマシア・バイオテック（Pharmacia Biotech））で精製し、ウシ心臓キナーゼ（シグマ（Sigma））および $100\mu\text{Ci}$ の ^{32}P -ATP（アマシヤム（Amersham））で標識する。試験対象のタンパク質（複数可）をSDS-PAGEによって分離し、ニトロセルロース薄膜にブロットし、次いで、標識されたCD30と共にインキュベートする。しかる後、薄膜を洗浄し、放射エネルギーを定量する。反対に、同じ方法で目的タンパク質を標識し、CD30をブロットしたニトロセルロース薄膜をブロープするのにこのタンパク質を使用することもできる。

20

【0118】

5.3 AC10およびHeFi-1に関連する配列

本発明はさらに、AC10およびHeFi-1のCDRに相同な領域、またはそのコード領域をそれぞれ含むタンパク質および核酸の、免疫学的疾患の治療または予防のための使用を包含する。様々な実施形態において、相同性領域は、対応するAC10またはHeFi-1の領域と、少なくとも50%、少なくとも55%、少なくとも60%、少なくとも65%、少なくとも70%、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも85%、少なくとも90%、少なくとも95%または少なくとも98%の同一性によって特徴づけられる。

30

【0119】

1つの実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、HeFi-1のCDRに相同な領域（配列番号20、配列番号22；配列番号24；配列番号28、配列番号30または配列番号32）を有し、但しリンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすタンパク質を投与することを含む方法を提供する。別の実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、AC10のCDRに相同な領域（配列番号4；配列番号6；配列番号8；配列番号12；配列番号14；または配列番号16）を有し、但しリンパ球中のCD30シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすタンパク質を投与することを含む方法を提供する。

40

【0120】

別の実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、HeFi-1のCDRコード領域に相同な領域（配列番号19、配

50

(44)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

列番号 21、配列番号 23、配列番号 27、配列番号 29 または配列番号 31) を有する核酸(但し、この核酸によりコードされるタンパク質がリンパ球中の CD30 シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす。)を投与することを含む方法を提供する。別の実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、AC10 の CDR コード領域に相同な領域(配列番号 3、配列番号 5、配列番号 7、配列番号 11、配列番号 13、配列番号 15) を有する核酸(但し、この核酸によりコードされるタンパク質がリンパ球中の CD30 シグナル伝達を誘導し、かつ/または活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす。)を投与することを含む方法を提供する。

【0121】

10

本発明はさらに、AC10 および HeFi-1 の可変領域に相同な領域、またはそのコード領域をそれぞれ含むタンパク質または核酸を、それを必要とする患者に投与することを含む免疫学的疾患の治療または予防方法を包含する。様々な実施形態において、相同性領域は、対応する AC10 または HeFi-1 の領域と、少なくとも 50%、少なくとも 55%、少なくとも 60%、少なくとも 65%、少なくとも 70%、少なくとも 75%、少なくとも 80%、少なくとも 85%、少なくとも 90%、少なくとも 95% または少なくとも 98% の同一性によって特徴づけられる。

【0122】

1 つの実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、HeFi-1 の可変領域に相同な領域(配列番号 18 または配列番号 26) を有するタンパク質を投与することを含む方法を提供する。別の実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、AC10 の可変領域に相同な領域(配列番号 2 または配列番号 10) を有するタンパク質を投与することを含む方法を提供する。

20

【0123】

1 つの実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、HeFi-1 の可変領域コード領域に相同な領域(配列番号 17 または配列番号 25) を有する核酸を投与することを含む方法を提供する。別の実施形態では、本発明は、免疫学的疾患を治療または予防する方法であって、それを必要とする患者に、AC10 の可変領域コード領域に相同な領域(配列番号 1 または配列番号 9) を有する核酸を投与することを含む方法を提供する。

30

【0124】

例えば、AC10 または HeFi-1 可変領域の配列と、AC10 または HeFi-1 可変領域と相同な領域をもつ他のタンパク質由来の配列との間で、2 つのアミノ酸配列または 2 つの核酸の % 同一性を決定するために、配列を最適比較のためにアライメントをとる(例えば、第 2 のアミノ酸または核酸配列との最適アライメントのためにギャップを第 1 のアミノ酸または核酸配列の配列中に導入することができる)。次いで、アミノ酸残基またはヌクレオチドを対応するアミノ酸位置またはヌクレオチド位置で比較する。第 1 の配列中での位置が第 2 の配列中の対応する位置と同じアミノ酸残基またはヌクレオチドによって占められている場合、分子はその位置で同一であるとする。2 つの配列間の % 同一性は、配列によって共有される同一の位置の数の関数である(すなわち、% 同一性 = 同一の位置の数 / 位置の合計数(例えば、オーバーラップする位置) × 100)。1 つの実施形態では、2 つの配列は同じ長さである。

40

【0125】

2 つの配列間の % 同一性の決定は数学的なアルゴリズムを使用して行うことができる。2 つの配列の比較のために利用される数学的なアルゴリズムの好ましい例(ただし、これに限定されない)は、Karlin と Altschul、1990、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87: 2264 ~ 2268 頁のアルゴリズム、Karlin と Altschul、1993、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 5873 ~ 5877 頁において修正されたものである。このようなアルゴリズムは、

50

(45)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

A l t s c h u l ら、1990、J . M o l . B i o l . 215 : 403 - 410 の N B L A S T と X B L A S T プログラムに組み入れられている。S C A - 1 改変タンパク質をコードする核酸に相同なヌクレオチド配列を得るためには、B L A S T ヌクレオチド検索は、N B L A S T プログラムで、スコア = 100、ワード長 = 12 で実施できる。S C A - 1 改変タンパク質に相同なアミノ酸配列を得るためには、B L A S T タンパク質検索は X B L A S T プログラムで、スコア = 50、ワード長 = 3 で実施できる。比較目的のためギャップ付きアライメントを得るためには、A l t s c h u l ら、1997、N u c l e i c A c i d s R e s . 25 : 3389 ~ 3402 頁に記載されるようにギャップ付き B L A S T を利用することができる。あるいは、P S I - B l a s t を使用して、分子間の遠位関係を検出する繰り返し検索を実施することもできる（前掲）。B L A S T、ギャップ付き B L A S T および P S I - B L A S T プログラムを利用する場合、それぞれのプログラム（例えば X B L A S T および N B L A S T）のデフォルトパラメーターを使用することができる。http://www.ncbi.nlm.nih.gov を参照のこと。配列の比較のために利用される数学的アルゴリズムの別の好ましい例（ただし、これに限定されない）は、マイヤーズとミラー（M y e r s & M i l l e r）（C A B I O S（1989））のアルゴリズムである。そのようなアルゴリズムは、G C G 配列アライメント用ソフトウェアパッケージの一部である A L I G N プログラム（バージョン 2.0）に組み入れられている。アミノ酸配列の比較をするために A L I G N プログラムを利用する場合、P A M 120 重量残基表、ギャップ長ペナルティとして 12 およびギャップペナルティとして 4 を使用できる。配列分析のための追加的アルゴリズムは当技術分野で知られており、T o r e l l i s と R o b o t t i、1994、C o m p u t . A p p l . B i o s c i .、10 : 3 ~ 5 頁に記載されている A D V A N C E と A D A M、および P e a r s o n と L i p m a n、1988、P r o c . N a t l . A c a d . S c i . 85 : 2444 ~ 8 頁に記載されている F A S T A が含まれる。F A S T A の内では、k t u p は、検索の感度および速度を設定するコントロールオプションである。k t u p = 2 の場合、比較されている 2 つの配列の同様の領域は、アライメントをとった残基の対を見ることにより見つかる。また、k t u p = 1 の場合は、単一のアライメントをとったアミノ酸を調べる。k t u p はタンパク質配列に対しては 2 または 1 に、DNA 配列に対しては 1 ~ 6 までセットできる。k t u p が指定されない場合のデフォルトは、タンパク質に対しては 2、DNA に対しては 6 である。F A S T A パラメーターのさらなる記載については、http://bioweb.pasteur.fr/docs/man/man/fasta.1.html#sect2 を参照のこと（その内容は参照によって本願明細書に組み込まれる）。

【0126】

あるいは、タンパク質配列アライメントは、H i g g i n s ら、1996、M e t h o d s E n z y m o l . 266 : 383 ~ 402 頁に記載される C L U S T A L W アルゴリズムを使用して行ってもよい。

【0127】

2 つの配列間の % 同一性は、ギャップを許容するかまたは許容しないで、上に記載したのと同様な技術を使用して決定することができる。% 同一性の計算では、正確な一致だけをカウントする。

【0128】

5.4 本発明のタンパク質生産方法

本発明の方法において有用な抗体を含むタンパク質は、タンパク質合成の技術分野で知られている任意の方法によって、特に化学合成法、または好ましくは組み換え発現技術によって生産することができる。

【0129】

C D 30 に結合し、リンパ球中の C D 30 シグナル伝達を誘導し、かつ / または活性化リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすタンパク質の組み換え発現には、そうしたタンパク質をコードする核酸を含む発現ベクターの構築が必要である。そのよ

10

20

30

40

50

(46)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

うなタンパク質をコードする核酸を得た後、タンパク質分子の産生のためのベクターは、当技術分野においてよく知られている組み換えDNA技術によって産生され得る。したがって、前記タンパク質をコードするヌクレオチド配列を含む核酸を発現させることによりタンパク質を製造する方法が本願明細書に記載される。当業者によく知られている方法を用いて、コード配列ならびに適当な転写および翻訳の制御シグナルを含む発現ベクターを構築することができる。これらの方法としては、例えば、*in vitro*での組み換えDNA技術、合成技術および*in vivo*での遺伝子組換えが含まれる。

【0130】

したがって、本発明は、作動可能にプロモーターに連結された本発明のタンパク質をコードするヌクレオチド配列を含む複製可能なベクターを提供する。ここで、タンパク質は抗体であり、そのヌクレオチド配列は、その重鎖もしくは軽鎖、または重鎖もしくは軽鎖可変ドメイン、を作動可能にプロモーターに連結しコードすることができる。そのようなベクターは、抗体分子の定常領域をコードするヌクレオチド配列を含み（例えば、国際公開WO 86/05807；国際公開WO 89/01036；および米国特許第5,122,464号参照）、重鎖または軽鎖全体の発現のため、抗体の可変領域をそのようなベクター中にクローン化してもよい。

【0131】

発現ベクターは慣用の技術によって宿主細胞に移入され、次いで、形質導入細胞は慣用の技術によって培養されて、本発明のタンパク質を生産する。したがって、本発明は、異種のプロモーターに作動可能に連結された、本発明のタンパク質をコードする核酸を含む宿主細胞を包含する。2本鎖抗体の発現のための好ましい実施形態では、下に詳述するように、重・軽鎖の両方をコードするベクターを免疫グロブリン分子全体の発現のための宿主細胞中で同時発現させてもよい。

【0132】

本発明のタンパク質分子を発現するためには様々な宿主-発現ベクター系が利用できる。そのような宿主-発現系は、目的のコード配列を生産し、続いて精製し得るようなベヒクル（*vehicles*）を表わすが、また、適当なヌクレオチドコード配列で形質転換またはトランスフェクトされた時、*in situ*で本発明のタンパク質を発現することができる細胞を表わす。これらは、抗体をコードする配列を含む、組み換えバクテリオファージDNA、プラスミドDNAまたはコスミドDNA発現ベクターで形質転換された細菌（例えば、大腸菌（*E. coli*）、枯草菌（*B. subtilis*））；抗体をコードする配列を含む組み換え酵母発現ベクターで形質転換された酵母（例えばサッカロミセス、ピチア（*Pichia*））などの微生物；抗体をコードする配列を含む組み換えウイルス発現ベクター（例えば、バキュロウイルス）に感染された昆虫細胞系；抗体をコードする配列を含む組み換えウイルス発現ベクター（例えばカリフラワーモザイクウイルス、*CaMV*；タバコモザイクウイルス、*TMV*）に感染されたか、または組み換えプラスミド発現ベクター（例えば*Ti*プラスミド）で形質転換された植物細胞系；または哺乳類細胞ゲノムに由来するプロモーター（例えば、メタロチオネインプロモーター）または哺乳類ウイルスに由来するプロモーター（例えば、アデノウイルスの後期プロモーター；ワクシニアウイルス7.5Kプロモーター）を含む組み換え発現構築物を有する哺乳類細胞系（例えば、COS、CHO、BHK、293、3T3細胞）を含む（ただし、これらに限定されない）。好ましくは、大腸菌などの細菌細胞、また特に全組み換え抗体分子の発現のためにより好ましくは、真核細胞を本発明の組み換えタンパク質の発現のために使用する。例えば、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）のような哺乳類細胞を、ヒトサイトメガロウイルス由来の主要中間期初期遺伝子プロモーター要素のようなベクターと共に用いるのがタンパク質についての有効な発現系である（*Foecking*ら、1986、*Gene* 45:101；*Cockett*ら、1990、*Bio/Technology* 8:2）。

【0133】

細菌の系では、目的とする用途に応じて、タンパク質が発現するために必要なフォール

10

20

30

40

50

(47)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

ディングおよび翻訳後修飾の必要条件に応じて多数の発現ベクターを有利に選択できる。可能であれば、そのようなタンパク質を本発明のタンパク質を含む医薬組成物の製造のために大量に生産しようとする場合は、容易に精製し得る融合タンパク質産物を高レベルで発現させるベクターが望ましいであろう。そのようなベクターには、大腸菌発現ベクター pUR278 (Rusherら、1983、EMBO 1.2:1791) (この場合、融合タンパク質が生産されるように、同一枠内に lac Z コード領域をもつベクター中に抗体コード配列を個別に結合してもよい) ; pINベクター (Inouye & Inouye、1985、Nucleic Acids Res. 13:3101~3109 頁; Van Heeke & Schuster、1989、J. Biol. Chem. 24:5503~5509 頁) などが含まれるが、これらに限定されない。pGEXベクターも、グルタチオン S- 転移酵素 (GST) を有する融合タンパク質を発現するのに使用できる。一般に、このような融合タンパク質は可溶性であり、溶解した細胞から吸着およびマトリックスグルタチオンアガロースビーズへの結合後、遊離グルタチオンの存在下で溶離することにより容易に精製することができる。pGEXベクターは、GST部分からクローン化標的遺伝子産物が放出され得るようにトロンピンまたは因子 Xa プロテアーゼ切断部位を含むように設計される。

【0134】

昆虫系では、オートグラファ・カリフォルニカ (Autographa californica) 核多角体病ウイルス (AcNPV) を、外来遺伝子を発現するベクターとして使用する。ウイルスはスポドプテラ・フルギペルダ (Spodoptera frugiperda) 細胞中で増殖する。抗体をコードする配列は、ウイルスの非必須領域 (例えば、ポリヘドリン遺伝子) 中に個別にクローン化し、AcNPV プロモーター (例えば、ポリヘドリン・プロモーター) の制御下に置くことができる。

【0135】

哺乳類宿主細胞では、多数のウイルス系発現系が利用できる。アデノウイルスを発現ベクターとして使用する場合、本発明のタンパク質のコード配列をアデノウイルス転写 / 翻訳制御複合体 (例えば、後期プロモーターおよび三分 (tripartite) リーダー配列) に結合することができる。次いで、このキメラ遺伝子を in vitro または in vivo の組み換えによってアデノウイルスゲノムに挿入すればよい。ウイルスのゲノムの非必須領域 (例えば、領域 E1 または E3) 中への挿入により、生存可能で、感染した宿主中で本発明のタンパク質の発現を可能にする組み換えウイルスが得られる (例えば、Logan & Shenk、1984、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:355~359 頁参照)。挿入されたコード配列の有効な翻訳のためには特異的な開始シグナルも必要になる場合がある。これらのシグナルは ATG 開始コドンおよび隣接した配列を含む。さらに、インサート全体の翻訳を確実にするために所望のコード配列のリーディングフレームと読み枠が合っていなければならない。これらの外因性翻訳制御シグナルおよび開始コドンは天然物および合成物を含む様々な起源のものでよい。発現効率は、適当な転写エンハンサー・エレメント、転写ターミネーターなどを含めることによって増強できる (Bittnerら、1987、Methods in Enzymol. 153:51~544 頁参照)。

【0136】

さらに、宿主細胞株は、挿入された配列の発現を調整するか、または、望ましい具体的態様で遺伝子産物を修飾し処理するものを選択することができる。そのような修飾 (例えば、グリコシル化) およびタンパク質産物のプロセッシング (例えば、切断) は、本発明のタンパク質の機能にとって重要な場合もある。様々な宿主細胞が、タンパク質および遺伝子産物の翻訳後プロセッシングおよび修飾といった特性および特定のメカニズムを有する。発現された外来タンパク質の正確な修飾およびプロセッシングを確実にするために適当な細胞系統または宿主系を選ぶことができる。この目的のために、遺伝子産物の 1 次転写体の適切なプロセッシング、グリコシル化およびリン酸化のための細胞機構を有する真核宿主細胞を使用できる。そのような哺乳類の宿主細胞には、CHO、VERO、BHK、HeL

10

20

30

40

50

(48)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

a、COS、MDCK、293、3T3およびW138が含まれるがこれらに限定されない。

【0137】

CD30に結合し、また活性化リンパ球に対する細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼす組み換えタンパク質の長期的な高収率生産のためには、安定した発現が好ましい。例えば、安定してタンパク質を発現する細胞系統を遺伝子操作で作製し得る。ウイルスの複製起点を含む発現ベクターを使用するのではなく、宿主細胞は、適当な発現制御エレメント（例えば、プロモーター、エンハンサー、配列、転写ターミネーター、ポリアデニル化サイトなど）によって調節されるDNAおよび選択可能なマーカーで形質転換できる。組み換え操作された細胞は、外来DNAの導入に続いて、富栄養培地中で1～2日間増殖させ、次いで、選択培地に切り替える。組み換えプラスミド中の選択可能なマーカーは、選択に対する耐性を付与し、細胞がその染色体にプラスミドを安定的に組み込み、増殖巣を形成する。次いで、これをクローニングし、細胞系統に増殖することができる。この方法は、本発明のタンパク質を発現する細胞系統を作製するのに有利に用いることができる。

【0138】

以下のものを含む（ただし、これに限定されない）多くの選択系が使用できるが、単純疱疹ウイルス・チミジン・キナーゼ（Wiglerら、1977、Cell 11:223）、ハイポキサンチン・グアニン・ホスホリボシルトランスフェラーゼ（Szybalska & Szybalski、1992、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 48:202）およびアデニン・ホスホリボシルトランスフェラーゼ（Lowyら、1980、Cell 22:8～17頁）遺伝子は、tk-、hgprt-またはaprt-細胞中でそれぞれ使用できる。また、以下の遺伝子の選択の基準として代謝拮抗剤耐性を使用することができる。遺伝子は、次のものである。dhfr、これはメトトレキサート耐性を付与する（Wiglerら、1980、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:357；O'Hareら、1981、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:1527）；gpt、これはミコフェノール酸耐性を付与する（Mulligan & Berg、1981、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:2072）；neo、これはアミノグリコシドG-418耐性を付与する（Goldspielら、Clinical Pharmacy 12:488～505頁；WuとWu、1991、Biotherapy 3:87～95頁；Tolstoshev、1993、Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 32:573～596頁；Mulligan、1993、Science 260:926～932頁；およびMorganとAnderson、1993、Ann. Rev. Biochem. 62:191～217頁；May、1993、TIB TECH 11(5):155～215頁）；およびhygro、これはハイグロマイシン耐性を付与する（Santerreら、1984、Gene 30:147）。組み換えDNA技術の技術分野において一般に知られている方法を、所望の組み換えクローンを選択するために慣用されているように適用してもよい。そのような方法は、例えば、Ausubelら（編）、Current Protocols in Molecular Biology、John Wiley & Sons、NY（1993）；Kriegler、Gene Transfer and Expression、A Laboratory Manual、Stockton Press、NY（1990）；およびChapters 12 and 13、Dracopoliら（編）、Current Protocols in Human Genetics、John Wiley & Sons、NY（1994）；Colberre-Garapinら、1981、J. Mol. Biol. 150:1に記載されており、これらの全体は参照によって本願明細書に組み込まれる。

【0139】

本発明のタンパク質の発現レベルはベクター増幅（総説として、BebbingtonとHentschel、「The Use of Vectors Based on Gene Amplification for the Expression of

10

20

30

40

50

(49)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

Cloned Genes in Mammalian Cells in DNA Cloning」、Vol. 3. (Academic Press、New York、1987) 参照) により増大させることができる。抗体を発現するベクター系中でマーカーが増幅可能な場合、宿主細胞の培養物中に存在する阻害剤レベルの増大は、マーカー遺伝子のコピーの数を増加させるであろう。増幅された領域は抗体遺伝子を結合しているので、本発明のタンパク質の生産はさらに増加するであろう (Crouseら、1983、Mol. Cell. Biol. 3: 257)。

【0140】

本発明のタンパク質が抗体である場合、宿主細胞は本発明の2つの発現ベクター、すなわち、重鎖由来のタンパク質をコードする第1のベクター、および軽鎖由来のタンパク質をコードする第2のベクターで同時にトランスフェクトしてもよい。2つのベクターは同一の選択可能なマーカーを含むことができ、これにより、重鎖タンパク質および軽鎖タンパク質の等しい発現が可能になる。あるいは、重鎖タンパク質および軽鎖タンパク質の両方をコードし、発現することができる単一のベクターを使用してもよい。こうした場合、有害な遊離重鎖が過剰にならないように、軽鎖は、重鎖の前に配置すべきである (Proudfoot、1986、Nature 322: 52、Kohler、1980、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77: 2197)。重・軽鎖のためのコード配列はcDNAまたはゲノムのDNAを含んでもよい。

【0141】

本発明のタンパク質分子は、動物によって産生されるか、化学的に合成され、または組み換えにより発現される場合は、それは、タンパク質の精製用の当技術分野で既知の任意の方法によって、例えば、クロマトグラフィー (例えば、イオン交換、親和性、特に特定の抗原への親和性、プロテインA (抗体分子に対し、またはタンパク質が融合タンパク質である異種の融合パートナーへの親和性および分子ふるいカラムクロマトグラフィー)、遠心分離、溶解度差、またはタンパク質の精製のための他の標準的技術によって精製することができる。

【0142】

本発明は、融合タンパク質 (すなわち、(好ましくは、少なくとも10、20、30、40、50、60、70、80、90または少なくとも100個のアミノ酸の) 異種タンパク質に組み換えにより融合させたか化学的にコンジュゲート (共有結合によるコンジュゲーションも共有結合でない結合によるコンジュゲーションも含む) したタンパク質) である本発明のタンパク質の使用を包含する。その融合は必ずしも直接的である必要はなく、リンカー配列を介して起こるものでもよい。

【0143】

本発明は、可変領域以外の抗体ドメインを融合またはコンジュゲートさせた本発明のタンパク質を含む組成物をさらに含む。例えば、本発明のタンパク質は、抗体Fc領域またはその部分に融合またはコンジュゲートすることができる。本発明のタンパク質に融合する抗体部分は、定常領域、ヒンジ領域、CH1ドメイン、CH2ドメインおよびCH3ドメインまたはこれらの全ドメインもしくはその部分の任意の組合せとすることができる。前記抗体部分にタンパク質をさらに融合またはコンジュゲートして多量体としてもよい。例えば、本発明のタンパク質に融合したFc部分は、Fc部分間のジスルフィド結合によって二量体を形成することができる。より多量化した形態は、IgAとIgMの部分にタンパク質を融合させることにより作ることができる。本発明のタンパク質を抗体部分に融合させるかコンジュゲートさせる方法は、当技術分野で知られている。例えば米国特許第5,336,603号; 米国特許第5,622,929号; 米国特許第5,359,046号; 米国特許第5,349,053号; 米国特許第5,447,851号; 米国特許第5,112,946号; EP307,434; EP367,166; 国際公開WO96/04388; WO91/06570; Ashkenaziら、1991、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 10535~10539頁; Zhengら、1995、J. Immunol. 154: 5590~5600頁; およびVilら、1992

(50)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:11337~11341頁参照（参照によって本明細書にこれらの全体が組み込まれる）。

【0144】

5.5 コンジュゲートおよび融合タンパク質

上記で述べたように、本発明の免疫学的疾患の治療および予防方法は、CD30に結合し活性化リンパ球に対し細胞静止作用および/または細胞傷害作用を及ぼし、さらに異種起源のタンパク質または細胞傷害性薬剤に融合またはコンジュゲートしたタンパク質の使用を包含する。

【0145】

したがって、本発明は、本発明のタンパク質または核酸の投与による免疫学的疾患の治療または予防方法を提供する。発明のある実施形態では、本発明のタンパク質または核酸は、その細胞傷害性および/または細胞静止性を改善するために化学的に改変されていてもよい。例えば、本発明のタンパク質はコンジュゲートとして投与することができる。本発明のタンパク質への結合のために特に適するものは、化学療法剤、プロドラッグ変換酵素、放射性同位体もしくは化合物または毒素である。

【0146】

1つの実施形態では、精製を容易にするために、本発明のタンパク質をペプチドなどのマーカー配列に融合させる。好ましい実施形態では、マーカーアミノ酸配列は、とりわけ、pQEベクター（QIAGEN, Inc., 9259 Eton Avenue, Chatsworth, CA, 91311）中で提供されるタグなどのヘキサヒスチジンペプチドであり、それらの多くは市販されている。例えば、Gentzら、1989、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:821~824頁に記載されているように、ヘキサヒスチジンは、融合タンパク質の精製に都合がよい。精製に有用な他のペプチドタグは、「HA」タグ（それはインフルエンザ赤血球凝集素タンパク質に由来するエピトープに相当する）（Wilsonら、1984、Cell 37:767）および「フラグ」タグを含むがこれに限定されない。このような融合タンパク質は当業者に知られた標準的組み換え方法によって作製することができる。

【0147】

別の実施形態では、本発明のタンパク質が治療剤に融合またはコンジュゲートされる。例えば、本発明のタンパク質は化学療法剤（5.6節を参照）、毒素（例えば、細胞静止剤または殺細胞剤）または放射性核種（例えば、 ^{212}Bi 、 ^{211}At などの α エミッター、 ^{131}I 、 ^{90}Y または ^{67}Cu などの β エミッター）などの細胞傷害性薬剤にコンジュゲートしてもよい。本発明の抗CD30分子をコンジュゲートするのに有用な追加剤の例を5.12.1節に示す。

【0148】

本発明の方法において有用な、抗CD30抗体の治療効果の増強のために使用される本発明のコンジュゲートは、毒素などの非古典治療剤を含む。そのような毒素には、アブリン（abrin）、リシンA、シュードモナス菌体外毒素またはジフテリア毒素が含まれるが、これらに限定されない。

【0149】

あるいは、本発明の抗体は、シーガル（Segal）によって米国特許第4,676,980号（それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）に記載されているように、抗体ヘテロコンジュゲートを形成する第2の抗体にコンジュゲートすることができる。本発明を実施するのに有用なヘテロコンジュゲート類は、CD30に結合する抗体または抗体の一部（モノクローナル抗体Ki-2、Ki-4、Ki-5、Ki-7、Ber-H2、HR5-1、HR5-4、Ki-1、Ki-6、M67、Ki-3、M44、HeFi-1およびAC10のCDRおよび/または重鎖を有する抗体を含むが、これらに限定されない）および、リンパ球表面受容体または受容体複合体（免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチン（C

(51)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

ータイプ、S-タイプまたはI-タイプ)または補体制御タンパク質など)に結合する抗体または抗体の一部である。こうした分子の例およびヘテロコンジュゲートを作るのに使用できるこのような分子に対する抗体は、下記の5.12.2節で示す。

【0150】

上記で述べたように、本発明のある実施形態では、本発明のタンパク質をプロドラッグ変換酵素と同時投与することができる。プロドラッグ変換酵素は、本発明のタンパク質に融合またはコンジュゲートした融合タンパク質として発現することができる。プロドラッグ変換酵素の例はカルボキシペプチダーゼG2、ペータグルクロニダーゼ、ペニシリン-V-アミダーゼ、ペニシリン-G-アミダーゼ、 β -ラクタマーゼ、 β -グルコシダーゼ、ニトロレダクターゼおよびカルボキシペプチダーゼAである。

10

【0151】

5.6 抗体-薬剤コンジュゲート

本発明は、免疫学的疾患の治療または予防のための抗CD30抗体-薬剤コンジュゲート(抗CD30ADC)の使用を包含する。本発明のADCは、CD30発現細胞がかかわる免疫疾患に罹患した患者に投与したとき(好ましくは単独投与であるが他の治療剤との組合せてもよい)、CD30発現細胞に対する臨床的に有益な細胞傷害作用または細胞静止作用を生じるように製造される。

【0152】

タンパク質、特に抗体に、そのような薬剤をコンジュゲートするための技術はよく知られている。例えば、Arnonら、「Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In Cancer Therapy」、in Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy、Reisfeldら(編)、243~56頁(Alan R. Liss, Inc., 1985); Hellstromら、「Antibodies For Drug Delivery」、in Controlled Drug Delivery(2版)、Robinsonら(編)、623~53頁(Marcel Dekker, Inc., 1987); Thorpe、「Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review」、in Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications、Pinch 30
eraら(編)、475~506頁(1985); 「Analysis, Results, And Future Prospective Of The Therapeutic Use Of Radiolabeled Antibody In Cancer Therapy」、in Monoclonal Antibodies For Cancer Detection And Therapy、Baldwinら(編)、303~16頁(Academic Press 1985)およびThorpeら、1982、Immunol. Rev. 62: 119~58頁を参照のこと。

【0153】

本発明の治療方法が対象として包含する疾患状態の多くでは、相当量の可溶性CD30が活性化リンパ球から流出しているので、薬剤(例えば、細胞傷害性薬剤または免疫抑制 40
剤)またはプロドラッグ変換酵素にコンジュゲートする抗CD30抗体を使用する際には、薬剤またはプロドラッグ変換酵素は、可溶性CD30が見出される身体中の任意の場所ではなく、活性化リンパ球の近傍において活性であることが好ましい。

【0154】

本発明の抗CD30抗体によって標的とされる、活性化リンパ球の外部での薬剤活性を最小限にするために、2つのアプローチを取ることができる。第1は、細胞膜に結合するが可溶性CD30には結合しない抗体を使用し、その結果、薬剤(プロドラッグ変換酵素の作用によって生産された薬剤を含む)は、活性化リンパ球の細胞表面に集中する。本発明の抗体に結合する薬剤の活性を最小限にするためのより好ましいアプローチは、それら 50
が抗体から加水分解されたり切断されたりしない限り、それらの活性が低減されるように

(52)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

薬剤をコンジュゲートさせることである。そのような方法は、活性化リンパ球の細胞表面の環境（例えば、活性化リンパ球の細胞表面に存在するプロテアーゼの活性）またはそれが活性化リンパ球に取り込まれた場合、コンジュゲートが遭遇する活性化リンパ球の内部の環境（例えば、エンドソーム内または、例えば、リソソーム環境内のpH感度もしくはプロテアーゼ感度によって）に敏感なリンカーを用いて抗体に薬剤を結合する方法を用いることである。

【0155】

1つの実施形態では、リンカーは、酸に不安定でリソソーム内で加水分解されるヒドラゾンまたはヒドラジド基である（例えば米国特許第5,622,929号参照）。別の実施形態では、薬剤はシス-アコニチン酸アミド類、オルトエーテル類、アセタール類およびケタール類などの、酸に不安定な他のリンカーを介して抗CD30抗体に結合される（DubowchikとWalker, 1999, Pharm. Therapeutics 83:67~123頁; Nevillleら, 1989, Biol. Chem. 264:14653~14661頁）。そのようなリンカーは、血液中のもののような中性pH条件下で比較的安定しているが、pH5（リソソームのpH近く）以下で不安定である。

【0156】

他の実施形態では、薬剤は細胞内のプロテアーゼによって切断されるペプチドスパーサーを使用して、本発明の抗CD30抗体に結合させる。標的酵素には、カテプシンBおよびDおよびプラスミンが含まれ、それらのすべてはジペプチド薬剤誘導体を加水分解することが知られており、標的細胞の内部の活性な薬剤の放出をもたらす（DubowchikとWalker, 1999, Pharm. Therapeutics 83:67~123頁）。細胞内でのタンパク質分解的薬剤放出を使用する利点は、コンジュゲートした時、薬剤が大幅に弱減され、コンジュゲートの血清安定性が非常に高くなり得るという点である。

【0157】

さらに他の実施形態では、リンカーはマロン酸リンカー（Johnsonら, 1995, Anticancer Res. 15:1387~93頁）、マレイミドベンゾイルリンカー（Lauら, 1995, Bioorg-Med-Chem. 3(10):1299~1304頁）または3'-N-アミド類似体（Lauら, 1995, Bioorg-Med-Chem. 3(10):1305~12頁）である。

【0158】

本発明の抗CD30抗体へのコンジュゲーションに使用される薬剤は、ドキソルビシン、パクリタキセル、メルファラン、ピンカアルカロイド、メトトレキサート、マイトマイシンC、エトポシドなどの慣用の化学療法剤を含むことができる。さらに、CC-1065類似体、カリチアミシン（calichamicin）、メイタンシン、ドラスタチン10の類似体、リゾキシシン（rhizoxin）およびパリトキシシンなどの有効な薬剤を、条件によっては安定したリンカーを使用して、抗CD30抗体に連結させて有効なイムノコンジュゲートを形成することができる。本発明の抗CD30抗体へのコンジュゲーション用の他の適当な薬剤の例は、下記5.12.1節に示す。

【0159】

5.6.1 リンカー

上記5.6節で述べたように、一般に、ADCは、リンカーを介して抗体に薬剤をコンジュゲートさせることにより作られる。したがって、本発明のADCの大多数（それは抗CD30抗体および高効力薬剤および/またはインターナリゼーション促進薬を含む）は、さらにリンカーを含む。当技術分野で知られているどのようなリンカーも本発明のADCで用いることができる（例えば、二官能性剤（ジアルデヒド類またはイミドエステル類など）または分岐ヒドラゾンリンカー（例えば、米国特許第5,824,805号参照。これは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる））。

【0160】

本発明のある実施形態（ただし、これに限定されない）では、薬剤部分と抗CD30

10

20

30

40

50

(53)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

A D C の抗体部分との間のリンカー領域はある条件下で切断可能かまたは加水分解可能であり、リンカーの切断または加水分解によって抗体部分から薬剤部分が放出される。好ましくは、リンカーは細胞内条件下で切断または加水分解を受けやすい。

【0161】

好ましい実施形態では、抗 C D 3 0 A D C の薬剤部分と抗体部分の間のリンカー領域は、p H がある値だけ変化するか、またはある値を超えると加水分解し得る。本発明の特に好ましい実施形態では、リンカーはリソソーム環境、例えば、酸性条件（すなわち、約 5 ~ 5 . 5 以下の p H ）の下において加水分解され得る。他の実施形態では、リンカーは、ペプチダーゼまたはプロテアーゼ酵素（リソソームのプロテアーゼ酵素、膜結合プロテアーゼ、細胞内プロテアーゼまたはエンドソームのプロテアーゼを含むが、これらに限定されない）によって切断されるペプチジルリンカーである。好ましくは、リンカーは少なくとも 2 アミノ酸長であり、より好ましくは少なくとも 3 アミノ酸長である。C D 3 0 発現癌中に存在する酵素によって切断され得るペプチジルリンカーが好ましい。例えば、カテプシン-B（例えば G l y - P h e - L e u - G l y リンカー）（癌の組織で高度に発現されるチオール依存性プロテアーゼ）によって切断され得るペプチジルリンカーを使用することができる。他のそのようなリンカーは、例えば、米国特許第 6 , 2 1 4 , 3 4 5 号（それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）中に記載されている。

10

【0162】

他の相互に非排他的な本発明の実施形態において、本発明の A D C の抗 C D 3 0 抗体および薬剤をコンジュゲートするリンカーは、細胞インターナリゼーションを促進する。ある実施形態では、A D C のリンカー-薬剤部分が細胞インターナリゼーションを促進する。ある実施形態では、リンカーは、全 A D C の構造が細胞インターナリゼーションを促進するように選択される。

20

【0163】

本発明の特定の実施形態では、バリナーシトルリンの誘導体をリンカー（v a l - c i t リンカー）として使用する。v a l - c i t リンカーを有するドキシソルピシンの合成は、以前に記載されている（D u b o w c h i k と F i r e s t o n e の米国特許第 6 , 2 1 4 , 3 4 5 号（それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる））。

【0164】

別の特定の実施形態では、リンカーは p h e - l y s リンカーである。

30

【0165】

別の特定の実施形態では、リンカーはチオエーテル・リンカーである（例えば、W i l l i n e r らに対する米国特許第 5 , 6 2 2 , 9 2 9 号参照（それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる））。

【0166】

さらに別の特定の実施形態では、リンカーはヒドラゾンリンカー（例えば、G r e e n f i e l d らに対する米国特許第 5 , 1 2 2 , 3 6 8 号、および K i n g らに対する米国特許第 5 , 8 2 4 , 8 0 5 号参照（それらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる））。

【0167】

40

さらに他の特定の実施形態では、リンカーはジスルフィドリンカーである。多様なジスルフィドリンカーが当技術分野で知られており、その中には、S A T A（N-スクシンイミジル-S-アセチルチオアセテート）、S P D P（N-スクシンイミジル-3-（2-ピリジルジチオ）プロピオネート）、S P D B（N-スクシンイミジル-3-（2-ピリジルジチオ）ブチレートおよび S M P T（N-スクシンイミジル-オキシカルボニル-アルファ-メチル-アルファ-（2-ピリジルジチオ）トルエン）を使用して形成することができるものが含まれる（ただし、これらに限定されない）。S P D B および S M P T（例えば、T h o r p e ら、1987、C a n c e r R e s .、47:5924~5931 頁；W a w r z y n c z a k ら、1987、I n I m m u n o c o n j u g a t e s : A n t i b o d y C o n j u g a t e s i n R a d i o i m a g e r y a n d

50

(54)

J P 2005-511627 A 2005.4.28


Therapy of Cancer、C. W. Vogel 編、Oxford U. P
ress、28～55頁を参照のこと。また、Thorpeらに対する米国特許第4,8
80,935号を参照のこと。それらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる。
る。)

本発明の組成物および方法と共に使用することができる様々なリンカーは、「Drug
Conjugates and their use for treating c
ancer, an autoimmune disease or an infect
ious disease」と題する米国仮出願第60/400,403号(発明者:P
eter D. Senter, Svetlana DoroninaおよびBrian
E. Toki、出願日:2002年7月31日)に記載されており、これは参照によって
その全体が本願明細書に組み込まれる。

10

【0168】

さらに別の本発明の実施形態においては、抗CD30抗体-リンカー薬剤コンジュゲ
ート(抗CD30ADC)のリンカーユニットが、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤(薬剤
ユニット;-D)と抗CD30抗体ユニット(-A)を連結する。本明細書で使用する場
合、抗CD30 ADCという用語は、リンカーユニットの有無を問わず抗CD30抗体
薬剤コンジュゲートを包含する。リンカーユニットは以下の一般式を有する:



(ここで、

- T- はストレッチャーユニットであり;
- a は0または1であり;
- 各-W- は独立してアミノ酸ユニットであり;
- w は独立して2～12の範囲の整数であり;
- Y- はスペーサーユニットであり;
- y は0、1または2である。)

20

【0169】

5.6.1.1 ストレッチャーユニット

ストレッチャーユニット(-T-)は、存在する場合、アミノ酸ユニット(-W-)に
対して抗CD30抗体ユニットを連結する。抗CD30抗体上に存在することができる有
用な官能基は、天然または化学的操作によるものを含み、スルフヒドリル、アミノ、水酸
基、炭水化物のアノマー性水酸基およびカルボキシルを含む(ただし、これらに限定され
ない)。好ましい官能基はスルフヒドリルおよびアミノである。抗CD30抗体の分子内
ジスルフィド結合の還元により、スルフヒドリル基を生成することができる。あるいは、
スルフヒドリル基は、抗CD30抗体のリジン部分のアミノ基と2-イミノチオラン(T
raut 試薬)または他のスルフヒドリル生成試薬との反応によって生成することができ
る。特定の実施形態では、抗CD30抗体は組み換え型の抗体であり、1つまたは複数の
リジンを有するように組み換え操作される。他の実施形態では、抗CD30抗体はさらに
スルフヒドリル基、例えば追加のシステインを有するように組み換え操作される。

30

【0170】

ある特定の実施形態では、ストレッチャーユニットは、抗CD30抗体ユニットの硫黄
原子との結合を形成する。硫黄原子は、還元された抗CD30抗体(A)のスルフヒドリ
ル(SH)基に由来し得る。これらの実施形態の代表的なストレッチャーユニットは、式
(Ia)および(Ib; 下記)の角括弧内に示され、ここで、A-、-W-、-Y-、-
D、wおよびyは、上に定義した通りであり、R¹は-C₁-C₁₀アルキレン-、-C
₃-C₈カルボシクロ-、-O-(C₁-C₈アルキル)-、-アリーレン-、-C₁-
C₁₀アルキレン-アリーレン-、-アリーレン-C₁-C₁₀アルキレン-、-C₁-
C₁₀アルキレン-(C₃-C₈カルボシクロ)-、-(C₃-C₈カルボシクロ)-C
₁-C₁₀アルキレン-、-C₃-C₈ヘテロシクロ-、-C₁-C₁₀アルキレン-(
C₃-C₈ヘテロシクロ)-、-(C₃-C₈ヘテロシクロ)-C₁-C₁₀アルキレン
-、-(CH₂CH₂O)_r-、および-(CH₂CH₂O)_r-CH₂-から選択され

40


50

(55)

J P 2005-511627 A 2005.4.28


；また、 r は 1 ～ 10 の範囲の整数である。

【化 5】



(Ia)

10




(Ib)

【 0 1 7 1 】

例示的なストレッチャーユニットは式 (I a) において R^1 が $-(CH_2)_5-$ の次式である。

20

【化 6】




【 0 1 7 2 】

別の例示的なストレッチャーユニットは式 (I a) において R^1 が $-(CH_2)_r-CH_2-$ であり、 r が 2 の次式である。

30

【化 7】




【 0 1 7 3 】

さらに別の例示的なストレッチャーユニットは式 (I b) において R^1 が $-(CH_2)_5-$ の次式である。

40

【化 8】



50


(56)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【 0 1 7 4 】

ある他の特定の実施形態では、ストレッチャーユニットは、抗 C D 3 0 の抗体ユニットの硫黄原子とストレッチャーユニットの硫黄原子との間のジスルフィド結合によって抗 C D 3 0 抗体ユニット (A) に連結される。この実施形態の代表的なストレッチャーユニットは式 (I I) の角括弧内に示され、ここで、 R^1 、 $A-$ 、 $-W-$ 、 $-Y-$ 、 $-D$ 、 w および y は、上に定義した通りである。

【 化 9 】



10


(II)

【 0 1 7 5 】

さらに別の特定の実施形態では、ストレッチャーの反応性基は、抗 C D 3 0 抗体のアミノ基に反応し得る反応性部位を含む。アミノ基はアルギニンまたはリジンのそれであり得る。反応性部位が含む適当なアミンには、スクシンイミドエステル、4-ニトロフェニルエステル、ペンタフルオロフェニルエステル、無水物、酸塩化物、スルフォニルクロリド、イソシアネートおよびイソチオシアネートのような活性化エステルが含まれる（ただし、これらに限定されない）。これらの実施形態の代表的なストレッチャーユニットは式 (I I I a) および (I I I b) の角括弧内に示され、ここで、 R^1 、 $A-$ 、 $-W-$ 、 $-Y-$ 、 $-D$ 、 w および y は、上に定義した通りである。


20

【 化 1 0 】



30

(IIIa)



40

(IIIb)

【 0 1 7 6 】

さらに別の本発明の態様では、ストレッチャーの反応性官能基は、抗 C D 3 0 抗体上に存在し得る改変された炭水化物基に反応的な反応性部位を含む。特定の実施形態において、抗 C D 3 0 抗体は酵素によってグリコシル化されて炭水化物部分を生じる。炭水化物は過ヨウ素酸ナトリウムなどの試薬で穏やかに酸化され、酸化された炭水化物に生じたカルボニルユニットは、ヒドラジド、オキシム、反応性アミン、ヒドラジン、チオセミカルバゾン、ヒドラジンカルボキシレート、および K a n e k o , T . ら、B i o c o n j u g a t e C h e m 1 9 9 1、2、1 3 3 - 4 1 に記載されるようなアリールヒドラジド


50

(57)

J P 2005-511627 A 2005.4.28


などの官能性を含むストレッチャーと縮合され得る。この実施形態の代表的なストレッチャーユニットは式(IVa)~(IVc)の角括弧内に示され、ここで、 R^1 、 A 、 $-W-$ 、 $-Y-$ 、 $-D$ 、 w および y は、上に定義した通りである。

【化11】




(IVa)

10



(IVb)



(IVc)

20

【0177】

5.6.1.2 アミノ酸ユニット

30


スペーサーユニットが存在する場合、アミノ酸ユニット($-W-$)はストレッチャーユニット($-T-$)をスペーサーユニット($-Y-$)に結合し、スペーサーユニットが存在しない場合は、ストレッチャーユニットを細胞毒素素または細胞静止剤(薬剤ユニット; D)に連結する。

【0178】

$-W_w-$ ジペプチド、トリペプチド、テトラペプチド、ペンタペプチド、ヘキサペプチド、ヘプタペプチド、オクタペプチド、ノナペプチド、デカペプチド、ウンデカペプチドまたはドデカペプチドユニットである。各 $-W-$ ユニットは、独立して角括弧中の下記式を有する。また、 w は2~12の範囲の整数である。

【化12】

40



【0179】

ここで、 R^2 は、水素、メチル、イソプロピル、イソブチル、*sec*-ブチル、ベンジル、*p*-ヒドロキシベンジル、 $-\text{CH}_2\text{OH}$ 、 $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SC}$


50

(58)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

H_3 、 $-CH_2CONH_2$ 、 $-CH_2COOH$ 、 $-CH_2CH_2CONH_2$ 、 $-CH_2CH_2COOH$ 、 $-(CH_2)_3NHC(=NH)NH_2$ 、 $-(CH_2)_3NH_2$ 、 $-(CH_2)_3NHCOCH_3$ 、 $-(CH_2)_4NHCHO$ 、 $-(CH_2)_4NHC(=NH)NH_2$ 、 $-(CH_2)_4NH_2$ 、 $-(CH_2)_4NHCOCH_3$ 、 $-(CH_2)_4NHCHO$ 、 $-(CH_2)_3NHCONH_2$ 、 $-(CH_2)_4NHCONH_2$ 、 $-CH_2CH_2CH(OH)CH_2NH_2$ 、2-ピリジルメチル-、3-ピリジルメチル-、4-ピリジルメチル-、フェニル、シクロヘキシル、

【化13】



10

20

【0180】


リンカーユニットのアミノ酸ユニットは酵素（腫瘍関連プロテアーゼが含まれるが、これに限定されない）によって酵素的に切断され、薬剤ユニット（-D）が解放され、これは *in vivo* では解放時にプロトン化され細胞傷害性薬剤（D）を与える。

30

【0181】

W_w ユニットの例は式（V）～（VII）によって表わされる。

【化14】



(V)

40

【0182】

ここで、 R^3 と R^4 は以下の通りである。

【0183】

R^3	R^4
ベンジル	$(CH_2)_4NH_2$;
メチル	$(CH_2)_4NH_2$;
イソプロピル	$(CH_2)_4NH_2$;
イソプロピル	$(CH_2)_3NHCONH_2$;


50

(59)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

ベンジル $(\text{CH}_2)_3 \text{NHCONH}_2$;
 イソブチル $(\text{CH}_2)_3 \text{NHCONH}_2$;
 sec-ブチル $(\text{CH}_2)_3 \text{NHCONH}_2$;

【化15】



【0184】

 $(\text{CH}_2)_3 \text{NHCONH}_2$;


ベンジル

メチル ; および

ベンジル

 $(\text{CH}_2)_3 \text{NHC}(\text{=NH})\text{NH}_2$;

【化16】




(VI)

【0185】

ここで R^3 、 R^4 および R^5 は以下の通りである

R^3	R^4	R^5
ベンジル	ベンジル	$(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$;
イソプロピル	ベンジル	$(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$; および
H	ベンジル	$(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$;

【化17】



(VII)

【0186】

ここで R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は以下の通りである

R^3	R^4	R^5	R^6
H	ベンジル	イソブチル	H ; および
メチル	イソブチル	メチル	イソブチル

好ましいアミノ酸ユニットとしては、式(V)のユニットにおいて、 R^3 がベンジルであり、 R^4 が $-(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$ であるもの ; R^3 がイソプロピルであり、 R^4 が $-(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$ であるもの ; R^3 がイソプロピルであり、 R^4 が $-(\text{CH}_2)_3 \text{NHC}(\text{=NH})\text{NH}_2$ であるものが含まれる(ただし、これらに限定されない)。別の好ましいアミノ酸ユニットは、式(VI)のユニットにおいて、 R^3 がベンジルであり、 R^4 がベンジルであり、 R^5 が $-(\text{CH}_2)_4 \text{NH}_2$ である。

10

20

30

40

50

(60)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【0187】

本発明において有用な $-W_w-$ ユニットは、特定の腫瘍関連プロテアーゼによる酵素切断についてその選択性を基準として設計し最適化することができる。好ましい $-W_w-$ ユニットはその切断がプロテアーゼ、カテプシンB、CおよびDおよびプラスミンによって触媒されるものである。

【0188】

1つの実施形態では、 $-W_w-$ はジペプチド、トリペプチドまたはテトラペプチドユニットである。

【0189】

R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 または R^6 が水素以外である場合、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 または R^6 が結合する炭素原子はキラルである。 10

【0190】

R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 または R^6 が結合する各炭素原子は、独立して(S)配置か(R)配置である。

【0191】

好ましい実施形態では、アミノ酸ユニットはフェニルアラニン-リジンジペプチド(phenyllysまたはFKリンカー)である。別の好ましい実施形態では、アミノ酸ユニットは、バリン-シトルリン・ジペプチド(val-citまたはVCリンカー)である。

【0192】

5.6.1.3 スペーサーユニット

スペーサーユニット(Y)は、存在する場合、アミノ酸ユニットを薬剤ユニットに連結する。スペーサーユニットには2つの一般的なタイプ、すなわち、自己犠牲的タイプと非自己犠牲的タイプがある。非自己犠牲的スペーサーユニットは、抗CD30抗体-リンカー-薬剤コンジュゲートまたは薬剤-リンカー化合物からアミノ酸ユニットが酵素により切断した後もスペーサーユニットの一部またはすべてが薬剤ユニットに結合したままであるものである。非自己犠牲的スペーサーユニットの例は、(グリシン-グリシン)スペーサーユニットおよびグリシンスペーサーユニット(両者ともスキーム1に示す)である(ただし、これらに限定されない)。本発明のグリシン-グリシンスペーサーユニットまたはグリシンスペーサーユニットを含む抗CD30抗体リンカー-薬剤コンジュゲートが、腫瘍細胞関連プロテアーゼ、癌細胞関連プロテアーゼまたはリンパ球関連プロテアーゼにより酵素的に切断する場合、グリシン-グリシン薬剤部分またはグリシン-薬剤部分はA-T- W_w- から切断される。薬剤を解放するためには、グリシン-薬剤ユニット結合を切断させる独立した加水分解反応が標的細胞内に起こらなければならない。 20 30

【0193】


好ましい実施形態では、 $-Y_y-$ はp-アミノベンジルエーテルであり、これは Q_m (ここで、Qは $-C_1-C_8$ アルキル、 $-C_1-C_8$ アルコキシ、ハロゲン、ニトロまたはシアノであり、mは0~4の範囲の整数である)で置換されていてもよい。

(61)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【 化 1 8 】

スキーム 1



10

【 0 1 9 4 】

1つの実施形態では、非自己犠牲的スペーサーユニット(- Y -)は、 - G l y - G l y - である。

【 0 1 9 5 】

別の実施形態では、非自己犠牲的スペーサーユニット(- Y -)は、 - G l y - である。

20

【 0 1 9 6 】

1つの実施形態では、薬剤-リンカー化合物または抗CD30抗体-リンカー-薬剤コンジュゲートはスペーサーユニットを欠いている(y = 0)。


【 0 1 9 7 】

あるいは、自己犠牲的なスペーサーユニットを含む本発明の抗CD30抗体-リンカー-薬剤コンジュゲートは、個別の加水分解ステップの必要なしで薬剤(D)を放出することができる。これらの実施形態では、 - Y - は p - アミノベンジルアルコール(P A B)ユニットであり、 P A B 基の窒素原子を介して - W_w - に連結され、カーボネート、カルバメートまたはエーテル基によって - D に直接接続される(スキーム2およびスキーム3)。

30

【 化 1 9 】

スキーム 2



40

50

(62)


J P 2005-511627 A 2005.4.28

【0198】

ここで、Qは $-C_1-C_8$ アルキル、 $-C_1-C_8$ アルコキシ、 $-$ ハロゲン、 $-$ ニトロ、 $-$ シアノであり；mは0～4の範囲の整数であり；また、pは1～20の範囲の整数である。

【化20】

スキーム3



10

20

【0199】

ここで、Qは $-C_1-C_8$ アルキル、 $-C_1-C_8$ アルコキシ、 $-$ ハロゲン、 $-$ ニトロ、 $-$ シアノであり；mは0～4の範囲の整数であり；また、pは1～20の範囲の整数である。

【0200】

自己犠牲的スペーサーの他の例には、PAB基と電子的に等価な芳香族化合物、例えば2-アミノイミダゾール-5-メタノール誘導体（例えば、Hayら、Bioorg. Med. Chem. Lett.、1999、9、2237参照）およびオルト-またはパラ-アミノベンジルアセタールが含まれる（ただし、これらに限定されない）。置換または未置換の4-アミノ酪酸アミド（Rodriguesら、Chemistry Biology、1995、2、223）、適切に置換されたピシクロ[2.2.1]およびピシクロ[2.2.2]環系（Stormら、J. Amer. Chem. Soc.、1972、94、5815）および2-アミノフェニルプロピオン酸アミド（Amsberryら、J. Org. Chem.、1990、55、5867）などのような、アミド結合の加水分解により容易に環化するスペーサーを使用することができる。また、グリシンのα位が置換されたアミン含有薬剤の脱離（Kingsburyら、J. Med. Chem.、1984、27、1447）も本発明の抗CD30抗体-リンカー-薬剤コンjugateに適用することができる自己犠牲的なスペーサー戦略の例である。

30

40

【0201】


別の実施形態では、スペーサーユニットは、分岐したビス（ヒドロキシメチル）スチレン（BHMS）ユニット（スキーム4）であり、これは追加の薬剤を組込むために使用することができる。

(63)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【化 2 1】

スキーム 4



10

【 0 2 0 2 】

ここで、Q は $-C_1 - C_8$ アルキル、 $-C_1 - C_8$ アルコキシル、ハロゲン、ニトロ、シアノであり；m は 0 ~ 4 の範囲の整数であり；n は 0 または 1 であり；また、p は 1 ~ 20 の範囲の整数である。

【 0 2 0 3 】

1 つの実施形態では、2 つの - D 部分は同一である。

20


【 0 2 0 4 】

別の実施形態では、2 つの - D 部分は異なる。

【 0 2 0 5 】

好ましいスペーサーユニット ($-Y_y-$) は式 (V I I I) ~ (X) によって表わされる。

【化 2 2】




30

(VIII)

【 0 2 0 6 】

ここで、Q は $C_1 - C_8$ アルキル、 $C_1 - C_8$ アルコキシル、ハロゲン、ニトロ、シアノであり；m は 0 ~ 4 の範囲の整数である。

【化 2 3】




40

(IX); および

(64)

J P 2005-511627 A 2005.4.28



(X).

【0207】

5.6.2 薬剤

本発明は、免疫学的疾患の治療または予防のための抗CD30 ADCの使用を包含する。本明細書で使用する場合、「薬剤」または「細胞傷害性薬剤」という用語は、本発明の抗CD30 ADCとの関連で使用された場合、放射性同位体を含まない。これ以外の点では、当業者に知られているどのような薬剤も、本発明のADCに関して使用することができる。

10

【0208】

本発明の抗CD30抗体へのコンジュゲーションのために使用される薬剤は、ドキソルビシン、パクリタキセル、メルファラン、ピンカアルカロイド、メトトレキサート、マイトマイシンC、エトポシドなどの従来の化学療法剤を含むことができる。さらに、CC-1065類似体、カリチアミシン、メイタンシン、ドラスタチン10の類似体、リゾキシシンおよびパリトキシシンなどの有効な薬剤を、条件によっては安定したリンカーを使用して、抗CD30抗体に結合して有効なイムノコンジュゲートを形成することができる。本発明の抗CD30抗体へのコンジュゲーションのための他の適当な薬剤の例は、下記5.12.1節に示す。

20

【0209】

ある実施形態では、本発明のADCは、CD30発現細胞上でドキソルビシンより少なくとも40倍より強力である薬剤を含む。そのような薬剤には、DNA副溝結合剤、例えば、エネジイン(enediyne)、レキシトロブシン、デュオカルマイシン、タキサン(パクリタキセルおよびドセタキセルを含む)、ピューロマイシン、ピンカアルカロイド、CC-1065、SN-38、トポテカン、モルホリノードキソルビシン、リゾキシシン、シアノモルホリノードキソルビシン、エキノマイシン、コンプレタスタチン、ネトロブシン、エピチロンAおよびB、エストラムスチン、クリプトフィシン、セマドチン、メイタンシノイド類、ドラスタチン類、例えば、オーリスタチンE、ドラスタチン-10、MMAE、ディスコデルモリド、エロイテロピンおよびミトキサントロン(mitoxantrone)が含まれる(ただし、これらに限定されない)。

30

【0210】

ある特定の実施形態では、本発明の抗CD30 ADCはエネジイン部分を含む。特定の実施形態では、エネジイン部分は、カリケアマイシンである。エネジイン化合物はベルグマン環化を介してジラジカルを生成することにより2本鎖DNAを切断する。

【0211】

本発明の組成物および方法と共に使用することができる、様々な細胞傷害性薬剤と細胞静止剤は、「Drug Conjugates and their use for treating cancer, an autoimmune disease or an infectious disease」と題する米国仮出願第60/400,403号(発明者: Peter D. Senter, Svetlana DoroninaおよびBrian E. Toki、提出日: 2002年7月31日)に記載されており、これは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる。

40

【0212】

他の特定の実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤はオーリスタチンEまたはその誘導体である。

【0213】

好ましい実施形態では、オーリスタチンE誘導体はオーリスタチンEとケト酸の間で形

50

(65)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

成されたエステルである。例えば、オーリスタチン E は A E B と A E V B を生産するためにパラアセチル安息香酸かベンゾイル吉草酸とそれぞれ反応させることができる。他の好ましいオーリスタチン誘導体は M M A E と A E F P を含む。

【0214】

当技術分野でドラスタチン-10 としても知られているオーリスタチン E およびその誘導体の合成および構造は、米国特許出願第 09/845,786 号および米国特許出願第 10/001,191 号；国際特許出願 P C T / U S 02/13435；米国特許第 6,323,315 号；米国特許第 6,239,104 号；米国特許第 6,034,065 号；米国特許第 5,780,588 号；米国特許第 5,665,860 号；米国特許第 5,663,149 号；米国特許第 5,635,483 号；米国特許第 5,599,902 号；米国特許第 5,554,725 号；米国特許第 5,530,097 号；米国特許第 5,521,284 号；米国特許第 5,504,191 号；米国特許第 5,410,024 号；米国特許第 5,138,036 号；米国特許第 5,076,973 号；米国特許第 4,986,988 号；米国特許第 4,978,744 号；米国特許第 4,879,278 号；米国特許第 4,816,444 号；および米国特許第 4,486,414 号（それらのすべては参照によってそれらの全体に本願明細書に組み込まれる）。

10

【0215】

特定の実施形態では、薬剤は D N A 副溝結合剤である。そのような化合物およびそれらの合成例は、米国特許第 6,130,237 号（それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）に開示されている。ある実施形態では、薬剤は C B I 化合物である。

20

【0216】

本発明のある実施形態では、本発明の A D C は抗チューブリン剤を含む。抗チューブリン剤は癌治療用化合物として十分に確立している種類である。抗チューブリン剤の例には、タキサン類（例えば T a x o l（登録商標）（パクリタキセル）、ドセタキセル）、T 67（T u l a r i k）、ビンカ類およびオーリスタチン類（例えば、オーリスタチン E、A E B、A E V B、M M A E、A E F P）（ただし、これらに限定されない）。このクラスに含まれる抗チューブリン剤はさらに次のとおりである：ピンクリスチンとピンブラスチンを含むビンカアルカロイド、ビンデシンおよびビンオレルビン；パクリタキセルおよびドセタキセルとバッカチン誘導体などのようなタキサン類、エピチロン A および B、ノコダゾール、コルヒチンおよびコルチミド、エストラムスチン、クリプトフィシン、セマドチン、メイタンシノイド類、コンプレタスタチン類、ドラスタチン類、ディスコデルモリドおよびエロイテロビン。

30

【0217】

特定の実施形態では、薬剤はメイタンシノイド（抗チューブリン剤のグループ）である。より具体的な実施形態では、薬剤はメイタンシンである。さらに、特定の実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は D M-1（イムノジェン（I m m u n o G e n）社；また、C h a r i ら、1992、C a n c e r R e s 52:127~131 頁参照）である。メイタンシン（天然物）は、チューブリン重合を阻害し有糸分裂の阻止および細胞死をもたらす。したがって、メイタンシンの作用メカニズムはピンクリスチンとピンブラスチンのそれに似ているように思われる。しかし、メイタンシンは、これらのビンカアルカロイドより i n v i t r o での細胞傷害性が約 200~1,000 倍大きい。

40

【0218】

別の特定の実施形態では、薬剤は A E F P である。

【0219】

本発明のある特定の実施形態では、薬剤は 50、100 または 200 個以上のアミノ酸のポリペプチド（例えば、毒素）ではない。本発明の特定の実施形態では、薬剤はリシンではない。

【0220】

本発明の他の特定の実施形態では、本発明の A D C は、1 種または複数の細胞傷害性薬剤または細胞静止剤（相互に排他的でない以下の薬剤種）を含まない：アルキル化剤、ア

50

(66)

J P 2005-511627 A 2005.4.28


ントラサイクリン類、抗生物質、抗葉酸類、代謝拮抗剤、抗チューブリン剤、オーリスタチン類、化学療法増感剤、DNA副溝結合剤、DNA複製阻害剤、デュオカルマイシン類、エトボシド類、フッ素化ピリミジン類、レキシトロブシン類、ニトロソ尿素類、プラチノール類、プリン代謝拮抗剤、ビユーロマイシン、放射線増感剤、ステロイド類、タキサン類、トポイソメラーゼ阻害剤、ピンカアルカロイド、プリンアンタゴニストおよびジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤。より具体的な実施形態では、高効力薬剤は、男性ホルモン、アントラマイシン(AMC)、アスパラギナーゼ、5-アザシチジン、アザチオプリン、ブレオマイシン、ブスルファン、ブチオニン(buthionine)、スルホキシミン(sulfoximine)、カンプトテシン、カルボプラチン(carboplatin)、カルムスチン(carmustine)(BSNU)、CC-1065、クロラムブチル、シスプラチン、コルヒチン、シクロホスファミド、シタラビン、シチジンアラビノシド、サイトカラシンB、デカルバジン(dacarbazine)、ダクチノマイシン(dactinomycin)(以前はアクチノマイシン)、ダウノルビシン、デカルバジン(decarbazine)、ドセタキセル、ドキソルビシン、エストロゲン、5-フルオロデオキシウリジン、5-フルオロウラシル、グラミシジンD、ヒドロキシ尿素、イダルビシン(idarubicin)、イホスファミド(ifosfamide)、イリノテカン(irinotecan)、ロムスチン(lomustine)(CCNU)、メクロレタミン(mechlorethamine)、メルファラン、6-メルカプトプリン、メトトレキサート、ミトラマイシン、マイトマイシンC、ミトキサントロン(mitoxantrone)、ニトロイミダゾール、パクリタキセル、プリカマイシン、プロカルビジン、ストレプトゾトシン、テポノシド、6-チオグアニン、チオTEPA、トボテカン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンオレルビン、VP-16、VM-26、アゾチオプリン、ミコフェノレートモフェチル、メトトレキサート、アシクロビル、ガングシクロビル、ジドブジン(zidovudine)、ビダラビン(vidarabine)、リバパリン(vidarabine)、アジドチミジン、シチジン・アラビノシッド、アマンタジン、ジデオキシウリジン、ヨードデオキシウリジン、ボスカルネット(poscarnet)およびトリフルウリジン(trifluridine)の1種または複数ではない。

【0221】

5.6.2.1 ドラスタチン薬剤

ある実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤はドラスタチンである。より具体的な実施形態では、ドラスタチンはオーリスタチンのクラスである。本発明の特定の実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤はMMAE(MMAE:式XI)である。本発明の別の特定の実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤はAEFP(式XVI)である。

【化24】



(XI)


【0222】

本発明のある実施形態では、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は式XII~XVIIのドラスタチンである。

(67)


J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28

【 化 2 5 】




(XII)

10




(XIII)

20



(XIV)

30




(XV)

40

50


(68)

J P 2005-511627 A 2005.4.28



10


(XVI)



20

(XVII)

30



40

(XVIII)

【 0 2 2 3 】

5 . 6 . 3 抗 C D 3 0 抗体 - 薬剤コンジュゲートの形成

抗 C D 3 0 抗体薬剤コンジュゲート (A D C) の作製は当業者に知られている任意の技術によって遂行することができる。簡単に言えば、抗 C D 3 0 A D C は抗 C D 3 0 抗体、薬剤、および薬剤と抗体を連結するリンカーを含む。多数の様々な反応が薬剤の抗体への共有結合的結合に利用可能である。これはしばしば、リジンのアミン基、グルタミン酸やアスパラギン酸の遊離カルボキシル基、システインのスルフィド基および様々な芳香

50

(69)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

族アミノ酸基を含む抗体分子のアミノ酸残基の反応によって遂行される。共有結合的結合で最も一般に用いられている非特異的方法のうちの１つは、化合物のカルボキシル基（またはアミノ）基を、抗体のアミノ（またはカルボキシル）基に連結するカルボジイミド反応である。さらに、ジアルデヒド類またはイミドエステル類などの二官能性剤は、化合物のアミノ基を抗体分子のアミノ基に連結するために使用されてきた。また、シッフ塩基反応も薬剤の抗体への結合に利用可能である。この方法は、グリコールまたは水酸基を含む薬剤の過ヨウ素酸塩酸化を含んでおり、それによりアルデヒドを形成する（これは、次いで、抗体分子と反応する）。結合は、抗体分子のアミノ基とのシッフ塩基形成を通して生じる。イソチオシアネートも、抗体に共有結合的に薬剤を結合するためにカップリング剤として使用することができる。他の技術も当業者に知られており、本発明の範囲内である。そのような技術の例は、例えば、米国特許第 5,665,358 号、米国特許第 5,643,573 号および米国特許第 5,556,623 号（これらは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる）に記載されている（ただし、これらに限定されない）。

10

【 0 2 2 4 】

ある実施形態では、リンカーの前駆体である中間体を、適当な条件下に薬剤と反応させる。ある実施形態では、薬剤および／または中間体上で反応性基が用いられる。薬剤と中間体の間の反応の生成物（すなわち誘導された薬剤）を、続いて、適当な条件下に抗 CD30 抗体と反応させる。誘導体化された薬剤と抗体との間の反応のために選択された条件下での抗体の安定性を維持するように注意するべきである。

【 0 2 2 5 】

20

5.7 細胞傷害性および細胞静止活性の分析

定義によって、本発明のタンパク質は、活性化リンパ球に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすものでなければならない。CD30 結合タンパク質の細胞静止作用または細胞傷害作用についてのアッセイを行い得る活性化リンパ球は、培養された細胞系統（例えば、ジャーカット（Jurkat）および CESS（これらの両方とも ATCC から入手可能である）；または Karpas 299 および L540（これらの両方ともドイツの Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH から入手可能である）でもよいし、または新鮮な血液試料から調製したリンパ球由来でもよい。当業者には認識されるように、抗体とサイトカインの適当な混合物でリンパ球を活性化できる。例えば、下記 1.1 節に記載するように Tリンパ球は抗 CD3 および抗 CD28 抗体および IL-2 の組合せを使用して活性化できる。

30

【 0 2 2 6 】

タンパク質が細胞に対して細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすかどうか決める多くの方法が、当業者に知られており、特定のタンパク質が本発明のタンパク質であるか否かを明らかにするのに用いることができる。そのような方法を説明する例を下に記載する。

【 0 2 2 7 】

CD30 に結合するタンパク質が、活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼさない場合、そのタンパク質を上記 5.1 節に記載した方法によって多量化し、この多量体が活性化リンパ球に対する細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼす能力を分析することができる。

40

【 0 2 2 8 】

好ましい実施形態では、活性化リンパ球に対する細胞静止作用または細胞傷害作用を評価する前に、本発明のタンパク質を架橋する。例示的な実施形態（この場合、本発明のタンパク質は抗 CD30 抗体である）では、抗体は溶液中で架橋され得るし、１種または複数の抗 CD30 抗体の希釈液は、第 2 の抗体の存在下または不在下に 96 穴平底組織培養プレートに滴下することができる。次いで、活性化リンパ球をおよそ 5,000 個の細胞／ウェルでプレートに加える。次いで、本願明細書に記載するようにして、例えば、活性化リンパ球への放射性標識チミジンの取り込みの阻害として、細胞静止作用または細胞傷害作用を評価することができる。

50

(70)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【0229】

タンパク質が (i) CD30 に結合し、(ii) 活性化リンパ球に対し細胞静止作用または細胞傷害作用を及ぼすことが確認されたならば、その動物モデルでの治療可能性が確認される。免疫学的疾患の典型的な動物モデルは下記 5.7.1 節に記載する。

【0230】

抗 CD30 抗体が活性化リンパ球に対する細胞静止作用を及ぼすか否かを判定する好ましい実施形態では、チミジン取り込みアッセイを用いることができる。例えば、96穴プレートに約 5,000 細胞/ウェルの密度で載せた活性化リンパ球を 72 時間の間培養し、72 時間の期間の最後の 8 時間、0.5 μ Ci の ^{3} H-チミジンにさらし、抗体の存在下または不在下に培養細胞への ^{3} H-チミジンの取り込みを測定する。

10

【0231】

当業者に知られている多数の細胞傷害性アッセイが存在する。これらのアッセイには壊死を測定するものもあるし、アポトーシス（プログラムされた細胞死）を測定するものもある。壊死には形質膜の浸透性増加が伴い細胞は膨張して、形質膜は数分内に破裂する。他方、アポトーシスは、細胞膜の泡状突起の増加、細胞質の凝縮および内生的なエンドヌクレアーゼの活性化により特徴づけられる。上に記載した細胞静止作用または細胞傷害作用を測定するアッセイの代わりとして、CD30-結合タンパク質が活性化リンパ球の処理または予防において有用なことを示すのには、活性化リンパ球に対するこれらの効果のうちの 1 つだけで十分である。

【0232】

20

1 つの実施形態では、壊死はまたはニュートラルレッド、トリパンブルーまたは ALAMAR (商標) ブルーなどの染料を取り込む細胞の能力の有無によって測定される (Page ら、1993、*Intl. J. of Oncology* 3:473~476 頁)。このようなアッセイでは、細胞を、染料を含む培地中でインキュベートし、細胞を洗浄し、染料を取り込む細胞の能力を反映する残留染料を分光分析によって測定する。

【0233】

別の実施形態では、染料がスルホローダミン B (SRB) であり、そのタンパク質への結合が細胞傷害性の尺度として使用できる (Skehan ら、1990、*J. Nat'l Cancer Inst.* 82:1107~112 頁)。

【0234】

30

さらに別の実施形態では、MTT などのテトラゾリウム塩を定量的熱量分析に使用し、生細胞（死細胞ではない）の検出により哺乳類細胞の生存および増殖を調べる（例えば、Mosmann、1983、*J. Immunol. Methods* 65:55~63 頁参照）。

【0235】

さらに別の実施形態では、培養物中の結合部分と「浮遊」部分の両方によってアポトーシス細胞を測定する。上清を取り、結合細胞をトリプシン分解し、遠心分離洗浄ステップ（10分、2000 rpm）後に両方の調製物を組み合わせることによって両方のコンパートメントを回収する。スリンドック (sulindac) および関連化合物で腫瘍細胞培養を処理して顕著な量のアポトーシスを得るプロトコルが、文献（例えば、Piazza ら、1995、*Cancer Research* 55:3110~116 頁参照）に記載されている。この方法の特徴は、浮遊細胞および結合細胞の両者を回収し、DNA の断片化によって検出されるアポトーシスの観察のために最適な処理時間および投与量範囲を同定し、さらにまた最適な細胞培養条件を同定することを含む。

40

【0236】

さらに別の実施形態では、DNA 断片化の測定によりアポトーシスを定量する。DNA 断片化は *in vitro* での光定量法が利用可能である。TUNEL（これは断片化された DNA 中に組み込まれた標識されたヌクレオチドを検出する）を含む、そのようなアッセイおよび ELISA に基づくアッセイの例が、*Biochemica*、1999、no. 2、34~37 頁 (Roche Molecular Biochemicals)

50

(71)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

に開示されている。

【0237】

別の実施形態では、アポトーシスを形態学的に観察することができる。

【0238】

試験タンパク質または核酸で処理した後、アクリジンオレンジおよび臭化エチジウムで標識してから蛍光顕微鏡を使用して培養物についてアポトーシスと壊死をアッセイする。アポトーシス細胞数を測定する方法は、Duke & Cohen、1992、Current Protocols In Immunology、Coliganら、eds.、3.17.1-3.17.16によって以前に記載された。別の実施形態では、細胞をDNA染料であるヨウ化プロビジウムで標識し、クロマチンの凝縮、核内膜に沿った呈色、細胞質の凝縮、細胞膜の泡状突起の増加および細胞の収縮などの形態変化について細胞を観察する。

10

【0239】

5.7.1 免疫学的疾患の動物モデル

臨床試験を行う前に、本発明の分子は免疫学的疾患の動物モデルにおいて試験または効果確認できる。免疫学的疾患について確立した多くの動物モデルが、当業者に知られており、本発明の分子の有効性を分析するためには、そのいずれを使用することもできる。そのようなモデルの例を以下に記載する（ただし、これらに限定されない）。

【0240】

糖尿病、狼瘡、全身性硬化症、ショーグレン症候群、実験的な自己免疫脳脊髄炎（多発性硬化症）、甲状腺炎、重症筋無力症、関節炎、葡萄膜炎、炎症性腸疾患を含む全身および器官特異的自己免疫疾患の動物モデル用のいくつかの例が、Bigazzi, P.、*「Animal Models of Autoimmunity: Spontaneous and Induced」*、in *The Autoimmune Diseases*、RoseとMackay（編）、211~244頁（Academic Press、1998）および*「Animal Models for Autoimmune and Inflammatory Disease」*、in *Current Protocols in Immunology*、Coliganら（編.）、Chapter 15（Wiley、1997）に記載されている。

20

【0241】

アレルギー症状（例えば喘息、皮膚炎）もげっ歯動物でモデル化することができる。航空機過敏症（airway hypersensitivity）は、オブアルブミン（Tomkinsonら、2001、J. Immunol. 166: 5792~5800頁）またはシストソーマ・マンソーニ（Schistosoma mansoni）卵抗原（Tesciubaら、2001年、J. Immunol. 167: 1996~2003頁）で誘導できる。マウスのNc/Nga株は、血清IgEの顕著な増加を示し、アトピー性皮膚炎状の損傷を自然に示す（Vestergaardら、2000、Mol. Med. Today 6: 209~210頁；Watanabeら、1997、Int. Immunol. 9: 461~466頁；Saskawaら、2001、Int. Arch. Allergy Immunol. 126: 239~247頁）。

30

40

【0242】

致死量の照射を行った組織不適合性宿主への免疫力のあるドナーからリンパ球の注入は、マウスにおいて急性GVHDを誘導する古典的アプローチである。あるいは、親B6D2F1マウスモデルは、急性、慢性両方のGVHDを誘導する系を提供する。このモデルでは、B6D2F1マウスは、C57BL/6およびDBA/2マウスの親株の交配により得られるF1子孫である。DBA/2リンパ球を非照射B6D2F1マウス中に導入すると、慢性GVHDを引き起こすが、C57BL/6、C57BL/10またはB10.D2リンパ球を導入すると、急性GVHDが引き起こされる（Slaybackら、2000、Bone Marrow Transpl. 26: 931~938頁；Katatakaら、2001、Immunology 103: 310~318頁）。

50

(72)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【0243】

さらに、ヒト造血幹細胞および成熟末梢血リンパ球は両者とも、SCIDマウスに移植可能であり、これらのヒト・リンパー造血幹細胞はSCIDマウス中において機能を保つ(McCuneら、1988、Science 241:1632~1639頁; Kamel-ReidとDick、1988、Science 242:1706~1709頁、Mosierら、1988、Nature 335:256~259頁)。これは、可能性のある治療剤をヒトリンパ球上に直接に試験する小動物モデル系をもたらした。例えば、ヒトマウスキメラモデルは抗IL-4、抗IL-13、抗IL-5および二重ムテイン(double-mutain)IL-4の治療可能性を検討するために用いられた(Tournoyら、2001、J. Immunol. 166:6982~6991)。

10

【0244】

5.8 シグナル伝達活性のアッセイ

ある好ましい実施形態では、本発明のタンパク質は、CD30を発現するリンパ球に結合することで、CD30を介した1つまたは複数のシグナル伝達特性を誘導することができる。CD30結合タンパク質のシグナル伝達作用についてアッセイすることができるCD30-発現リンパ球は、培養された細胞系統(例えば、ジャーカット(Jurkat)およびCESS(これらの両方ともATCCから入手可能である);またはKarpas 299およびL540(これらの両方ともドイツのSammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbHから入手可能である)でもよいし、または新鮮な血液試料から調製したリンパ球由来でもよい。

20

【0245】

好ましい実施形態では活性化リンパ球に対するその活性を評価するのに先立って、本発明のタンパク質を架橋する。例示的な実施形態(この場合、本発明のタンパク質は抗CD30抗体である)では、抗CD30抗体は溶液中で架橋され得る。簡単に言えば、1種または複数の抗CD30抗体の希釈液は、第2の抗体の存在下または不在下に96穴平底組織培養プレートに滴下することができる。次いで、活性化リンパ球をおよそ5,000個の細胞/ウェルでプレートに加える。次いで、本願明細書に記載するようにして、抗体のシグナル伝達活性を評価することができる。

【0246】

タンパク質がCD30を介した1つまたは複数のシグナル伝達特性を誘導することができるかどうかを決める多数の方法が、当業者に知られている。そのような方法を説明する例を下に記載する。

30

【0247】

5.8.1 カルシウム放出

1つの実施形態では、本発明のタンパク質は、例えば、第2の抗体と架橋した際に、ジャーカット細胞において細胞内の遊離 Ca^{2+} の放出を誘導できる。細胞内の遊離 Ca^{2+} の放出はEllisら(1993、J. Immunol.、151、2380~2389頁)またはMondとBrunswick(1998、Current Protocols in Immunology、Unit 3.9、Wiley)が記載したようにして測定することができる。

40

【0248】

5.8.2 TRAF局在

TRAF1、TRAF2、TRAF3およびTRAF5を含む4つのTNF受容体関連因子(TRAF)がCD30の細胞質側尾部(cytoplasmic tail)と相互作用することが実証されている(Gedrichら、1996、J. Biol. Chem.、271、12852~12858頁; Leeら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、9699~9703頁; Ansieauら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、14053~14058頁; Aizawaら、1997、J. Biol. Chem.、272、2042~2045頁; Tsitsikovら、1997、Proc. Natl. Acad. Sci. US

50

(73)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

A.、94、1390～1395頁；Leeら、1997、J. Exp. Med.、185、1275～1285頁；Duckett and Thompson、1997、Genes Dev.、11、2810～2821頁）。同時トランスフェクション研究、酵母2ハイブリッドスクリーニングおよびGST融合タンパク質を使用し、TRAF相互作用サイトをCD30の細胞質側尾部のカルボキシル末端にマッピングし、細胞質ゾル相中でのCD30とのTRAFの間の会合がCD30を媒介としたシグナル・カスケードのキー・イベントであるとの仮説が立てられた。CD30とTRAFの間の相互作用は、CD30結合は必要としないようである（Ansieauら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、14053～14058頁；Aizawaら、1997、J. Biol. Chem.、272、2042～2045頁）。しかし、CD30の架橋があると、細胞溶解物の界面活性剤可溶画分からTRAF1およびTRAF2が消失する（Duckett and Thompson、1997、Genes Dev.、11、2810～2821頁；Archら、2000、Biochem. Biophys. Res. Commun.、272、936～945頁）。TRAF2が消失すると、それに対応して核を含む界面活性剤不溶画分における検出可能なTRAF2の量が増大する（Archら、2000、Biochem. Biophys. Res. Commun.、272、936～945頁）。さらに、細胞下の局在研究によって、CD30の架橋は、TRAF2の細胞質ゾルから細胞中の核周辺領域への転位（translocation）を誘導することが確認された（Archら、2000、Biochem. Biophys. Res. Commun.、272、936～945頁）。このようなTRAF2のCD30媒介転移は、細胞感度を調節することにより、細胞生存をモジュレートし、TNF受容体スーパーファミリーの他のTRAF結合メンバーによって誘導されたアポトーシスを進行させるとの仮説が立てられている（Duckett and Thompson、1997、Genes Dev.、11、2810～2821頁；Archら、2000、Biochem. Biophys. Res. Commun.、272、936～945頁）。

【0249】

本発明の抗体がTRAF2の核転位を誘導するかどうか判定するために、本発明の抗体をCD30⁺細胞および第2の抗体のような架橋剤と接触させる。次いで、共焦点顕微鏡を使用して、TRAF2の局在を、本発明の抗体（プラス架橋試薬）と共にインキュベートした細胞と本発明の抗体と共にインキュベートしなかった細胞とで比較することができる。

【0250】

別の実施形態では、本発明の抗体がTRAF2の核局在を誘導するかどうかを、例えば、ウェスタンブロットで様々な細胞画分中でTRAF2の量を測定してアッセイすることができる。例えば、本発明の抗体2μg/mlを0.5×10⁶/mlのCD30⁺細胞と共にインキュベートすることができる。抗体を37℃、5%CO₂で、第2の抗体（例えば、本発明の抗体がマウスモノクローナル抗体である場合、ヤギ抗マウスIgG Fc特異抗体（ジャクソン・イムノリサーチ（Jackson ImmunoResearch）、ペンシルヴェニア州ウェスト・グロブ所在（West Grove, PA）を第2の抗体として使用することができる）20μg/mlで架橋する。指定された時点（例えば、2～24時間）で、5×10⁶個の細胞を取り出し遠沈させる。氷冷したPBSで2回洗浄した後、細胞を、プロテアーゼ阻害剤カクテル（ロシュ・ダイアグノスティック GmbH（Roche Diagnostics GmbH）、ドイツ、マンハイム所在（Mannheim, Germany）を添加した溶解緩衝液（0.15M NaCl、0.05M トリス-HCl、pH8.0、0.005M EDTAおよび0.5% NP-40またはトライトンX-100）中、100×10⁶/mlで溶解させる。溶解は4℃で2時間一定の混合を行いつつ行う。溶解後に、界面活性剤可溶画分および界面活性剤不溶画分を14,000×gで20分間遠心分離によって分離する。次いで、界面活性剤可溶画分を個別の試験管に移し、等量の2×SDS-PAGE試料還元緩衝液をそれに加える。界面活性剤不溶画分（すなわち、遠心分離の後の沈殿）にも等量の1×SDS-P

10

20

30

40

50

(74)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

A G E 試料還元緩衝液を加える。両方の画分を 100℃で2分間加熱する。次いで、各時点で約10μずつの画分を12%トリス-グリシンSDS-PAGE(インビトロジェン(Invitrogen)、カリフォルニア州カールスバード所在(Carlsbad、CA))に溶解する。溶解したタンパク質は、P V D F 薄膜(インビトロジェン(Invitrogen))にウェスタン転写(Western-transfer)し、0.05%トウイン20と5%BSAを添加したトリス緩衝塩水(0.05Mトリス-HCl、pH8.0、0.138MNaCl、0.0027MKCl)でブロックする。プロットは、抗T R A F 2抗体(サンタクルーズ(Santa Cruz)、カリフォルニア州サンディエゴ所在(San Diego、CA))でイムノプロットする。様々な画分中のT R A F 2タンパク質の存在は西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)をコンジュゲートしたF(ab')₂ヤギ抗ウサギIgG Fc(ジャクソン・イムノリサーチ(Jackson ImmunoResearch)およびペルオキシダーゼ基質キットDAB(ベクター研究所(Vector Laboratories)、カリフォルニア州バーリントン所在(Burlingame、CA))によって検出する。あるいは、SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate kit(ピアス(Pierce)、イリノイ州ロックフォード所在(Rockford、IL))を検出のために使用することもできる。

【0251】

5.8.3 NF-κBの活性化

本発明のある抗体によって誘導され得ることがはっきりわかっている別のシグナル伝達事象は、NF-κBの活性化である。M44、M67およびBer-H2を含む抗CD30 mAbは、NF-κBの活性化が可能であり、これは標準的な移動度シフトDNA結合アッセイによって検出される(McDonaldら、1995、Eur. J. Immunol.、25、2870~2876頁; Ansieauら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、14053~14058頁; Horieら、1998、Int. Immunol.、10、203~210頁)。このような作用は、ホジキン細胞、T細胞およびCD30発現トランスフェクタント中で観察することができる(McDonaldら、1995、Eur. J. Immunol.、25、2870~2876頁; Biswasら、1995、Immunity、2、587~596頁; Ansieauら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、14053~14058頁; Horieら、1998、Int. Immunol.、10、203~210頁)。初期のマッピング研究は、CD30を媒介としたNF-κBの活性化のためには、T R A F 1、T R A F 2、およびT R A F 5とCD30の細胞質側尾部との間の相互作用が必要になることを明らかにした(Leeら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、9699~9703頁; Ansieauら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、93、14053~14058頁; Aizawaら、1997、J. Biol. Chem.、272、2042~2045頁; Duckettら、1997、Mol. Cell. Biol.、17、1535~1542頁)。最近になって、アゴニスト性mAbによるCD30の結合も、T R A F 2/5に依存しない経路でNF-κBを活性化し得るという証拠が得られている(Horieら、1998、Int. Immunol.、10、203~210頁)。CD30媒介NF-κB活性化の生物学的作用のうちのいくつかは、遺伝子転写(Biswasら、1995、Immunity、2、587~596頁; Maggiraら、1995、Immunity、3、251~255頁)および細胞生存の調節(Mirら、2000、Blood、96、4307~4312頁; Horieら、2002、Oncogene、21、2439~2503頁)を含む。NF-κB活性化の特徴のいずれかをアッセイすることにより、本発明の抗体がCD30シグナル伝達の1つまたは複数の特性を誘導するかどうか判定することができる。

【0252】

本発明の抗体によってCD30⁺細胞にNF-κB活性化が誘導されるかどうかは、例

10

20

30

40

50

(75)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

例えば、 $2 \mu\text{g}/\text{ml}$ の抗体と共に $3 \times 10^6/\text{ml}$ の $\text{CD}30^+$ 細胞をインキュベートし、次いで、抗体を架橋し（例えば、本発明の抗体がマウスモノクローナル抗体である場合、ヤギ抗IgG Fc特異抗体（ジャクソン・イムノリサーチ（Jackson ImmunoResearch）、ペンシルヴェニア州ウェスト・グローブ所在（West Grove, PA）） $20 \mu\text{g}/\text{ml}$ によって架橋することができる）、次いで、培養物を 37°C 、 $5\% \text{CO}_2$ 下で1時間、一定の振盪を行いながらインキュベートすることにより測定できる。細胞密度を $1.2 \times 10^6/\text{ml}$ に調節し、振盪を行いながらさらに1時間インキュベーションする。次いで細胞密度をさらに $0.6 \times 10^6/\text{ml}$ に低減し、細胞を 37°C 、 $5\% \text{CO}_2$ 下でさらに46時間、振盪は行わずにインキュベートした。インキュベーション終了時に、刺激した細胞から核抽出物を調製しNF- κ B活性化について分析した。

10

【0253】

NF- κ B活性化は、 $1850 \times \text{g}$ で20分間遠心分離を行うことによって細胞を回収し、次いで、細胞沈層容積の5倍のPBSで1度洗浄することにより分析する。細胞ペレットを、細胞沈層容積の5倍の低張性緩衝液（ 0.01M Hepes、 $\text{pH} 7.9$ 、 0.0015M MgCl_2 、 0.01M KCl、 0.0002M フェニルメチルスルホニルフルオリド、 0.0005M ジチオスレイトール）で再懸濁する。 $1850 \times \text{g}$ 、5分間の遠心分離によって細胞を回収する。次いで、ペレットを細胞沈層容積の3倍の低張性緩衝液に再懸濁し、氷上で10分間膨潤させる。次いで、膨潤した細胞を、ダウンス式の水モジナイザー中、隙間の狭いB内筒を使用して、ゆっくりした上下動で均質化する。細胞溶解はトリパンブルー排除法によってモニターするが、 80% を超える細胞溶解を達成するためには十分なストロークを用いるべきである。核は15分間、 $3300 \times \text{g}$ の遠心分離によってペレット化する。上清（細胞質抽出液）を除去する。次いで、核ペレットを、 $1/2$ 核沈層容積の低塩緩衝液（ 0.02M Hepes、 $\text{pH} 7.9$ 、 25% 容積/容積グリセリン、 0.0015M MgCl_2 、 0.02M KCl、 0.0002M EDTA、 0.0002M フェニルメチルスルホニルフルオリド、 0.0005M ジチオスレイトール）中に再懸濁する。次いで、等容積の高塩緩衝液（ 0.02M Hepes、 $\text{pH} 7.9$ 、 25% 容積/容積グリセリン、 0.0015M MgCl_2 、 1.2M KCl、 0.0002M EDTA、 0.0002M フェニルメチルスルホニルフルオリド、 0.0005M ジチオスレイトール）を穏やかに撹拌させた核懸濁液にゆっくり加え、KClの最終濃度をおよそ 0.3M とする。抽出液を、30分間穏やかに撹拌し続ける。抽出後、 $25,000 \times \text{g}$ で30分間核を遠心分離によって取り除く。次いで、核抽出液の伝導性が透析緩衝液と同じになるまで、核抽出液を、透析緩衝液（ 0.02M Hepes、 $\text{pH} 7.9$ 、 20% 容積/容積グリセリン、 0.1M KCl、 0.0002M EDTA、 0.0002M フェニルメチルスルホニルフルオリド、 0.0005M ジチオスレイトール）50容積に対して透析する。残存する破砕物を除去するため、核抽出液を、 $25,000 \times \text{g}$ で20分間もう一度遠心分離する。また、上清のタンパク質濃度はマイクロBCAアッセイ（ピアス）（Pierce）により測定する。

20

30

【0254】

抗CD30刺激細胞の核抽出液中のNF- κ Bの存在は、ゲルシフトアッセイシステム（プロメガ（Promega）、ウィスコンシン州マディソン所在（Madison, WI））を使用する標準的な移動度シフトDNA結合アッセイによって検出することができる。配列 $5' - \text{AGT TGA GGG GAC TTT CCC AGG C} - 3'$ （配列番号33）を有するコンセンサスNF- κ B結合モチーフ（LeonardoとBaltimore、1989、Cell、58、227～229頁）を含む2本鎖オリゴヌクレオチドプローブを核抽出液中のNF- κ Bを検出プローブとして使用する。このプローブは、T4ポリヌクレオチド・キナーゼおよび $[\alpha - ^{32}\text{P}] \text{ATP}$ によってリン酸化される。リン酸化されたプローブは、TE緩衝液（ 0.01M トリス-HCl、 $\text{pH} 8.0$ 、 0.001M EDTA）で平衡に保たれたセファロースG25スピン・カラムによって精製する。次いで、精製されたプローブを酢酸アンモニアおよびエタノールで沈殿させ

40

50

(76)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

、次いで、T E 緩衝液 1 0 0 μ l 中に再懸濁させる。抗 C D 3 0 処理した細胞および対照処理した細胞からの核抽出液を含む反応混合物を、G e l S h i f t 結合緩衝液、水およびメーカー指示による標識されていない競合プローブと別々に組み合わせる。N F - κ B コンセンサスを含む標識されていないオリゴヌクレオチドおよび標識されていない無関係のオリゴヌクレオチドを、配列特異的および配列非特異的競合物質として反応混合物に含有させる。室温で 1 0 分間インキュベーションした後、³²P-標識した N F - κ B コンセンサスオリゴヌクレオチド 1 μ l を各反応液に加える。この反応を室温でさらに 2 0 分間継続する。インキュベーション終了時に、1 μ l の 1 0 $\times$ ローディング緩衝液 (0 . 2 5 M トリス - H C l 、p H 7 . 5 、4 0 % 容積 / 容積グリセリン、0 . 2 % のプロモフェノールブルー) を反応液に加える。次いで、この反応液を、6 % の D N A 遅延ゲル (イントロピジェン) (I n v i t r o g e n) の個のウェルにロードし、0 . 5 $\times$ T B E (0 . 0 4 5 M トリス - H C l 、0 . 0 4 5 M ホウ酸、0 . 0 0 1 M E D T A) に、1 0 0 ボルトで 9 0 分間分離させる。電気泳動後に、ゲルをプラスチックラップで覆い、これを - 7 0 $^{\circ}$ C で X 線フィルムに露光し、N F - κ B と N F - κ B 結合配列を含むオリゴヌクレオチドの間の特異的相互作用を検出する。

【 0 2 5 5 】

5 . 9 免疫疾患

本発明の方法は免疫学的疾患 (ここで、免疫学的疾患はリンパ球の不適切な活性化によって特徴づけられる) の治療または予防に有用である。本明細書で使用する場合、「免疫学的疾患」という用語は、ホジキン病および未分化大細胞リンパ腫のような免疫性の癌は包含しない。免疫学的疾患の治療または予防は本発明の方法によれば、そのような治療または予防を必要とする患者に、疾患状態に関係している活性化リンパ球に結合し、リンパ球に対し細胞傷害作用または細胞静止作用を及ぼすタンパク質、好ましくは抗体を投与することにより達成される。

【 0 2 5 6 】

本発明の方法によって治療または予防することができる疾患の例としては、関節リウマチ、多発性硬化症、内分泌腺性眼障害、ブドウ膜炎 (u v e o r e t i n i t i s) 、全身紅斑性狼瘡、重症筋無力症、グレイブ病、糸球体腎炎、自己免疫性肝疾患、自己免疫性炎症性腸疾患、アナフィラキシー、アレルギー反応、シェーグレン症候群、若年性 (タイプ I) 糖尿病、原発性胆汁性肝硬変、ウェゲナー肉芽腫症、結合組織炎、炎症性腸疾患、多発性筋炎、皮膚筋炎、複合的内分泌腺不全、シュミット症候群、自己免疫性ブドウ膜炎、アジソン病、副腎炎、甲状腺炎、橋本甲状腺炎、自己免疫性甲状腺疾患、悪性貧血、胃の萎縮症、慢性肝炎、ルポイド肝炎、アテローム性動脈硬化症、初老期痴呆、脱髄疾患、亜急性皮膚紅斑性狼瘡、上皮小体機能減退症、ドレスラー症候群、自己免疫性血小板減少症、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、尋常性天疱瘡、天疱瘡、疱疹状皮膚炎、円形脱毛症、類天疱瘡、強皮症、進行性全身性硬化症、C R E S T 症候群 (石灰沈着症、レイノー現象、食道運動障害、手指硬化および毛細管拡張症) 、成人糖尿病 (タイプ I I 糖尿病) 、男性および女性の自己免疫性不妊、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、混合性結合組織疾患、結節性多発性動脈炎、全身性壊死脈管炎、若年性関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、アトピー性鼻炎、グッドパスチャー症候群、シャーガス病、サーコイドーシス、リウマチ熱および喘息、反復流産、抗リン脂質症候群、農夫肺、多形性紅斑、心臓切開術後症候群、クッシング症候群、自己免疫性慢性活性肝炎、鳥飼育者肺、アレルギー性脳脊髄炎、中毒性表皮壊死症、アルポート症候群、歯槽骨炎、アレルギー性肺炎、線維化性肺炎、間質性肺疾患、結節性紅斑、壊疽性膿皮症、輸液反応、ハンセン病、マラリア、皮膚リーシュマニア症、トリパノソーマ症、高安動脈炎、リウマチ性多発性筋痛、側頭動脈炎、住血吸虫症、巨大細胞動脈炎、回虫症、アスベルギルス症、サンプター (S a m p t e r) 症候群、湿疹、リンパ腫様肉芽腫症、ベーチェット病、キャプラン症候群、川崎病、 Deng 熱、脳脊髄炎、心内膜炎、心内膜心筋線維症、眼内炎、持久性隆起性紅斑、乾癬、胎児赤芽球症、好酸球性筋膜炎、シャルマン (S h u l m a n) 症候群、フェルティ (F e l t y) 症候群、フィラリア症、毛様体炎、慢性毛様体炎、不整脈毛様体

10

20

30

40

50

(77)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

炎、フック（Fuch）毛様体炎、IgAネフロパシー、ヘノッホ-ショーンライン（Henoch-Schonlein）紫斑病、移植片対宿主病、移植拒絶、ヒト免疫不全ウイルス感染、エコーウイルス感染、心筋症、アルツハイマー病、バルボウイルス病感染、風疹ウイルス感染、予防接種後症候群、先天性風疹感染、イートン-ランバート症候群、再発性多発性軟骨炎、クリオグロブリン血（症）、ヴァルデンストレームマクログロブリン血症（Waldenström's macroglobulemia）、エプスタイン・バー・ウイルス感染、耳下腺炎、エバン症候群および自己免疫性生殖腺不全が含まれる（ただし、これらに限定されない）。

【0257】

したがって、本発明の方法は、Bリンパ球疾患（例えば、全身紅斑性狼瘡、グッドパスチャー症候群、関節リウマチおよびI型糖尿病）、Th₁-リンパ球疾患（例えば、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、ショーグレン症候群、橋本甲状腺炎、グレイブ病、原発性胆汁性肝硬変、ウェグナー肉芽腫症、結核または急性移植片対宿主病）およびTh₂-リンパ球疾患（例えば、アトピー性皮膚炎、全身性自己免疫疾患、エリテマトーデス、アトピー性喘息、鼻結膜炎、アレルギー性鼻炎、オーメン症候群、全身性硬化症または慢性移植片対宿主病）の治療を包含する。

【0258】

免疫学的疾患状態を分類する別の方法は、基本となる生物学的機構による。本発明は、次のメカニズム（それらは4つのタイプに分類される）のうちのいずれかによって発症する免疫学的疾患についての治療および予防を対象とする。

【0259】

アナフィラキシー反応。これらの反応は、マスト細胞上の受容体に結合するIgE抗体によって媒介される。抗原との架橋が生じる場合、IgE抗体は、マスト細胞を刺激してアナフィラキシーの徴候特性を引き起こし得る多くの薬理学的に活性な物質を放出させる。抗原のチャレンジに対するこれらの反応は即時的で、生命に危険を及ぼす場合もある。アナフィラキシー反応の例には、アレルギー性鼻炎、胃腸アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、および馬の気道狭窄症（equine heaves）および蹄葉炎が含まれる（ただし、これらに限定されない）。

【0260】

細胞傷害（細胞溶解）反応。これらの細胞表面反応はIgMおよび/またはIgG（補体カスケードを活性化すると抗原との相互作用に起因し、細胞の破壊をもたらす。細胞溶解反応の例には、白血球減少症、新生児溶血性疾患およびグッドパスチャー病の溶血性疾患が含まれる（ただし、これらに限定されない）。細胞傷害/細胞溶解の反応を含む自己免疫疾患は、溶血性貧血、血小板減少症および甲状腺炎である。

【0261】

免疫複合反応。抗原とIgGまたはIgMが、大きな複合体を循環系中で、または組織中で蓄積し、補体を固定する場合、免疫複合反応が生じる。補体結合サイトへは顆粒細胞が引きつけられ、それらの小粒から損傷性の細胞溶解性酵素を放出する。この種の反応の例は血清病である。免疫複合体反応を含む自己免疫疾患は全身性紅斑性狼瘡、慢性糸球体腎炎および関節リウマチを含む。

【0262】

細胞媒介免疫（CMI）反応または遅延型過敏（DTH）。最初の3タイプの免疫反応とは対照的に、この過敏反応は、Bリンパ球によって産生された抗体ではなくTリンパ球によって媒介される。活性化Tリンパ球は、マクロファージ、K細胞およびNK細胞（それらは局所の組織損傷を引き起こす）の蓄積および活性化をもたらすサイトカインを放出する。この反応は抗原チャレンジの1～2日後に生じ得る。

【0263】

5.10 遺伝子治療

特定の実施形態では、本発明のタンパク質をコードする核酸は、免疫学的疾患を治療するか、抑制するか、予防するために投与される。遺伝子治療とは、発現したかまたは発現

10

20

30

40

50

(78)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

し得る核酸を被験体に投与することによって行われる治療を指す。本発明のこの実施形態では、核酸は、それらがコードする治療効果をもたらすタンパク質を生産する。

【0264】

当技術分野において利用可能な遺伝子治療用の方法のうちのいずれも本発明によって使用することができる。典型的な方法を下に記載する。

【0265】

遺伝子治療方法の一般的な概説については、Golds pielら、1993、C l i n i c a l P h a r m a c y 12:488~505頁;Wu and Wu、1991、B i o t h e r a p y 3:87~95頁;T o l s t o s h e v、1993、A n n . R e v . P h a r m a c o l . T o x i c o l . 32:573~596頁;M u l l i g a n、1993、S c i e n c e 260:926~932頁;M o r g a nとA n d e r s o n、1993、A n n . R e v . B i o c h e m . 62:191~217頁;M a y、1993、T I B T E C H 1、1(5):155~215頁参照。使用することができる組み換えDNA技術の技術中で一般によく知られた方法は、A u s u b e lら(編)、C u r r e n t P r o t o c o l s i n M o l e c u l a r B i o l o g y、J o h n W i l e y & S o n s、N Y (1 9 9 3) ;およびK r i e g l e r、G e n e T r a n s f e r a n d E x p r e s s i o n、A L a b o r a t o r y M a n u a l、S t o c k t o n P r e s s、N Y (1 9 9 0) に記載されている。

10

【0266】

好ましい態様では、治療剤は抗体をコードする核酸配列を含み、この核酸配列は、適当な宿主中で、抗体またはその断片、またはキメラタンパク質、重鎖または軽鎖を発現する発現ベクターの一部である。そのような核酸配列は、特に、抗体コード領域に動作可能に連結したプロモーターを有し、このプロモーターは誘導的または構成的であり、場合によっては組織特異的である。別の特定の実施形態では、核酸分子は、抗体コード配列および他の所望の配列の側部が、ゲノム中の所望の部位で相同組み換えを促進する領域が備わっているようにして使用され、これによって抗体をコードする核酸は染色体内で発現する(K o l l e rとS m i t h i e s、1989、P r o c . N a t l . A c a d . S c i . U S A 86:8932~8935頁;Z i j l s t r aら、1989、N a t u r e 342:435~438頁)。特定の実施形態では、発現された抗体分子は1本鎖抗体であるか、あるいは、核酸配列は、抗体の重・軽鎖の両方をコードする配列、またはその断片を含む。

20

30

【0267】

患者の体中への核酸の送達は、直接的(この場合は、被験体を直接に核酸または核酸保有ベクターにさらす)、間接的(この場合には、細胞は、核酸で最初にi n v i t r oで形質転換され、次に、患者へ移植される)のいずれでもよい。これらの2つのアプローチは、i n v i v o遺伝子治療またはe x v i v o遺伝子治療として、それぞれ知られている。

【0268】

特定の実施形態では、核酸配列はi n v i v oで直接投与され、i n v i v oでそれは発現し、コードされた産物を産生する。これは、当技術分野で知られた多数の方法のうちのいずれによってでも、例えば、適当な核酸発現ベクターの一部としてそれらを構築し、核酸配列が細胞内に入るようにベクターを処理することにより行うことができる。遺伝子治療ベクターは、不完全なまたは減弱されたレトロウイルスその他のウイルスベクター(例えば、米国特許第4,980,286号参照)を使用するか、むき出しのDNAの直接注入;微粒子打ち込み(例えば、遺伝子銃;B i o l i s t i c、デュボン(D u p o n t))の使用;脂質または細胞表面受容体またはトランスフェクト剤によるコーティング;リポソーム、微粒子またはマイクロカプセル中のカプセル化;核内に入ることが知られているペプチドに連結しての投与;受容体を媒介としたエンドサイトーシスを受けるリガンドに連結しての投与(例えば、WuとWu、1987、J . B i o l . C h e m .

40

50

(79)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

262:4429~4432頁参照)(これは特に受容体を発現する細胞タイプを標的とするのに使用できる)、などを使用して感染させ投与することができる。別の実施形態では、リガンドがエンドソームを破壊する融合誘導性(fusogenic)ウィルスベクチドを含む核酸-リガンド複合体を形成することができ、これにより、核酸がリソソーム分解を受けるのを回避することができる。さらに別の実施形態では、特定の受容体を標的とすることにより、核酸はin vivoで細胞特異的取り込みおよび発現の標的とすることができる(例えば、国際公開WO92/06180;WO92/22635;WO92/20316;WO93/14188およびWO93/20221参照)。あるいは、核酸は細胞内で導入し、相同組み換えによって発現のため宿主細胞DNA内に組み込むことができる(KollerとSmithies、1989、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:8932~8935頁;Zijlstraら、1989、Nature 342:435~438頁)。

10

【0269】

特定の実施形態では、本発明の抗体をコードする核酸配列を含むウィルスベクターを使用する。例えば、レトロウィルスベクターを使用することができる(Millerら、1993、Meth. Enzymol. 217:581~599頁参照)。これらのレトロウィルスベクターは、ウィルスゲノムの正確なパッケージングおよび宿主細胞DNAへの組み込みに必要な成分を含む。遺伝子治療で使用される抗体をコードする核酸配列は、1つまたは複数のベクターヘクロニングし、これにより、患者への遺伝子の送達を促進する。レトロウィルスベクターに関するさらなる詳細は、Boesenら、1994、Bi

20

【0270】

遺伝子治療への別のアプローチは、エレクトロポレーション、リポフェクション、リン酸カルシウムを媒介としたトランスフェクションまたはウィルス感染などの方法によって組織培養中の細胞に遺伝子(例えば、AC10またはHeFi-1遺伝子)を輸送することを含む。通常、輸送の方法は、細胞への選択可能なマーカーの輸送を含む。次いで、輸送された遺伝子を発現している細胞を単離するために、細胞を選択下に置く。次いで、これらの細胞を被験体に送達する。

30

【0271】

この実施形態では、核酸は、生じた組み換え細胞をin vivoで投与する前に細胞に導入する。このような導入は、当技術分野で知られた任意の方法によって行うことができ、トランスフェクション、エレクトロポレーション、顕微注入(マイクロインジェクション)、核酸配列を含むウィルスまたはバクテリオファージベクターによる感染、細胞融合、染色体を媒介とした遺伝子導入、マイクロセル媒介遺伝子トランスファー、スフェロプラスト融合などを含む(ただし、これらに限定されない)。細胞中への外来遺伝子の導入には、多数の技術が当技術分野で知られており(例えば、LoefflerとBehr、1993、Meth. Enzymol. 217:599~618頁;Cohenら、1993、Meth. Enzymol. 217:618~644頁;Cline、1985、Pharmac. Ther. 29:69~92頁参照)、レシピエント細胞の発達や生理学上の機能を妨げない限り、本発明において使用することができる。こうした技術は、核酸を細胞に安定的に輸送させなければならない(その結果、核酸は細胞によって発現でき、好ましくはその細胞の子孫によって遺伝および発現可能なものとなる)。

40

50

(80)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【 0 2 7 2 】

得られた組み換え細胞は、当技術分野で知られた様々な方法によって患者に送達することができる。好ましくは組み換え血球（例えば、造血幹細胞または前駆細胞）を静脈内に投与する。使用のために考えられる細胞の量は、目的とする効果や患者の状態などによる。また、当業者はその細胞を決定することができる。

【 0 2 7 3 】

核酸を遺伝子治療の目的のために導入することが可能な細胞は、利用可能ないずれの所望の細胞タイプも包含し、繊維芽細胞；Ｔリンパ球、Ｂリンパ球、単球、マクロファージ、好中球、好酸球、巨核球、顆粒球などの血球；様々な幹細胞や前駆細胞、特に造血幹細胞や前駆細胞、例えば、骨髓、臍帯血、末梢血、胎児肝臓などから得られるもの等を含む（ただし、これらに限定されない）。

10

【 0 2 7 4 】

好ましい実施形態では、遺伝子治療のために使用される細胞は患者自身に由来するものである。

【 0 2 7 5 】

組み換え細胞が遺伝子治療で使用される実施形態では、抗体をコードする核酸配列は、細胞またはそれらの子孫によって発現できるように細胞に導入され、次いで、組み換え細胞は、*in vivo*で治療効果を示すように投与される。特定の実施形態では、幹細胞または前駆細胞が使用される。単離することができ、*in vitro*で維持することができるものであれば、どのような幹細胞および／または前駆細胞も本発明の実施形態に従って使用することができる可能性がある（例えば、国際公開ＷＯ 9 4 / 0 8 5 9 8 ； S t e m p l e と A n d e r s o n 、 1 9 9 2 、 C e l l 7 1 : 9 7 3 ~ 9 8 5 頁； R h e i n w a l d 、 1 9 8 0 、 M e t h . C e l l B i o . 2 1 A : 2 2 9 ； および P i t t e l k o w と S c o t t 、 1 9 8 6 、 M a y o C l i n i c P r o c . 6 1 : 7 7 1 参照）。

20

【 0 2 7 6 】

特定の実施形態では、遺伝子治療の目的で導入する核酸は、コード領域に動作可能に連結された誘導可能なプロモーターを含んでおり、それにより、核酸の発現が、適当な転写誘導剤の有無を調節することにより制御可能であるようになっている。

【 0 2 7 7 】

本発明の化合物または医薬組成物は好ましくは *in vitro* で試験し、次いで、ヒトで使用する前に所望の治療または予防する活性について *in vivo* で試験する。例えば、タンパク質または医薬組成物の治療または予防剤としての有用性を実証する *in vitro* アッセイは、活性化リンパ球に対するそのタンパク質または医薬組成物の判定を含む。活性化リンパ球に対するタンパク質または組成物の細胞傷害作用および／または細胞静止作用は当業者に知られた技術を利用して判定することができる。あるいは、具体的なタンパク質または医薬組成物についてその投与効果が示されるかどうか決めるために使用できる *in vitro* アッセイは、*in vitro* の細胞培養を含み、ここでは、被験体から得た活性化リンパ球を含むリンパ球を培地で培養し、タンパク質または医薬組成物にさらし（また、さらさずに）、活性化リンパ球に対するそのような化合物の影響を観察する。

30

40

【 0 2 7 8 】

5 . 1 1 組成物の治療／予防のための投与

本発明は、活性化リンパ球に細胞傷害作用または細胞静止作用がある有効量の C D 3 0 - 結合タンパク質（すなわち、本発明のタンパク質）、前記 C D 3 0 - 結合タンパク質をコードする核酸（すなわち、本発明の核酸）または本発明のタンパク質もしくは核酸を含む医薬組成物（以下、本発明の医薬剤）を被験体に投与することによる、治療および予防方法を提供する。

【 0 2 7 9 】

本発明の治療および予防方法の結果は、患者において少なくとも健康上の利益（以下を

50

(81)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

含むが、これらに限定されない：患者の延命、免疫障害症状の発症を遅らせること、および／または発症後に免疫障害の症状を緩和すること）を生じることである。そのような健康上の利益は、疾患の進行を抑制しかつ／または疾患の徴候を軽減することができる。

【0280】

本明細書で使用する場合、「予防」という用語は、問題とする免疫疾患の徴候または分子レベルでの前兆が出る前に、患者に（例えば、問題とする免疫疾患の素因をもった、または免疫疾患に罹患するリスクの高い個人に）本発明のタンパク質または核酸の投与することを指す。対照的に、「治療」という用語は、免疫疾患の症状または分子レベルでの前兆が出た後のどのような臨床段階であっても、本発明のタンパク質または核酸を患者に投与することを指す。

10

【0281】

好ましい実施形態では、本発明のタンパク質はモノクローナル抗体 A C 1 0 もしくは H e F i - 1、またはそれらの断片が誘導体である。好ましい態様では、本発明の医薬剤は実質的に精製された（例えば、その結果を制限するか、望ましくない副作用を生じる物質を実質的に含まない）本発明のタンパク質または核酸を含む。

【0282】

被験体は好ましくは動物であり、好ましくは哺乳動物であって、ウシ、ブタ、ウマ、ニワトリ、ネコ、イヌなどを含む（ただし、これらに限定されない）。最も好ましくは、被験体はヒトである。

【0283】

使用することができる処方（製剤）および投与方法は上に記載されている。これ以外の適当な処方および投与ルートは本明細書において下に記載するものの中から選択できる。

20

【0284】

様々な送達システムが知られており、本発明の核酸またはタンパク質を投与するために使用することができる（例えば、リボソーム、微粒子、マイクロカプセル、化合物を発現することができる組み換え細胞、受容体を媒介としたエンドサイトーシス（例えば、W u と W u、1987、J . B i o l . C h e m . 262 : 4429 ~ 4432 頁参照）、レトロウイルスまたは他のベクターなどの一部としての核酸の構築など）。導入方法には、皮内、筋肉内、腹腔内、静脈内、皮下、鼻腔内、硬膜外および経口での経路が含まれるが、これらに限定されない。本発明の核酸およびタンパク質は、任意の便利なルートによって、例えば、点滴やボラス注射によって、上皮または粘膜裏面（例えば、口内粘膜、直腸や腸の粘膜など）による吸収によって投与してもよいし、化学療法剤などの他の生物学に活性な薬剤と共に投与してもよい（5 . 2 . 1 節参照）。投与は全身的でもよいしまたは局所的でもよい。

30

【0285】

特定の実施形態では、注入により、カテーテルにより、坐薬により、またはインプラントにより核酸またはタンパク質を投与することが望ましいかもしれない。前記インプラントは、多孔性、非多孔性、ゼラチン状材料でもよいし、あるいは、弾性膜などの膜や繊維を含む。本発明のタンパク質（抗体を含む）を投与する場合、好ましくは、タンパク質を吸収しない材料を用いるように注意すべきである。

40

【0286】

別の実施形態では、化合物または組成物は小胞、特にリボソーム中に入れて送達することができる（例えば、L a n g e r、1990、S c i e n c e 249 : 1527 ~ 1533 頁；T r e a t r a、1989、i n L i p o s o m e s i n t h e T h e r a p y o f I n f e c t i o u s D i s e a s e a n d C a n c e r、L o p e z - B e r e s t e i n a n d F i d l e r（編）、L i s s、N e w Y o r k、353 ~ 365 頁；L o p e z - B e r e s t e i n、前掲、317 ~ 327 頁参照；一般的には前掲書参照）。

【0287】

さらに別の実施形態では、化合物または組成物は徐放性システムで送達することができ

50

(82)

JP 2005-511627 A 2005.4.28

る。1つの実施形態では、ポンプを使用してもよい(前掲の Sefton、1989、CRC Crit. Ref. Biomed. Eng. 14:201; Buchwaldら、1980、Surgery 88:507; Sauddekら、1989、N. Engl. J. Med. 321:574参照)。別の実施形態では、高分子材料を使用することができる(Medical Applications of Controlled Release、1974、Langer and Wise(編)、CRC Pres.、Boca Raton、Florida; Controlled Drug Bioavailability、Drug Product Design and Performance、1984、SmolenとBall(編)、Wiley、New York; Ranger and Peppas、1983、Macromol. Sci. Rev. Macromol. Chem. 23:61; および Levyら、1985、Science 228:190; Duringら、1989、Ann. Neurol. 25:351; Howardら、1989、J. Neurosurg. 71:105参照)。

10

【0288】

他の徐放性システムは、Langer、1990、Science 249:1527~1533頁による総説で議論される。

【0289】

本発明の核酸を投与する特定の実施形態では、核酸は適当な核酸発現ベクターの一部としてそれを構築しそれが細胞内に入るように *in vivo* で投与すること、例えば、レトロウイルスベクター(米国特許第4,980,286号参照)の使用によって、または直接の注入によって、または微粒子打ち込み(例えば遺伝子銃; Biolistic、デュポン(Dupont))の使用によって、または脂質または細胞表面受容体またはトランスフェクト剤によるコーティング、またはホメオボックス様ペプチド(これは、核内に入ることが知られている(例えば、Joliotら、1991、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:1864~1868頁)に連結してそれを投与することによって、それがコードするタンパク質の発現を促進することができる。あるいは、細胞内に核酸を導入し、相同組み換えによって発現のために宿主細胞DNA内に組み込むことができる。

20

【0290】

上に示唆したように、本発明はさらに医薬組成物(本発明の医薬剤)を提供する。そのような組成物は、治療上有効な量の本発明の核酸またはタンパク質、および薬学的に許容できる担体を含む。特定の実施形態では、「薬学的に許容できる」という用語は、連邦政府の管轄機関または州政府によって承認されているか、米国薬局方その他一般に、動物での使用、特にヒトにおける使用のための調剤書と認識されているものにリストされていることを意味する。「担体」という用語は、それによって治療剤が投与される希釈剤、アジュバント、賦形剤またはビヒクルを指す。このような製薬上の担体は、無菌の液体、例えば、水および油であり、石油、動物、植物または合成起源のもの、例えば、落花生油、大豆油、鉱油、胡麻油その他を含む。医薬組成物を静脈内で投与する場合、水は好ましい担体である。食塩溶液およびデキストロス水溶液およびグリセリン溶液も特に注射可能な溶液のために液体の担体として使用することができる。適当な製薬上の賦形剤は、デンプン、グルコース、乳糖、ショ糖、ゼラチン、麦芽、米、小麦粉、チョコレート、シリカゲル、ステアリン酸ナトリウム、グリセリンモノステアレート、タルク、塩化ナトリウム、乾燥スキムミルク、グリセリン、プロピレングリコール、水、エタノールなどを含む。組成物はまた、必要であれば、少量の湿潤剤、または乳化剤、pH緩衝剤を含むことができる。これらの組成物は、溶液、懸濁、乳剤、錠剤、丸剤、カプセル、パウダー、徐放性製剤その他の形態をとることができる。組成物は、慣用の結合剤、およびトリグリセリドなどの担体と共に坐薬として製剤化することができる。経口製剤は、製薬等級のマニトール、乳糖、デンプン、ステアリン酸マグネシウム、サッカリンナトリウム、セルロース、炭酸マグネシウムなどの標準的な担体を含むことができる。適当な製薬の担体の例はE. W. Martin著「Remington's Pharmaceutical Science」

30

40

50

(83)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

c e s」に記載されている。そのような組成物は、被験体に投与するのに適当な形態とするために、適当量の担体と一緒に、治療上有効な量の本発明の核酸またはタンパク質（好ましくは精製した形で）を含むであろう。製剤は、投与形態に適したものとするべきである。

【 0 2 9 1 】

好ましい実施形態では、本発明の医薬剤は、ヒトへの静脈内投与に適した医薬組成物として慣用の手順に従って製剤化する。典型的には、静脈内投与用の組成物は無菌の等張性水性緩衝液である。必要であれば、本発明の医薬剤は、可溶化剤および注入部位での痛みを緩和するためにリグノカインなどの局所麻酔薬を含んでもよい。一般に、成分は、別々に提供されるか、単位剤形で、例えば、無水の凍結乾燥パウダーまたは活性物質の量を表示したアンプルや小袋などの気密封止容器内に無水高濃度液としてまたは単位剤形で互いに混合状態で提供する。本発明の医薬剤を点滴によって投与する場合、それは無菌の製薬等級の水または食塩水を含む点滴瓶で小分けすることができる。本発明の医薬剤を注射で投与する場合、注射用の無菌水または生理食塩水アンプルを提供し、投与の前に成分を混合できるようにしてもよい。

【 0 2 9 2 】

標準的な臨床技術によって、免疫学的疾患の治療または予防に有効な本発明の核酸またはタンパク質の量を決定できる。さらに、場合によっては、i n v i t r o アッセイを用いて最適の投薬量範囲を同定する助けとしてもよい。製剤化で使用する正確な用量は、投与経路および免疫学的疾患の段階にも依存し、医師の判断および各被験体の状況に応じて決定すべきである。有効用量はi n v i t r o の動物モデル試験システムから得た投与応答曲線から外挿することができる。

【 0 2 9 3 】

5 . 1 2 免疫学的疾患の治療のための併用療法

本発明の核酸およびタンパク質は、免疫学的疾患の治療および予防のため、1種または複数の細胞静止剤、細胞傷害性薬剤および/または免疫抑制剤と一緒に投与することができる。さらに、併用治療は、活性化リンパ球表面上のC D 3 0 以外の受容体または受容体複合体を標的とする薬剤の投与を含んでもよい。そのような薬剤の例は、活性化リンパ球の表面で分子に結合する、第2の、つまり、非C D 3 0 抗体である。別の例はそのような受容体または受容体複合体を標的とするリガンドである。好ましくは、このような抗体またはリガンドは、活性化リンパ球上の細胞表面受容体に結合し、活性化リンパ球に細胞静止性または細胞傷害シグナルを送達することにより、抗C D 3 0 抗体の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強する。

【 0 2 9 4 】

このような併用投与は疾患パラメーターに対して付加的または相乗的な効果を有し得る。

【 0 2 9 5 】

治療レジメに関して、特定の実施形態では、本発明の核酸またはタンパク質は、リンパ球の細胞表面受容体または受容体複合体を標的とする免疫抑制剤または分子と同時に投与する。別の特定の実施形態では、免疫抑制剤またはリンパ球の細胞表面受容体を標的とする薬剤を、本発明の核酸またはタンパク質の投与前または投与後、少なくとも1時間から数カ月（例えば、少なくとも1時間、5時間、12時間、1日、1週、1カ月、3カ月）に投与する。

【 0 2 9 6 】

5 . 1 2 . 1 免疫抑制剤、細胞傷害性薬剤および細胞静止剤

本発明の併用治療法を実施するための免疫抑制剤、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤の有用な種類は、以下の互いに排他的ではない薬剤種を含む：アルキル化剤、アントラサイクリン類、抗生物質、抗葉酸類、代謝拮抗剤、抗チューブリン剤、オーリスタチン類、化学療法増感剤、DNA副溝結合剤、DNA複製阻害剤、デュオカルマイシン類、エトポシド類、フッ素化ピリミジン類、レキシトロプシン類、ニトロソ尿素類、プラチノール類、

(84)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

プリン代謝拮抗剤、ピューロマイシン、放射線増感剤、ステロイド類、タキサン類、トボイソメラーゼ阻害剤、ピンカアルカロイド（ただし、これらに限定されない）。

【0297】

本発明によって包含される個々の免疫抑制剤、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は、男性ホルモン、アントラマイシン（AMC）、アスパラギナーゼ、5-アザシチジン、アザチオプリン、プレオマイシン、ブスルファン、ブチオニン、スルホキシミン、カンプトテシン、カルボプラチン、カルムスチン（BSNU）、CC-1065、クロラムブチル、シスプラチン、コルヒチン、シクロホスファミド、シタラビン、シチジンアラビノシド、サイトカラシンB、デカルバジン、ダクチノマイシン（以前はアクチノマイシン）、ダウノルビシン、デカルバジン、ドセタキセル、ドキソルビシン、エストロゲン、5-フルオロデオキシウリジン、5-フルオロウラシル、グラミシジンD、ヒドロキシ尿素、イダルビシン、イホスファミド、イリノテカン、ロムスチン（CCNU）、メクロレタミン、メルファラン、6-メルカプトプリン、メトトレキサート、ミトラマイシン、マイトマイシンC、ミトキサトロン、ニトロイミダゾール、バクリタキセル、プリカマイシン、プロカルビジン、ストレプトゾトシン、テボノシド、6-チオグアニン、チオTEPA、トボテカン、ピンブラスチン、ピンクリスチン、ピンオレルビン、VP-16、VM-26を含む（ただし、これらに限定されない）。

10

【0298】

好ましい実施形態では、免疫抑制剤、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は代謝拮抗剤である。代謝拮抗剤は、プリンアンタゴニスト（例えばアゾチオプリン、ミコフェノレートモフェチル）、ジヒドロ葉酸還元酵素抑制剤（例えば、メトトレキサート）、アシクロビル、ガングシクロビル、ジドブジン、ビダラビン、リババリン、アジドチミジン、シチジン・アラビノシッド、アマンタジン、ジデオキシウリジン、ヨードデオキシウリジン、ボスカルネットおよびトリフルウリジンであり得る。

20

【0299】

別の好ましい実施形態では、免疫抑制剤、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は、タクロリムス、シクロスポリンまたはラバマイシンである。

【0300】

別の好ましい実施形態では、免疫抑制剤は、グルココルチコイドまたはグルココルチコイドの類似体である。本発明の方法において有用なグルココルチコイドの例は、コルチゾールとアルドステロンを含む。本発明の方法において有用なグルココルチコイド類似体の例はプレドニゾンとデキサメタゾンを含む。

30

【0301】

さらに別の好ましい実施形態では、免疫抑制剤は、アリールカルボン酸誘導体からなるもの、ピラゾール含有誘導体、オキシカム含有誘導体およびニコチン酸誘導体などの抗炎症剤である。本発明の方法において有用な抗炎症剤のクラスには、シクロオキシゲナーゼ阻害剤、5-リボキシゲナーゼ阻害剤およびロイコトリエン受容体アンタゴニストを含む。

【0302】

適当なシクロオキシゲナーゼ阻害剤はメクロフェナム酸、メフェナム酸、カルプロフェン、ジクロフェナク（diclofenac）、ジフルニサル（diflunisal）、フェンブフェン（fenbufen）、フェノプロフェン（fenoprofen）、イブプロフェン、インドメタシン、ケトプロフェン（ketoprofen）、ナブメトン（nabumetone）、ナプロキセン、スリンダック、テノキシカム（tenoxicam）、トルメチン（tolmetin）およびアセチルサリチル酸が含まれる。

40

【0303】

適当なりボキシゲナーゼ阻害剤は、酸化還元反応阻害剤（例えばカテコール・ブタン誘導体、ノルジヒドログアヤレット（nordihydroguaiaretic）酸（NDGA）、マソプロコール（masoprocol）、フェニドン（phenidone）、イアノパレン（I an op a l e n）、インダゾリノン類、ナファザトロム（naph

50

(85)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

a z a t r o m)、ベンゾフラノール、アルキルヒドロキシルアミン)、および非酸化還元反応阻害剤(例えば、ヒドロキシチアゾール類、メトキシアルキルチアゾール類、ベンゾピラン類およびその誘導体、メトキシテトラヒドロピラン、ボスウェル(b o s w e l l i c)酸、およびボスウェル酸のアセチル化誘導体、シクロアルキル残基で置換されたキノリンメトキシフェニル酢酸)ならびに酸化還元反応阻害剤の前駆体を含む。

【 0 3 0 4 】

他の適当なりボキシゲナーゼ阻害剤は、酸化防止剤(例えば、フェノール、没食子酸プロピル、フラボノイド、および/またはフラボノイドを含む天然基質、フラボン類のヒドロキシル化された誘導体、フラボノール、ジヒドロケルセチン、ルテオリン、ガラングイン、オロボール(o r o b o l)、チャルコーン(c h a l c o n e)の誘導体、4, 2', 4'-トリヒドロキシチャルコーン、オルト-アミノフェノール類、N-ヒドロキシ尿素、ベンゾフラノール類、エブセレン(e b s e l e n)および還元性セレノ酵素の活性を増大させる種)、鉄キレート剤(例えば、ヒドロキサム酸およびその誘導体、N-ヒドロキシ尿素、2-ベンジル-1-ナフトール、カテコール類、ヒドロキシルアミン類、c a r n o s o l t r o l o x C、カテコール、ナフトール、スルファサラジン(s u l f a s a l a z i n e)、ザイリウトン(z y l e u t o n)、5-ヒドロキシアントラニル酸および4-(オメガ-アリアルアルキル)フェニルアルカン酸)、イミダゾール含有化合物(例えば、ケトコナゾールおよびイトラコナゾール)、フェノチアジンおよびベンゾピラン誘導体を含む。

【 0 3 0 5 】

さらに他の適当なりボキシゲナーゼ阻害剤は、エイコサノイド類(例えば、オクタデカテトラエン酸、エイコサテトラエン酸、ドコサペンタエン酸、エイコサヘキサエン酸、およびドコサヘキサエン酸およびそれらのエステル、P G E 1 (プロスタグランジンE 1)、P G A 2 (プロスタグランジンA 2)、ビプロストール(v i p r o s t o l)、15-モノヒドロキシエイコサテトラエン酸、15-モノヒドロキシエイコサトリエン酸および15-モノヒドロキシエイコサペンタエン酸、およびロイコトリエンB 5、C 5およびD 5)の阻害剤、およびカルシウム流動の妨害剤、フェノチアジン、ジフェニルブチルアミン類、ベラバミル、フスコシド(f u s c o s i d e)、クルクミン、クロロゲン酸、カフェー酸、5, 8, 11, 14-エイコサテトライエン(e i c o s a t e t r a y e n o i c)酸(E T Y A)、ヒドロキシフェニルレチナミド(h y d r o x y p h e n y l r e t i n a m i d e)、イオナパレン(I o n a p a l e n)、エスクリン、ジエチルカルバマジン、フェナントロリン、バイカレイン(b a i c a l e i n)、プロキシクロミル(p r o x i c r o m i l)、チオエーテル類、ジアリル・スルフィドおよびジ(1-プロペニル)スルフィドを含む。

【 0 3 0 6 】

ロイコトリエン受容体アンタゴニストは、カルシトリオールおよびオンタゾラスト(o n t a z o l a s t)、Bayer Bay-x-1005、Ciba-Geigy CGS-25019C、エブセレン、Leo Denmark ETH-615、Lilly LY-293111、Ono ONO-4057、Terumo TMK-688、Boehringer Ingelheim BI-RM-270、Lilly LY 213024、Lilly LY 264086、Lilly LY 292728、Ono ONO LB457、Pfizer 105696、Perdue Frederick PF 10042、Rhône-Poulenc Rorer RP 66153、SmithKline Beecham SB-201146、SmithKline Beecham SB-201993、SmithKline Beecham SB-209247、Searle SC-53228、Sumitamo SM 15178、American Home Products WAY 121006、Bayer Bay-o-8276、Warner-Lambert CI-987、Warner-Lambert CI-987BPC-15LY 223982、Lilly LY 233569、Lilly LY-255283、MacroNex MNX-16

10

20

30

40

50

(86)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

0、Merck and Co. MK-591、Merck and Co. MK-886、Ono ONO-LB-448、Purdue Frederick PF-5901、Rhône-Poulenc Rorer RG 14893、Rhône-Poulenc Rorer RP 66364、Rhône-Poulenc Rorer RP 69698、Shionogi S-2474、Searle SC-41930、Searle SC-50505、Searle SC-51146、Searle SC-52798、SmithKline Beecham SK&F-104493、Leo Denmark SR-2566、Tanabe T-757 および Teijin TEI-1338 を含む。

【0307】

本発明のある好ましい実施形態では、免疫抑制性剤、細胞傷害性薬剤または細胞静止剤は、別々に投与されるのではなく本発明の抗体にコンジュゲートする。本発明の方法において有用な抗体-薬剤コンジュゲートは、上記5.6節に記載されている。

【0308】

5.12.2 リンパ球受容体ターゲティング剤

本発明の併用方法において特に有用な薬剤は、リンパ球細胞表面へ結合する分子、好ましくはCD30とは異なる受容体または受容体複合体に対して結合する分子である。CD30に加えて、リンパ球表面上で発現された種々様々の受容体または受容体複合体が、様々なリンパ球サブセットの増殖、分化および機能の調節に関与している。そのような分子は、例えば、活性化リンパ球に追加的な細胞増殖抑止シグナルまたは細胞傷害シグナルを

【0309】

1つの実施形態では、CD30を並んで標的とするための適当な受容体は、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーのメンバーである、これは、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA-4、PD-1およびICOSを含むが、これらに限定されない(Barclayら、1997、The Leucocyte Antigen Facts Book、2nd ed、Academic Press; CoyleとGurtierrez-Ramos、2001、Nature Immunol. 2:203~209頁)。別の実施形態では、TNF受容体スーパーファミリーメンバーを標的とすることができる。これは、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/4-1BB、TNF-R1、TNFR-2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、APO2/TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4、またAPO-3を含むが、これらに限定されない(Locksleyら、2001、Cell、104、487~501頁)。さらに別の実施形態では、インテグリンを標的とすることができる。これは、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103およびCD104を含むが、これらに限定されない(Barclayら、1997、The Leucocyte Antigen Facts Book、2nd ed、Academic Press)。さらに別の実施形態では、CD30に加えて標的とするための適当な受容体はサイトカイン受容体(Fitzgeraldら、2001、The Cytokine Facts book、2nd ed、Academic Press)、ケモカイン受容体(LutherとCyster、2001、Nature Immunol. 2:102~107頁、GerardとRollins、2001、Nature Immunol. 2:108~115頁)、主要組織適合性タンパク質、レクチン(C-タイプ、S-タイプまたはI-タイプ)または補体制御タンパク質である。

【0310】

1つの実施形態では、これらの非CD30受容体または受容体複合体に結合する薬剤は、活性化リンパ球に細胞静止シグナルまたは細胞傷害シグナルを送達することによりCD

10

20

30

40

50

(87)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

30 結合剤（例えば抗CD30抗体）の細胞傷害作用または細胞静止作用を増強する。本発明の抗CD30分子との組合せによれば、標的とされたリンパ球中では増殖阻害またはアポトーシスに対する追加的または相乗的な効果を達成することができる。

【0311】

別の実施形態では、これらの受容体または受容体の複合体に対する薬剤は、それ自体が増殖阻害剤またはアポトーシス剤である必要はなく、CD30結合剤と組み合わせ、CD30結合剤単独で引き起こされる以上の増殖阻害またはアポトーシスに対する増強効果を達成できる。ある特定の実施形態では、所与の量または濃度のCD30結合剤の細胞静止作用または細胞傷害活性に対して、増強効果はほぼ5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、75%、または100%以上の増強である。1つの実施形態では、増強効果は、CD30結合剤のED₅₀のおよそ5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、75%の減少として示され、すなわち、同じ細胞傷害作用または細胞静止作用を達成できるCD30結合剤の量は、CD30以外の受容体または受容体の複合体に結合するそのような薬剤の投与がない状態で、同じ細胞傷害作用または細胞静止作用を達成するのに必要な量より少なくなる。

10

【0312】

1つの実施形態では、本発明の方法による非CD30受容体または受容体複合体のターゲティングは、リガンドの投与により達成され得る。

【0313】

別の実施形態では、ターゲティングは、受容体または受容体複合体に対する抗体の投与により達成され得る。抗体は、上記5.1節および5.4節で記載したポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、エピトープ結合抗体断片または抗CD30誘導体と等価な別のタイプの抗体誘導体であり得る。ある特定の実施形態では、5.1節および5.4節で記載したように、抗体は多価抗体またはCD30結合部分を含むヘテロコンジュゲートである。

20

【0314】

当業者には認識されるように、抗CD30との同時投与に適した多数の抗体が、当技術分野で知られている。下にそのような抗体の典型的な例を挙げる（ただし、これらに限定されない）：抗CD2抗体はBTI-322（Medimmune）およびUMCD2を含む；抗CD3抗体はOKT3、「SMART」抗CD3（Nuvion（商標）；Protein Design Laboratories）、FN18、UCHT1、145-2C11およびHIT3aを含む；抗CD5抗体はHI211（6T-003）、HISM2（6T-004）、MEM-128（6T-014）、7.8（6T-080）、OKT1、UCHT2およびBL1aを含む；抗CTLA-4抗体は11D4、10A8、7F8、4F10、ANC152.2/8H5およびBNI3.1を含む；また抗PD-1は抗体J43を含む。

30

【0315】

多数の受容体または受容体の複合体に対して天然リガンドもわかってきている（Barclayら、1997、The Leucocyte Antigen Facts Book、2版、Academic Press；Coyle and Gurtierre z-Ramos、2001、Nature Immunol. 2：203～20頁；Locksleyら、2001、Cell 104：487～501頁）。下記にそのようなリガンドの例を挙げる（ただし、これらに限定されない）：LFA-3（CD2に対するリガンド）；CD80およびCD86（CD28およびCTLA-4に対するリガンド）；PD-L1およびPD-L2（PD-1に対するリガンド）；B7RP-1（ICOSに対するリガンド）；CD70（CD27に対するリガンド）；CD154（CD40に対するリガンド）；FasL（CD95/Fasに対するリガンド）；TNFα（TNF-R1およびTNF-R2に対するリガンド）；TRANCE（RANKに対するリガンド）、APRIL（TACIに対するリガンド）；BLYS（BCMAに対するリガンド）、TRAIL（TRAIL-R1、-R2、-R3およびR4に対するリガンド）；お

40

50

(88)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

よび T W E A K (A P O - 3 に対するリガンド)。

【 0 3 1 6 】

5 . 1 3 有効投与量

本発明のタンパク質および組成物の毒性および治療効果は、細胞培養または実験の動物での標準的な薬学的手順、例えば、 LD_{50} (集団の 50 % が致死する用量)、および ED_{50} (集団の 50 % に治療上有効な効果がある用量) により決定することができる。毒性と治療効果の間の用量比が治療指数であり、比率 LD_{50} / ED_{50} としてそれを表現することができる。より大きな治療指数を示すタンパク質が好ましい。有毒な副作用を示すタンパク質を使用してもよい場合は、感染の影響を受けた組織部位を標的としてそのようなタンパク質を送達するシステムを設計して感染していない細胞への潜在的な損害を最小限にし、副作用を低減するべきである。

10

【 0 3 1 7 】

細胞培養アッセイおよび動物研究から得たデータを使用して、ヒトで使用する投薬量範囲を配合することができる。そのようなタンパク質の投与量は、好ましくは ED_{50} 以下を含む血中濃度となる範囲である。投与量は、この範囲内で、使用した投薬形式および利用する投与経路に依存して変わり得る。本発明の方法で使用する任意の化合物について、治療上有効な投与量はまず、細胞培養アッセイから評価することができる。細胞培養において決定された IC_{50} (すなわち、最大で症状の半数の阻害を達成する試験化合物濃度) を含む循環血中の血漿濃度範囲を達成するために、動物モデルに投薬量を処方してもよい。そのような情報は、より正確にヒト中の有用な用量を決定するために使用することができる。血漿中濃度は例えば高速液体クロマトグラフィーによって測定できる。

20

【 0 3 1 8 】

一般に、免疫学的疾患患者に投与された本発明の医薬剤中の本発明のタンパク質の投与量は、典型的には患者の体重に対し $0.1 \text{ mg/kg} \sim 100 \text{ mg/kg}$ である。好ましくは、患者に投与される投与量は、患者の体重に対し $0.1 \text{ mg/kg} \sim 20 \text{ mg/kg}$ の間、より好ましくは $1 \text{ mg/kg} \sim 10 \text{ mg/kg}$ までである。一般に、外来タンパク質には免疫反応があるため、ヒト抗体は、他の種からの抗体より人体内で長い半減期を有する。したがって、多くの場合、ヒト化抗体、キメラ抗体またはヒト抗体の投与量は低くてもよいし投与回数も少なくてもよい。

【 0 3 1 9 】

30

5 . 1 4 製剤

本発明に従って使用する医薬組成物は、1 種または複数の生理学的に許容できる担体または賦形剤を使用して、慣用の方法で製剤化できる。本発明の抗 CD 30 抗体を含む医薬組成物はさらに、上記 5 . 1 2 . 2 節に記載した抗体などの第 2 の抗体または上記 5 . 1 2 . 1 節で挙げた免疫抑制剤などの免疫抑制剤を含む。

【 0 3 2 0 】

したがって、タンパク質および生理学的に許容されるそれらの塩類および溶媒和物は、吸入すなわち通気 (口または鼻のいずれかを通して) による投与または経口、パッカル、非経口、直腸の投与に対して処方してもよい。

【 0 3 2 1 】

40

経口投与については、医薬組成物は、慣用の手段によって、結合剤 (例えば、予めゲル化させてあるコーンスターチ、ポリビニルピロリドンまたはヒドロキシプロピル・メチルセルロース) などの薬学的に許容できる賦形剤 ; 充填剤 (例えば、乳糖、微晶質セルロースまたはリン酸水素カルシウム) 潤滑剤 (例えば、ステアリン酸マグネシウム、滑石または珪酸) ; 崩壊剤 (例えば、ポテト・スターチまたはナトリウムスターチグリコレート) ; または湿潤剤 (例えば、ラウリル硫酸ナトリウム) と共に、例えば、錠剤またはカプセルの形を取ることができる。錠剤は、当技術分野においてよく知られている方法によってコーティングしてもよい。経口投与用の液体製剤は、例えば、溶液、シロップまたは懸濁液の形式をとることができ、または、その使用前に水または他の適当なビヒクルで構成する乾燥した製品として提供することもできる。そのような液体製剤は、懸濁剤 (例えば、

50

(89)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

ソルビトールシロップ、セルロース誘導体または水素化食用脂肪)；乳化剤(例えば、レシチンまたはアラビアゴム)；非水性のビヒクル(例えば、アーモンド油、油性エステル、エチルアルコールまたは分留によって得られた植物油)；および保存剤(例えば、メチルまたはプロピル-p-ヒドロキシベンゾエートまたはソルビン酸)などの薬学的に許容できる添加剤と共に慣用の手段によって調製することができる。適当であれば、製剤はさらに緩衝塩類、香味剤、着色料、および甘味剤を含んでもよい。

【 0 3 2 2 】

経口投与製剤は活性な化合物に徐放性を与えるように製剤化するのが適している。

【 0 3 2 3 】

バツカル投与のためには、組成物が、従来の方法で製剤化された錠剤またはトローチ剤の形を取ることができる。

【 0 3 2 4 】

吸入による投与のためには、本発明により使用するタンパク質は、従来通り、適当な噴射剤、例えば、ジクロロジフルオロメタン、トリクロロフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、二酸化炭素その他の適当なガスを使用した加圧充填物またはネビュライザーからのエアロゾル・スプレーの形で提供するのが便利である。加圧エアロゾルの場合、一定量を送達するためにバルブを設けることにより投与ユニットを決定してもよい。吸入器や通気器で使用する例えば、ゼラチン製のカプセルおよびカートリッジは、化合物のパウダーミックス、および乳糖またはデンプンなどの適当なパウダーベースを含んで処方してもよい。

【 0 3 2 5 】

タンパク質は、非経口投与のために、注入によって、例えば、ボーラス注入が連続点滴によって投与してもよい。注入のための製剤は、例えば、アンプルや多数回投与用容器に入れて単位剤形の形で提供してもよいし、保存剤を添加してもよい。組成物は、油性または水性ビヒクル中における懸濁液、溶液または乳剤などの形をとることができるし、懸濁剤、安定剤および/または分散剤などの製剤化剤を含んでもよい。あるいは、活性成分は、使用前に、適当なビヒクル(例えば、発熱素を含まない滅菌水)で構成するためのパウダー形式でもよい。

【 0 3 2 6 】

タンパク質は、例えば、カカオ脂または他のグリセリドのような慣用の坐薬基剤を含む坐薬または保持浣腸剤のような直腸組成物として製剤化することもできる。

【 0 3 2 7 】

これまでに記載した製剤に加え、タンパク質は、デポー製剤として製剤化することもできる。そのような長期処方、埋込み(例えば、皮下にまたは筋肉内に)によって、または筋肉注射によって投与できる。したがって、例えば、タンパク質は、適当な重合体または疎水性材料(例えば、許容される油中乳剤としての)またはイオン交換樹脂と共に、または難溶性誘導体、例えば、難溶性塩として処方してもよい。

【 0 3 2 8 】

組成物は、必要であれば、活性成分を含む1または複数のユニット剤形を含むバックまたはディスペンサー装置に入れて提供してもよい。バックは、例えばプリスターバックのような、金属またはプラスチック箔を含む。バックまたはディスペンサー装置には、好ましくはヒトへの投与のために説明書を付けてもよい。

【 0 3 2 9 】

本発明は、本願明細書に記載した特定の実施形態によってその範囲が制限されるものではない。実際に、当業者には、本願明細書に記載したものに加えて、上記記載および添付図面から本発明の様々な改変は明らかであろう。そのような改変は、添付する特許請求の範囲以内にあるものと意図される。

【 0 3 3 0 】

以下、実施例により本発明をさらに説明するが、これらは、本発明の範囲を限定するように意図するものではない。

(90)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【実施例 1】

【0331】

6. ジャーカット・ヒトTリンパ球系統上でのCD30の発現

ジャーカット細胞系統は、CD3/T細胞受容体(TCR)複合体およびT細胞機能にかかわる他の重要な付属分子を発現する急性T白血病細胞系統である。本来のジャーカット細胞系統に由来するサブラインは、多数の受容体系(例えばCD3/T細胞受容体(TCR))によって媒介されるシグナル経路を解明するためのモデル系として広範囲に用いられてきた。表面受容体への結合で開始されるジャーカットT細胞における多数のシグナル経路は、抗原チャレンジにさらされた正常なTリンパ球で起こることが証明されている。ジャーカットT細胞は、CD30を検出可能なレベルに構成的に発現すること(図1)が見出されており、したがって、それらは活性化リンパ球の中でのCD30の機能を検討するモデルシステムとなり得る。

10

【実施例 2】

【0332】

7. 抗CD30 mAbで阻害されたDNA合成によるジャーカットT細胞でのCD30の架橋

ジャーカットT細胞の増殖に対する抗CD30によるCD30を介したシグナル伝達作用を、トリチウムを含むチミジン(^3H -TdR)組み込みアッセイによって評価した。ジャーカット細胞を、可溶性の抗CD30の投与量を段階的に変えながら処理するか、または第2架橋抗体(Ab)により抗CD30架橋した。cAC10の第2架橋のために、モノクローナル抗体(mAb)をやぎ抗ヒト(GAM)IgG Fc(Jackson ImmunoResearch, West Groove, PA)のF(ab')₂断片と培地(RPMI-1640、10%FBS、2mM L-グルタミン、1mMピルビン酸ナトリウムおよび0.1mM非必須アミノ酸)中で混合した。ネズミ科の抗CD30 mAb(Ac10およびHeFi-1)の第2架橋のためには、mAbを培地中でヤギ抗マウス(GAM)IgG Fc(Jackson ImmunoResearch)のF(ab')₂断片と混合した。1次mAbと第2架橋抗体との間で1:2.5、1:5および1:10の最終比を用いた。抗体カクテルは、室温で15分間インキュベートした。次いで、培地中のこれらの抗体カクテルを連続的に希釈した希釈液を調製し、所望の最終濃度を達成した。次いで、抗体カクテル100μlを5000個の細胞を含む100μlジャーカット細胞懸濁液と96穴組織培養(TC)プレート中で混合した。細胞を抗体カクテルと44時間インキュベートした後、1μCiの ^3H -TdRで4時間パルス処理した。次いで、細胞をフィルタ上に回収し、取り込まれたトリチウム化チミジンを、シンチレーション計数により測定した。処理した細胞からチミジン取り込み値を得て、次いで、これを未処理の対照培養物と比較した。

20

30

【0333】

第2架橋のないキメラなAC10(cAC10)は1μg/ml未満の濃度ではジャーカット細胞増殖を阻害しなかった。cAC10の第2のAbとの架橋は、ジャーカット細胞増殖を阻害するために必要とされるcAC10の濃度を有意に低下させた。最大の阻害は、cAC10の濃度が0.1μg/mlという低レベルで達成された(図2)。AC10とHeFi-1の両者とも、第2架橋抗体を使用した場合にはジャーカット細胞投与量に応じてチミジン取り込みを阻害した(図3)。in vitroの架橋抗体の使用は、単球、マクロファージ、Bリンパ球およびNK細胞上でin vivoで発現されるFc受容体の抗体のFc部分の結合を介して架橋をシミュレートするようである。第1と第2の架橋抗体間の1:10の比率が増殖阻害に最も効果的なようであった。検出可能な阻害は、AC10とHeFi-1の両者について、0.001μg/mlより大きな1次抗体濃度で観察された。阻害の最大レベルは、0.1μg/mlより大きな濃度で観察された。TCウェル上に固定化したAC10およびHeFi-1も、ジャーカットT細胞増殖を阻害する点において活性であった(データは示していない)。

40

【実施例 3】

50

(91)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【0334】

8. ジャーカット細胞における抗CD30 mAbにより誘導されるDNA断片化（アポトーシス）によるCD30の架橋

架橋抗CD30 mAbによって処理したジャーカット細胞の細胞周期状態およびDNA応答の関係をさらに調べた。4 μ g/mlの抗CD30 mAb AC10またはHeFi-1を(GAM) IgG Fc (Jackson ImmunoResearch)のF(ab')₂断片と培養培地(RPMI-1640、10% FBS、2 mM L-グルタミン、1 mM ピルビン酸ナトリウムおよび0.1 mM 非必須アミノ酸)中、最終比(重量:重量)1:4で混合した。抗体カクテルを室温で15分間インキュベートした。次いで、培地中、これらの抗体カクテルの1:10連続希釈液を調製した。次いで、抗体カクテル1 mlを、 0.25×10^6 細胞を含むジャーカット細胞懸濁液1 mlと12穴TCプレート中で混合した。

10

【0335】

24時間または48時間のインキュベーション後に、細胞を遠心分離によって回収し、37°Cで平衡に保った新鮮な培地2 mlに再懸濁した。活発にDNAを合成している細胞をターゲティングするためにプロモデオキシウリジン(BrdU)(シグマ(Sigma))、ミズーリ州セントルイス所在(St. Louis, MO))を用いた。1 mMのBrdU水溶液20 μ lを、細胞懸濁液に添加し、37°Cで15分間インキュベーションを継続した。次いで、細胞を遠沈し、PBSで1回洗浄し、氷冷PBS 0.5 ml中に再懸濁した。細胞固定のため-20°Cの100%エタノール1 mlを細胞懸濁液に滴下した。4°C 30分間の定着後、固定された細胞を遠沈した。細胞ペレットを0.5%のトライトンX-100(シグマ)と2 M HCl 1 mlに再懸濁し、室温で30分間インキュベートした後、細胞を遠沈した。pH 8.5の0.1 M Na₂B₄O₇ 1 mlを用いて細胞ペレットを再懸濁し、室温で10分間酸を中和した。次いで、細胞を遠心分離によってペレット化し、0.5% トウイーン20(シグマ)および1% BSAを含むPBSで1回洗浄した。PBS 50 μ l、0.5% トウイーン20、1% BSAを用いて各細胞ペレットを再懸濁させ、これに、25 μ lのFITC標識した抗BrdU(BD Immunocytometry Systems, San Jose, CA)を添加し、細胞懸濁液を室温で、30分間インキュベートした。次いで、細胞をPBS、0.5% トウイーン20、1% BSAで2回洗浄し、次いで、ヨウ化プロビジウム(PI)(シグマ)5 μ g/mlを含むPBS 0.5 ml中に再懸濁させ、細胞中のDNA含有量を定量した。次いで、DNA合成および細胞周期状態をフローサイトメトリーによって検討した。

20

30

【0336】

図4は、ヤギ抗マウスIgG Fc抗体で架橋したAC10またはHeFi-1のいずれかで処理した培養物中のDNA断片化を有するジャーカット細胞の外観を示す。DNA断片化を伴う細胞は、G₀/G₁期のDNA含有量よりも少なく(図4の中の第1枠)、BrdUを組み込まなかったG₂/M期のDNA(つまり、活発にDNAを合成していない細胞)含有量よりも少ないという事実によって表される(図4の中の第4枠)。DNA断片化は24および48時間のインキュベーション後に検出できた。ジャーカット細胞のこのようなDNA断片化はアポトーシスの特性である。これらのデータは、図5中で示されるジャーカット細胞の増殖阻害には、CD30シグナル伝達に应答してアポトーシスを行う細胞が伴っていたことを示唆する。AC10およびHeFi-1を段階的な投与量で投与した培養物からの細胞周期の異なる部分中の細胞のパーセンテージを集計すると、>0.002 μ g/mlの濃度のAC10またはHeFi-1は、ジャーカット細胞において実質的にアポトーシスを誘導することができたこと(特に処理後48時間(図5))が明らかであった。アポトーシス細胞の出現は、細胞周期のG₀/G₁、SおよびG₂/M期における細胞のパーセンテージに対応してまったく同様に減少した(図5)。

40

【実施例4】

【0337】

9. CD3のCD30との同時架橋が、ジャーカットT細胞に誘導されるアポトーシス

50

(92)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

を増強した

活性化誘導細胞死 (A C I D) は、自動反応的なリンパ球およびエフェクターリンパ球を除去し、それによってそれぞれ自己抗原への寛容性の付与、自己免疫反応の終結を行うために免疫系が使用する重要なメカニズムである。Tリンパ球上のC D 3 / T C R複合体またはBリンパ球上のs I g / B細胞抗原受容体複合体の結合は、Tリンパ球とBリンパ球を活性化する。抗原受容体結合および付属受容体を介したシグナル伝達の状況によって、リンパ球は増殖しエフェクター細胞に分化することができる。または、それらはアポトーシスを経ることになる。多くの付属受容体、例えば、C D 1 9、C D 2 7、C D 2 8、C D 4 0、C D 1 3 4 / O X 4 0、C D 1 3 7 / 4 - 1 B BおよびI C O SはBまたはTリンパ球上の抗原受容体と共同刺激して、細胞の増殖および/または分化を促進する。したがって、それらは免疫反応の促進にとって重要である。一方、C D 5、C D 2 2、C D 1 5 2 / C T L A 4およびP D - 1を含む付属受容体によるシグナル伝達は、リンパ球増殖および様々なリンパ球機能を阻害する。したがって、これらの受容体は自動反応的なリンパ球の除去に重要な役割を果たすかもしれない。それらはまた、エフェクターリンパ球の活性を抑えることにより免疫反応の終了に関係する。付属受容体によって媒介されるシグナル伝達経路の調節の欠陥が、自己免疫、アレルギー性および炎症性疾患に寄与しているのかもしれない。

10

【0338】

本発明者らは、リンパ球中のアポトーシスを調節する上で、C D 3 0シグナル伝達経路がC D 3 / T C R複合体のそれと協働するかという疑問を抱いた。ジャーカットT細胞を抗C D 3 0 m A b単独で、抗C D 3 m A bで、または抗C D 3 0および抗C D 3 m A bの組合せで処理した。図4および図5について述べたようにして、抗体をヤギ抗マウスI g G F cによって架橋した。細胞周期の分布は、図4におけるようにB r d UおよびP I染色によって決定した。抗C D 3 0 (A C 1 0) は、単独でジャーカットT細胞にアポトーシスを引き起こした。しかし、抗C D 3 (O K T 3、A T C C (バージニア州マナッサス所在 (M a n a s s a s、V A)) は培地 (対照) と比較してどのような効果ももたらさなかった。しかし、抗C D 3は、24および48時間のインキュベーション後に、抗C D 3 0によって誘導されるアポトーシスを大きく増強した。両方のm A bを0.2 μ g / m lで使用した時に、A C 1 0とO K T 3の間における最良の相乗効果が観察された (図6)。

20

30

【0339】

形質膜の細胞外側の面に対するアネクシン (A n n e x i n) Vの結合とP Iに対する膜透過性との結びつきを使用して、ジャーカット細胞における抗C D 3 0 - 誘導アポトーシスを別の面から検討した。G A M抗体と架橋させた、A C 1 0、H e F i - 1、O K T 3、A C 1 0 + O K T 3またはH e F i - 1 + O K T 3を含む抗体カクテルを、実施例2および3に記載したように調製した。1次m A bは、2 μ g / m lの最終濃度で使用した。10倍過剰のG A M抗体を使用して1次抗体を架橋した。室温で15分間のインキュベーション後、抗体カクテルをジャーカット細胞に加えた。A n n e x i n V - F I T Cアポトーシス検出キットI (B D P h a r M i n g e n、S a n D i e g o、C A) をメーカーの指示によって使用してA n n e x i n Vの結合とP Iへの浸透性によって、図7の中で指定した回数で、培養物中のアポトーシス性死細胞のパーセンテージを求めた。A n n e x i n V⁻ / P I⁻細胞は、生細胞であり (図7中の下左四分域)、A n n e x i n V⁺ / P I⁻細胞はアポトーシス細胞 (図7中の下右四分域)、また、A n n e x i n V⁺ / P I⁺細胞は死細胞 (図7中の上右四分域) であった。図6に示すP I / B r d U染色から得られたデータと一致して、A C 1 0およびH e F i - 1はインキュベーション後早くも4時間でジャーカット細胞に検出可能なアポトーシスを誘導した。抗C D 3 m A bの存在は、A C 1 0およびH e F i - 1の影響を著しく増強した。アポトーシス細胞および死細胞のパーセンテージはインキュベーションを48時間続ける間中、増加し続けた。これらのデータは、抗C D 3 m A bと抗C D 3 0 m A bの特定の組合せは、自己免疫、アレルギー反応および慢性炎症性疾患における免疫反応の抑制を制御す

40

50

(93)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

る C D 3 0 陽性 T リンパ球を除去する顕著な能力をもちうる、ということを示す。


【実施例 5】

【0340】

10. c A C 1 0 - 抗体 - 薬剤コンジュゲート (A D C)

10.1 c A C 1 0 - v c M M A E の合成

【化 2 6】



10


【0341】

A D C c A C 1 0 - v c M M A E (その一般構造を上を示す) の合成を以下に記載する。

【0342】

10.1.1 薬剤 - リンカー化合物の合成

【化 2 7】



30

【0343】

オーリスタチン E の合成は以前に文献に記載されている (P e t t i t G R と B a r k o c z y , J . 、 1 9 9 7 、 米国特許第 5 , 6 3 5 , 4 8 3 号、P e t t i t , G R 、 T h e D o l a s t a t i n s 、 P r o g . C h e m . O r g . N a t . P r o d . 、 7 0 、 1 - 7 9 、 1 9 9) 。 オーリスタチン E のモノメチル誘導体 (M M A E) を、オーリスタチン E の合成において N , N - ジメチルパリンをモノメチルパリン保護形に置き換えることにより調製した (S e n t e r ら、米国仮出願第 6 0 / 4 0 0 , 4 0 3 号、2 0 0 2 年 7 月 3 1 日出願 (それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる)) 。

40

【0344】

薬剤 - リンカー化合物、M M A E (1 . 6 9 g 、 2 . 3 5 m m o l) を調製するために、マレイミドカプロイル - L - パリン - L - シトルリン - p - アミノベンジルアルコール p - ニトロフェニルカーボネート (2 . 6 g 、 3 . 5 2 m m o l 、 1 . 5 当量、D u b o w c h i k , G . M . ら、B i o c o n j u g a t e C h e m . 2 0 0 2 、 1 3 、 8 5 5 - 8 6 9 頁に記載されるようにして調製した) および H O B t (6 4 m g 、 0 . 4 5 m m o l 、 0 . 2 当量) を D M F (2 5 m L) で希釈した。2 分後、ピリジン (5 m L) を加え、反応を逆相 H P L C を使用してモニターした。反応は、2 4 時間で完了したことが示された。反応混合物を濃縮すると暗色の油となり、これを D M F 3 m L で希釈した。D M F 溶液を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、溶離剤勾配 : 1 0 0 %

50

(94)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

ジクロロメタンから4:1 ジクロロメタン-MeOH)を使用して精製した。関連する画分を合わせて濃縮すると油状物が得られ、これは高真空下で固化し、所望の薬剤-リンカー化合物および未反応MMAEの混合物が汚い黄色の固体(9:1 ジクロロメタン-MeOH中の R_f 0.40)として得られた。この汚い黄色の固体をDMFで希釈し、分取逆相HPLC(Varian Dynamax C₁₈ カラム4.1.4 mm×25 cm、8 μ 、100 Å、MeCNと0.1% TFA水溶液を45 mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100% MeCNで20分間)を用いて精製したところ、所望の薬剤-リンカー化合物が非晶質の白いパウダー(9:1 ジクロロメタン-MeOH中の R_f 0.40)として得られた。これはHPLCで95%以上の純度であり、1%未満のMMAEを含んでいた。収量:1.78 g(57%); ES-MS m/z 1316.7 [M+H]⁺; UV λ_{max} 215、248 nm。

10

【0345】

10.1.2 コンジュゲートの調製

抗体還元。4.8 mL cAC10(10 mg/mL)に500 mMホウ酸ナトリウム/500 mM NaCl(pH 8.0)600 μ Lを加え、次いで、100 mM DTT水溶液600 μ Lを添加した。37℃で30分間インキュベートした後、1 mM DTPA(アルドリッチ)を含むPBSで平衡に保たれ溶出されたG25樹脂上での溶出により緩衝液を交換した。溶液の280 nmの吸光度から還元された抗体濃度を決定し、チオール濃度はDTNB(アルドリッチ)との反応および412 nmでの吸光度を決定することによりチオール/Ab値をチェックした。

20

【0346】


還元抗体のコンジュゲーション。還元したmAbを氷上で冷やした。薬剤-リンカー化合物は既知濃度のDMSO溶液として使用し、反応混合物に加えた薬剤-リンカーの量は以下のように計算した。 $L \text{ ストック溶液} = V \times [Ab] \times \text{超過倍数} / [\text{薬剤-リンカー}]$ 。ここで、Vおよび[Ab]はそれぞれ還元した抗体溶液の体積およびモル濃度である。2.3 mLの冷PBS/DTPAを還元抗体溶液に加えた。7.5 mM薬剤-リンカー化合物ストック溶液133.6 μ Lを1.47 mLアセトニトリル中に希釈した。アセトニトリル薬剤-リンカー溶液を氷上で冷やし、次に、還元した抗体溶液に加えた。その反応は、マレイミドに対して20倍モル過剰のシステイン添加後1時間で終了した。反応混合物を遠心限外ろ過によって濃縮し、PBS中脱塩G25を通した溶出によって精製した。次いで、cAC10-vcMMAEを無菌条件下に0.2ミクロンのフィルタで濾過し、-80℃で直ちに冷凍した。cAC10-vcMMAEは、1)濃度(UV吸光度による); 2)凝集(サイズ排除クロマトグラフィーによる); 3)薬剤/Ab(DTNBによって未反応チオールを測定する)および4)残留する遊離薬剤(逆相HPLCによる)について分析した。

30

【0347】

10.2 cAC10-fkAEFPの合成

【化28】



40

【0348】


ADC cAC10-fkAEFP(その一般的な構造を上を示す)の合成を下に記載する。

【0349】

50

(95)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

10.2.1 A E F P 合成
【化29】

10

【0350】

Boc-フェニルアラニン(1.0g、3.8mmol)を1,4-ジアミノベンゼンHCl(3.5g、19.0mmol、5.0当量)のトリエチルアミン(10.7mL、76.0mmol、20当量)およびジクロロメタン(50mL)中懸濁液に添加した。生じた溶液に、追加のDEPC(3.2mL、19.0mmol、5.0当量)を注射器で添加した。HPLCは24時間後に残留Boc-pheを示さなかった。反応混合物を濾過し、濾液を濃縮したところ、暗色の固体が得られた。この暗色の固体残渣を1:1

EtOAc水中で分配し、EtOAc層を水と塩水で連続して洗浄した。EtOAc層を、HPLC(Varian Dynamaxカラム41.4mm×25cm、5μ、100Å、MeCNと水溶液を45mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100%MeCNで20分間)を用いて精製した。関連する画分を合わせて濃縮すると、赤褐色の固体中間体を得られた。収量:1.4g(100%); ES-MS m/z 355.9[M+H]⁺; UVλ_{max} 215、265nm; ¹H NMR(CDCl₃) δ 7.48(1H, br s)、7.22~7.37(5H, m)、7.12(2H, d, J=8.7Hz)、7.61(2H, d, J=8.7Hz)、5.19(1H, br s)、4.39~4.48(1H, m)、3.49(2H, s)、3.13(2H, d, J=5.7Hz)、1.43(9H, s)。

20

【0351】

赤褐色固体(0.5g、1.41mmol)およびジイソプロピルエチルアミン(0.37mL、2.11mmol、1.5当量)をジクロロメタン(10mL)で希釈し、生じる溶液にFmoc-Cl(0.38g、1.41mmol)を添加した。反応混合物を撹拌したところ、数分後に白い固体沈殿を生じた。反応はHPLCによれば1時間で完了した。反応混合物を濾過し、濾液を濃縮すると油が得られた。油をEtOAcで沈殿させると、赤みがかかった白色の中間体製品が得られた。これを濾過によって回収し、真空下で乾燥した。収量:0.75g(93%); ES-MS m/z 578.1[M+H]⁺、595.6[M+NH₄]⁺。

30

【0352】

この赤みがかかった白色の中間体(0.49g、0.85mmol)をジクロロメタン10mLで希釈し、次に、トリフルオロ酢酸5mLで処理した。反応は逆相HPLCによれば30分で完了した。反応混合物を濃縮し、生じた残渣にエーテルを加えたところ白っぽい固体が沈殿した。この白っぽい固体を濾過し乾燥させると非晶質の粉末が得られた。これをBoc-ドナップロイン(Dolaproine)(Tetrahedron、1993、49(9):1913-1924頁に記載されるようにして調製)(0.24g、0.85mmol)のジクロロメタン(10mL)溶液に添加した。この溶液に、さらにトリエチルアミン(0.36mL、2.5mmol、3.0当量)およびPyBrop(0.59g、1.3mmol、1.5当量)を加えた。反応混合物は逆相HPLCを使用してモニターした。反応終了後すぐに反応混合物を濃縮し、得られた残渣をEtOAcで希釈し、10%のクエン酸水溶液、水、飽和重炭酸ナトリウム水溶液、水および塩水で連続

40

50

(96)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

して洗浄した。EtOAc層を乾燥し(MgSO₄)、濾過し、濃縮した。生じた残渣をフラッシュカラムクロマトグラフィー(シリカゲル)を使用して精製したところ、白っぽい粉末状中間体を得られた。収量: 0.57 g (88%); ES-MS m/z 764.7 [M + NH₄]⁺; UVλ_{max} 215、265 nm; ¹H NMR (DMSO-d₃) δ 10.0 ~ 10.15 (1H, m)、9.63 (1H, br s)、8.42 (1/2 H, d, J = 8.4 Hz)、8.22 (1/2 H, d, J = 8.4 Hz)、7.89 (2H, d, J = 7.2 Hz)、7.73 (2H, d, J = 7.6 Hz)、7.11 ~ 7.55 (13H, m)、4.69 ~ 4.75 (1H, m)、4.46 (2H, d, J = 6.8 Hz)、4.29 (1H, t, J = 6.4 Hz)、3.29 (3H, s)、2.77 ~ 3.47 (7H, m)、2.48 ~ 2.50 (3H, m)、2.25 (2/3 H, dd, J = 9.6, 7.2 Hz)、1.41 ~ 1.96 (4H, m)、1.36 (9H, s)、1.07 (1H, d, J = 6.4 Hz、回転異性体)、1.00 (1H, d, J = 6.4 Hz、回転異性体)。

10

【0353】

白色固体中間体(85 mg、0.11 mmol)およびMe-val-val-dil-O-t-ブチル(55 mg、0.11 mmol)をPettitら、J. Chem. Soc. Perk. I、1996、859に記載されるように調製し、ジクロロメタン(5 mL)で希釈し、次に、室温で2時間窒素大気下のトリフルオロ酢酸2.5 mLで処理した。反応完了はRP-HPLCによって確認した。減圧して溶媒を除去し、生じた残渣を、トルエンと2度共沸蒸留により乾燥し、次いで、真空下で12時間乾燥した。

20

【0354】

残基をジクロロメタン(2 mL)で希釈し、ジイソプロピルエチルアミン(3当量)を添加し、DEPC(1.2当量)を続けて加えた。反応が終わった後、反応混合物を減圧下で濃縮し、生じた残渣をEtOAcで希釈し、10%クエン酸水溶液、水、飽和重炭酸ナトリウム水溶液および塩水で連続して洗浄した。EtOAc層を乾燥させて濾過し濃縮したところ、黄色の油を得られた。

【0355】

この黄色の油をジクロロメタン(10 mL)で希釈し、生じた溶液にジエチルアミン(5 mL)を加えた。HPLCによれば、反応は2時間後に終わった。反応混合物を濃縮すると油を得られた。この油をDMSOで希釈し、DMSO溶液は、分取逆相HPLC(Va-rian Dynamaxカラム21.4 mm×25 cm、5 μ、100 Å、MeCNと0.1% TFA水溶液を20 mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100% MeCNで20分間)を用いて精製した。関連する画分を合わせて濃縮すると、所望の薬剤が白っぽい固体として得られた。全収量: 42 mg; (全体で44%); ES-MS m/z 837.8 [M + H]⁺、858.5 [M + Na]⁺; UVλ_{max} 215、248 nm。

30


【0356】

10.2.2 リンカー合成

(97)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【化30】



10

【0357】


リンカー化合物、マレイミドカプロイル-L-フェニルアラニン-L-リジン(MMT)をDubowchikら、2002、Bioconjugate Chem. 13: 855-896頁に記載されるようにして調製した。

【0358】

10.2.3 薬剤-リンカー化合物の調製

20

【化31】



30

【0359】

10.2.1節の薬剤(9mg、10.8μmol)および10.2.2節で得たリンカー(5.2mg、10.8μmol)をジクロロメタン(1mL)で希釈し、得られた溶液にHATU(6.3mg、16.1μmol、1.5当量)、次いでピリジン(1.3μL、16.1μmol、1.5当量)を添加した。反応混合物は、HPLCを使用してモニターしながらアルゴン雰囲気下に撹拌した。反応は6時間後に完了した。反応混合物を濃縮し、生じた残渣をDMSOで希釈した。DMSO溶液を分取逆相HPLC(Varian Dynamaxカラム21.4mm×25cm、5m、100Å、MeCNとEt₃N-CO₂(pH7)20mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100%MeCNで20分間)を用いて精製し、関連する画分を合わせて濃縮すると、白っぽい固体中間体が得られ、これはHPLCで95%以上の純度であった。

40

【0360】

この白っぽい中間体をジクロロメタン(2mL)に希釈し、得られた溶液をTFA(0.5mL)で処理した。反応はHPLCを使用してモニターし2時間で完了した。反応混合物を濃縮し、生じた残渣をDMSOで希釈し、実施例13に記載するのと同じ条件下で精製した。関連する画分を合わせて濃縮すると、所望の薬剤-リンカー化合物が白っぽい粉末として得られた。収量: 14.9mg(90%); ES-MS m/z 1304.6[M+H]⁺; UVλ_{max} 215、275nm。

【0361】

50

(98)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

10.2.4 コンジュゲートの調製

抗体還元。3.0 mL cAC10 (10 mg/mL) に 500 mM ホウ酸ナトリウム / 500 mM NaCl (pH 8.0) 375 μ L を加え、次いで、100 mM DTT 水溶液 375 μ L を添加した。37°C で 30 分間インキュベートした後、1 mM DTPA (アルドリッチ) を含む PBS で平衡に保たれ溶出された G25 樹脂上での溶出により緩衝液を交換した。溶液の 280 nm の吸光度から還元された抗体濃度を求め、チオール濃度は DTNB (アルドリッチ) との反応および 412 nm での吸光度を測定することによりチオール / Ab 値をチェックした。

【0362】

還元抗体のコンジュゲーション。還元した mAb を氷上で冷やした。薬剤-リンカー化合物は既知濃度の DMSO 溶液として使用し、反応混合物に加えた薬剤-リンカーの量は以下のように計算した。L ストック溶液 = $V \times [Ab] \times \text{超過倍数} / [\text{薬剤-リンカー}]$ 。ここで、V および [Ab] はそれぞれ還元した抗体溶液の体積およびモル濃度である。2.2 mL の冷 PBS / DTPA を還元抗体溶液に加え、次いで、1.47 mL DMSO を加え、混合物を氷上で冷やした。次いで、140.0 μ L 7.6 mM 薬剤-リンカー化合物ストック溶液を還元抗体 / DMSO 溶液に加えた。反応は、マレイミドに対して 20 倍モル過剰のシステイン添加後 1 時間で終了した。反応混合物を遠心限外ろ過によって濃縮し、PBS 中脱塩 G25 を通した溶出によって精製した。次いで、cAC10-fkAEFP を無菌条件下に 0.2 ミクロンのフィルタを通して濾過し、-80°C で直ちに冷凍した。cAC10-fkAEFP は、1) 濃度 (UV 吸光度による) ; 2) 凝集 (サイ


10

20

【0363】

10.3 cAC10-vcAEFP の合成

【化32】



30

【0364】

ADC cAC10-vcAEFP (その一般的な構造を上を示す) の合成を下に記載する。

【0365】

10.3.1 薬剤合成


薬剤は、上記セクション 10.2.1 に例示したようにして合成した。

40

【0366】

10.3.2 薬剤-リンカー化合物の調製

【化33】



50

(99)

JP 2005-511627 A 2005.4.28

【0367】

10.2.1節の薬剤のトリフルオロ酢酸塩(0.37g、0.39mmol、1.0当量)およびFmoc-val-cit(0.30g、0.58mmol、1.5当量。Dubowchikら、Bioconjugate Chem. 2002、13、855~896頁に従って調製)をDMF(5mL、0.1M)で希釈し、得られた溶液にピリジン(95μL、1.2mmol、3.0当量)を添加した。次いで、HATU(0.23mg、0.58mmol、1.5当量)を固体として加え、反応混合物は、HPLCを使用してモニターしながらアルゴン雰囲気下に撹拌した。反応は緩慢であり、4時間後にジソプロピルエチルアミン1.0当量を加えた。反応は1時間後に完了した。反応混合物を真空化に濃縮し、生じた残渣を分取逆相HPLC(Varian Dynamax C18カラム41.4mm×25cm、5μ、100Å、MeCNと0.1%TFA水溶液45mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100%MeCNで20分間)を用いて精製すると、淡いピンク色の固体中間体が得られた。

10

【0368】

ピンク色の固体中間体をDMF(30mL)で希釈し、生じた溶液にジエチルアミン(15mL)を添加した。HPLCによれば反応は2時間で完了していた。反応混合物を濃縮し、生じた残渣をエーテルで2度洗浄した。固体中間体を高真空下で乾燥し、次いで、そのまま次のステップで使用した。

【0369】

固体中間体をDMF(20mL)で希釈し、生じた溶液に6-(2,5-ジオキシ-2,5-ジヒドロ-ピロール-1-イル)-ヘキサン酸2,5-ジオキシ-ピロリジン-1-1-イルエステル(0.12g、0.39mmol、1.0当量)(EMCS, Molecular Biosciences Inc., Boulder, CO)を添加した。4日後に、反応混合物を濃縮すると油状物が得られ、これを分取逆相HPLC(Varian Dynamax C18カラム41.4mm×25cm、5μ、100Å、MeCNと0.1%TFA水溶液45mL/分で40分かけて10%から100%まで勾配をかけて流し、その後、100%MeCNで20分間)を用いて精製すると、所望の薬剤-リンカー化合物が白色鱗片状の固体として得られた。収量:0.21g(全体で38%); ES-MS m/z 1285.9[M+H]⁺、13.07.8[M+Na]⁺; UV λ_{max} 215、266nm。

20

30

【0370】

10.3.3 コンジュゲートの調製

抗体還元。3.0mL cAC10(10mg/mL)に500mMホウ酸ナトリウム/500mM NaCl(pH8.0)375μLを加え、次いで、100mM DTT水溶液375μLを添加した。37℃で30分間インキュベートした後、1mM DTPA(アルドリッチ)を含むPBSで平衡に保たれ溶出されたG25樹脂上での溶出により緩衝液を交換した。溶液の280nmの吸光度から還元された抗体濃度を求め、チオール濃度はDTNB(アルドリッチ)との反応および412nmでの吸光度を測定することによりチオール/Ab値をチェックした。

【0371】

還元抗体のコンジュゲーション。還元したmAbを氷上で冷やした。薬剤-リンカー化合物は既知濃度のDMSO溶液として使用し、反応混合物に加えた薬剤-リンカーの量は以下のように計算した: Lストック溶液 = V × [Ab] × 超過倍数 / [薬剤-リンカー]。ここで、Vおよび[Ab]はそれぞれ還元した抗体溶液の体積およびモル濃度である。2.2mLの冷PBS/DTPAを還元抗体溶液に加え、次いで、1.47mL DMSOを加え、混合物を氷上で冷やした。次いで、140.0μL 7.6mM薬剤-リンカー化合物ストック溶液を還元抗体/DMSO溶液に加えた。反応は、マレイミドに対して20倍モル過剰のシステインを添加した後1時間で終了した。反応混合物を遠心限外ろ過によって濃縮し、PBS中脱塩G25を通した溶出によって精製した。次いで、cAC10-vcAEFPを無菌条件下で0.2ミクロンのフィルタで濾過し、-80℃で直ちに

40

50

(100)


J P 2005-511627 A 2005.4.28

冷凍した。cAC10-vcAEFPは、1)濃度(UV吸光度による);2)凝集(サイズ排除クロマトグラフィーによる);3)薬剤/Ab(DTT、次いでDTNBによって未反応チオールを測定する)および4)残留する遊離薬剤(逆相HPLCによる)について分析した。

【0372】

10.4 cAC10-fkMMAEの合成

【化34】



10

【0373】


ADC cAC10-fkMMAE(その一般的な構造を上を示す)の合成を下に記載する。

20

【0374】

10.4.1 薬剤-リンカー化合物の調製

【化35】



30

【0375】

オーリスタチンEの合成は以前に文献に記載されている(Pettit GRとBarkoczy, J., 1997, 米国特許第5,635,483号、Pettit, G.R., Prog. Chem. Org. Nat. Prod., 70, 1-79, 199)。オーリスタチンEのモノメチル誘導体(MMAE)を、オーリスタチンEの合成においてN,N-ジメチルバリンをモノメチルバリン保護形に置き換えることにより調製した(Senterら、米国仮出願第60/400,403号、2002年7月31日出願(それは参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる))。

40

【0376】

MMAE(100mg、0.14mmol)、リンカーであるマレイミドカプロイル-L-フェニルアラニン-L-リジン(MMT)-p-アミノベンジルアルコールp-ニトロフェニルカーボネート(160mg、0.15mmol、1.1当量。Dubowchikら、Bioconjugate Chem., 2002, 13, 855-869頁に記載されるようにして調製した)、およびHOBt(19mg、0.14mmol、1.0当量)をDMF(2mL)で希釈した。2分後、ピリジン(0.5mL)を加え、反応混合物を逆相HPLCを使用してモニターした。24時間後にはMMAEもリンカーも検出されなくなった。反応混合物を濃縮し、得られた残渣を分取逆相HPLC(Varian

50

(101)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

Dynamax カラム 21.4 mm × 25 cm、5 μ、100 Å、MeCN と Et₃N - CO₂ (pH 7) 20 mL / 分で 40 分かけて 10 % から 100 % まで勾配をかけて流し、その後、100 % MeCN で 20 分間) を用いて精製した。関連する画分をプールし、濃縮すると、白っぽい固体中間体が得られた。ES-MS m/z 1608.7 [M + H]⁺

この白っぽい中間体を MeCN / 水 / TFA (それぞれの比は 85 : 5 : 10) に希釈した。得られた反応溶液を HPLC を使用してモニターし 3 時間で完了した。反応混合物を直接濃縮し、得られた残渣を分取逆相 HPLC (Varian Dynamax カラム 21.4 mm × 25 cm、5 μ、100 Å、MeCN と 0.1 % TFA 水溶液 20 mL / 分で 40 分かけて 10 % から 100 % まで勾配をかけて流し、その後、100 % MeCN で 20 分間) を用いて精製した。関連する画分を合わせて濃縮すると、所望の薬剤-リンカー化合物が白っぽい粉末として得られた。収量: 46 mg (全体で 3.2 %); ES-MS m/z 1334.8 [M + H]⁺; UVλ_{max} 215、256 nm。

10

【0377】

10.4.2 コンジュゲートの調製

抗体還元。4.8 mL cAC10 (10 mg / mL) に 500 mM ホウ酸ナトリウム / 500 mM NaCl (pH 8.0) 600 μL を加え、次いで、100 mM DTT 水溶液 600 μL を添加した。37 °C で 30 分間インキュベートした後、1 mM DTPA (アルドリッチ) を含む PBS で平衡化し溶出させる G25 樹脂上での溶出により緩衝液を交換した。溶液の 280 nm の吸光度から還元された抗体濃度を求め、チオール濃度は DTNB (アルドリッチ) との反応および 412 nm での吸光度を測定することによりチオール / Ab 値をチェックした。

20

【0378】

還元抗体のコンジュゲーション。還元した mAb を氷上で冷やした。薬剤-リンカー化合物は既知濃度の DMSO 溶液として使用し、反応混合物に加えた薬剤-リンカーの量は以下のように計算した: L ストック溶液 = V × [Ab] × 超過倍数 / [薬剤-リンカー]。ここで、V および [Ab] はそれぞれ還元した抗体溶液の体積およびモル濃度である。2.3 mL の冷 PBS / DTPA を還元抗体溶液に加えた。7.5 薬剤-リンカー化合物ストック溶液 133.6 μL を 1.47 mL アセトニトリル中に希釈した。アセトニトリル薬剤-リンカー溶液を氷上で冷やし、次に、還元した抗体溶液に加えた。その反応は、マレイミドに対して 20 倍モル過剰のシステインを添加した後 1 時間で終了した。反応混合物を遠心限外ろ過によって濃縮し、PBS 中脱塩 G25 を通す溶出によって精製した。次いで、cAC10-fkMMAE を無菌条件下に 0.2 ミクロンのフィルタで濾過し、-80 °C で直ちに冷凍した。cAC10-fkMMAE は 1) 濃度 (UV 吸光度による); 2) 凝集 (サイズ排除クロマトグラフィーによる); 3) 薬剤 / Ab (DTNB によって未反応チオールを測定する) および 4) 残留する遊離薬剤 (逆相 HPLC による) について分析した。

30

【0379】

10.5 結果

cAC10-vcMMAE がジャーカット T 細胞増殖を抑制する能力を検討した。96 穴 TCT プレートに、培地 100 μL 中に 5000 個含まれるジャーカット T 細胞を播種した。培地 100 μL 中 cAC10-vcMMAE 濃度を段階的としたもの、または対照の非結合 IgG (cIgG)-vcMMAE を図 9 に示す最終濃度を達成するようにジャーカット細胞へ加えた。80 時間のインキュベーションの後に、細胞の DNA 合成を 16 時間の ³H-TdR パルスによって評価した。0.001 μg / mL を超える濃度のキメラ AC10-vcMMAE は、DNA 合成を有意に阻害した。IC₅₀ はおよそ 0.1 μg / mL であった。対照 cIgG-vcMMAE は、0.1 μg / mL 未満の濃度で有意な増殖抑制作用を示さなかった。図 2 は、可溶性のコンジュゲートされていない cAC10 が、1 μg / mL を超える濃度でジャーカット細胞に対する増殖抑制効果を有したことを示す。まとめると、これらのデータは、cAC10 が CD30⁺ 標的細胞に細胞傷害性薬

40

50

(102)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

剤を送達することにおいて有効であり、c A C 1 0 - v c M M A E A D C は標的とする細胞に結合すると効率的にインターナリゼーションすることを示唆している。

【実施例 6】

【0380】

11. 正常なヒト末梢血の単核細胞 (P B M C) の活性化によって T リンパ球上の C D 3 0 発現が誘導された

正常なドナーから成分採血によって得たヒト P B M C を、ヒト T リンパ球の供給源とした。固定化した抗 C D 3 および抗 C D 2 8 m A b を、T リンパ球を活性化し、その増殖を誘導するために使用した。m A b を固定化するために、P B S 中、抗 C D 3 m A b (O K T 3) および抗 C D 2 8 m A b (B - T 3 、 D i a C l o n e R e s e a r c h , B e s a n c o n , F r a n c e 、 または 9 . 3 、 H a r a ら . 、 1 9 8 5 、 J . E x p . M e d . 、 1 6 1 、 1 5 1 3 ~ 1 5 2 4 頁) のそれぞれを $1 \mu \text{g} / \text{ml}$ で、T C またはフラスコ中、 37°C で 2 時間インキュベートした。P B S で 2 回洗浄することによって非結合 m A b を除去した。培地 (R P M I - 1 6 4 0 、 1 0 % F B S 、 2 m M L - グルタミン、1 m M ビルビン酸ナトリウムおよび 0 . 1 m M 非必須アミノ酸) 中 0.5×10^6 細胞 / m l の濃度で、m A b コーティングを施した T C ウェルまたはフラスコへに P B M C を播種することにより T 細胞活性化を開始した。いくつかの実験では、 $100 \text{ IU} / \text{ml}$ の最終濃度の組み換えヒト I L - 2 (r h I L - 2) (C h i r o n 、 E m e r y v i l l e 、 C A) も含有させた。

【0381】

T 細胞活性化および C D 3 0 発現は多色フローサイトメトリー分析によってモニターした。C D 3 0 発現の検出のために、精製した抗 C D 3 0 (A C 1 0) をメーカーの指示によって蛍光プローブ A l e x a F l u o r (A F) (M o l e c u l a r P r o b e s 、 E u g e n e 、 O R) で標識した。抗体を染色する前に、活性化した P B M C を、染色用培地 (P B S 、 1 % ウシ血清アルブミン (B S A) 、 0 . 0 2 % アジ化ナトリウム) で 1 回洗浄し、ペレット化した。A F 標識した抗 C D 3 + 5 フィコエリトリン (P E) 標識した抗 C D 4 (B D P h a r M i n g e n 、 S a n D i e g o 、 C A) + C y - C h r o m e (C y) 標識した抗 C D 8 (B D P h a r M i n g e n) またはフルオレセインイソチオシアネート (F I T C) 抗 C D 2 5 (B D P h a r M i n g e n) + P E 標識した抗 C D 4 (B D P h a r M i n g e n) + C y 標識した抗 C D 8 (B D P h a r M i n g e n) のいずれかの染色培地中カクテル $25 \mu \text{l}$ を使用して 0.2×10^6 細胞ペレットを再懸濁した。細胞を氷上で 2 0 分間インキュベートし、染色培地で 2 度洗浄し、P B S 中 1 % パラホルムアルデヒドで固定し、F A C S c a n (B D バイオサイエンス (B D B i o s c i e n c e) 、カリフォルニア州サンホセ所在 (S a n J o s e 、 C A)) 上で分析した。

【0382】

図 1 0 に示したように、刺激されていない P B M C では T リンパ球はほとんど C D 3 0 を発現しなかった。抗 C D 3 + 抗 C D 2 8 または抗 C D 3 + 抗 C D 2 8 + I L - 2 のいずれかによる P B M C の活性化は、T リンパ球上で時間依存的な C D 3 0 の発現を誘導した。対照的に、培地だけで維持した P B M C は C D 3 0 発現の誘導を示さなかった。C D 3 0 の発現増加は、C D 4 ⁺ および C D 4 ⁻ (C D 8 ⁺ 細胞を含むが、データは示していない) 細胞の両方で検出された。C D 4 ⁺ および C D 8 ⁺ T リンパ球の両者についての発現ピークは、刺激後 4 日目頃であった。その後は、レベルは低減していき培養約 8 日後には基線レベルまで落ちた。

【実施例 7】

【0383】

12. c A C 1 0 A D C が活性化正常 T リンパ球の増殖を抑制した

c A C 1 0 A D C が、活性化正常 T リンパ球の増殖を抑制する能力を調べた。実施例 6 に記載するように、正常な P B M C は、抗 C D 3 および抗 C D 2 8 m A b によって活性化された。培養 3 日目 (それは C D 3 0 誘導のピークに接近していた (図 1 0)) に、

(103)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

活性化したP B M Cを回収した。細胞の一部は、C D 4およびC D 8細胞の両者におけるC D 3 0発現を確認するため、フローサイトメトリー分析に用いた。細胞の残りはペレット化し、5 0 , 0 0 0細胞 / m lで2 0 0 I U / m lのr h I L - 2を含む新鮮な培地に再懸濁させた。この細胞懸濁液1 0 0 μ l (5 , 0 0 0個の細胞) を9 6穴T Cプレート各ウェルに移した。2 0 0 I U / m lのr h I L - 2を添加した培地中、c A C 1 0 - f k M M A E、c A C 1 0 - v c M M A E濃度を段階的にしたものまたは対応する非結合c I g G A D Cを1 0 0 μ l、図1 1中に示した濃度を達成するように培養ウェルに加えた。細胞をさらに4 8または7 2時間培養し、最後の1 6時間は、³ H - T d Rのパルス処理をして細胞のD N A合成を評価した。ジャーカットT細胞上のその活性と同様に、c A C 1 0 A D Cは、活性化したP B M Cの増殖を抑制した(図1 1)。c A C 1 0 A D Cが、0 . 0 1 μ g / m lを超える濃度で存在した時に抑制効果が検出できた。一方のA D Cと共に7 2時間インキュベーションした場合は、4 8時間のインキュベーションより大きい増殖抑制をもたらした。キメラA C 1 0 - f k M M A Eはc A C 1 0 - v c M M A Eより活性であるようにみえた。

【実施例8】

【0384】

1 3 . 記憶Tリンパ球はナイーブTリンパ球よりc A c 1 0 A D Cに対して感受性が高かった

P B M Cは、リンパ球の様々なサブセットから構成されるため、c A C 1 0 A D Cに対する1つの細胞サブセットの応答は、他のサブセットによって簡単にマスクされてしまうおそれがある。この可能性を検討するために、Tリンパ球の全体、ナイーブTリンパ球と記憶Tリンパ球をネガティブ免疫選択によってP B M Cから富化した。簡単に言えば、P B M Cを、 $2 0 \times 1 0^6$ 細胞 / m lの最終濃度で、飽和量の抗体を含む以下の抗体カクテルのうちの1つと共に氷上において2 0分間、インキュベートした。全Tリンパ球を富化するために、抗体カクテルは、抗C D 1 4 (B D P h a r M i n g e n)、抗C D 1 6 (B D P h a r M i n g e n)および抗C D 2 0 (B D P h a r M i n g e n)を含有した。ナイーブTリンパ球(C D 4 5 R O⁺)を富化するために、抗体カクテルは、抗C D 1 4、抗C D 1 6、抗C D 2 0、および抗C D 4 5 R O (B D P h a r M i n g e n)を含有した。記憶Tリンパ球(C D 4 5 R A⁺)を富化するために、抗体カクテルは、抗C D 1 4、抗C D 1 6、抗C D 2 0および抗C D 4 5 R A (B D P h a r M i n g e n)を含有した。抗体カクテルはすべて1 0 % F B Sを添加した培地中で調製した。抗体結合後、細胞を氷冷した培地で2度洗浄し、培地中 $2 0 \times 1 0^6$ 細胞 / m lの濃度になるように再懸濁した。抗体結合した細胞を、D y n a b e a d s M 4 5 0ヤギ抗マウスI g G常磁性ビーズ(ダイナル(D y n a l)、ノルウェー、オスロ所在(O s l o、N o r w a y))によって細胞懸濁液から取り除いた。細胞懸濁液に添加する前に、D y n a b e a d s M 4 5 0ヤギ抗マウスI g Gは、培地によって2度洗洗浄し、培地中 $6 0 \times 1 0^6$ 細胞 / m lの濃度になるように再懸濁した。同容量の細胞および常磁性ビーズを4℃で混合し、2時間遠心した。細胞 / 常磁性ビーズ懸濁液を培地で2倍希釈した。非結合常磁性ビーズおよび常磁性ビーズ-細胞コンジュゲートは、磁石の印加によって培養物の側に引きつけた。非結合細胞は、上に記載したサブセットが富化しており、これを取り出した。フローサイトメトリー分析を行って、図1 2の左欄に示すような富化を確認した。

【0385】

次いで、様々なT細胞サブセット上での活性化誘導によるC D 3 0発現を検討した。簡単に言えば、免疫選択から得られた全Tリンパ球、ナイーブTリンパ球、および記憶Tリンパ球は、実施例6に記載するように2 0 0 I U / m lのI L - 2の存在下、固定化した抗C D 3および抗C D 2 8抗体によって刺激した。7 2時間のインキュベーションの後、(これも実施例6で概説したように)、様々な培養物中でのC D 4およびC D 8細胞の両方におけるC D 3 0の発現を、フローサイトメトリーによって判定した。開始集団が全Tリンパ球、ナイーブTリンパ球または記憶Tリンパ球であるか否かにかかわらず、C D 4

(104)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

およびCD8細胞の両方でCD30の発現が検出された(図12)。記憶CD4⁺およびCD8⁺細胞上でのCD30のレベルは、一貫して他のサブセットよりもわずかに高かった。

【0386】

次いで、活性化したナイーブ(CD45RO⁺)Tリンパ球および記憶Tリンパ球(CD45RA⁺)のcAC10ADCに対する応答を調べた。3日活性化したナイーブTリンパ球および記憶Tリンパ球を、96穴TCプレート上に培地(200IU/mlのrhIL-2およびcAC10ADCまたはcIgGADCを図13に示した最終濃度で含む)の最終容量200μlで、5,000細胞/ウェルとなるように播種した。細胞をさらに72時間インキュベートし、細胞のDNA合成を評価するために最後の16時間は³H-TdRでパルス処理した。cIgGADCは2μg/ml未満の濃度では、T細胞増殖に有意な効果がなかったが、cAC10-vcMMAEまたはcAC10-vcAEFPのいずれも、0.007μg/ml以上の濃度で活性化した記憶Tリンパ球の増殖を有意に抑制した。対照的に、活性化したナイーブTリンパ球は、cAC10-vcMMAEに対し比較的耐性であった。cAC10-vcAEFPコンジュゲートは両方のT細胞サブセット上でcAC10-vcMMAEコンジュゲートより有効であることが判明した。それにもかかわらず、ナイーブTリンパ球は、記憶Tリンパ球よりもcAC10-vcAEFPに対する感受性がさらに低い(図13)。cAC10ADCに対するナイーブTリンパ球と記憶Tリンパ球との間の感受性の差は、恐らく抗原密度によるものではないであろう。活性化ナイーブTリンパ球と記憶Tリンパ球は、両方とも、CD30を相当なレベルで発現することが見出されたからである(図12)。図11で報告した、cAC10-vcMMAEの増殖抑制活性は、恐らくナイーブTリンパ球と記憶Tリンパ球の応答の組合せを反映している。より重要なことに、これらの結果は、cAC10-vcMMAEは、CD30⁺ナイーブTリンパ球への影響を最小限にとどめつつ、CD30⁺記憶Tリンパ球の増殖を選択的に抑制し得ることを示唆している。自己免疫疾患、炎症性疾患およびアレルギー性疾患の病因にかかわるエフェクターTリンパ球は通常、抗原によって刺激され、これらは記憶Tリンパ球サブセットに属する。したがって、治療的な介入過程にcAC10-vcMMAEを適用することには、抗原によって刺激されたTリンパ球のみを標的とするという利点がある。他方、cAC10-vcAEFPの適用は、活性化したナイーブTリンパ球と記憶Tリンパ球両方の増殖を抑えることが望まれる状況(例えば、移植拒絶における)で好ましいであろう。

【実施例9】

【0387】

14. 正常なヒトTリンパ球の同系異種的刺激がCD30発現を誘導した

自己免疫、アレルギー性疾患および炎症性応答の病因にかかわるエフェクターTリンパ球は、通常、多数回の抗原刺激と増殖を経ている。この慢性の活性化プロセスで、それらは、サイトカイン分泌および細胞溶解応答を含むエフェクター機能を実行し続けて組織の損傷を誘導する。したがって、活性化と増殖の繰り返しを複数回経験したTリンパ球が依然としてCD30を発現し得るか、また、抗CD30 mAbおよびそれらのADCが、慢性的に活性化した、そうしたCD30⁺Tリンパ球の増殖を抑制するためにはどのように適用し得るかを調べることが重要である。そのようなT細胞システムのうちの1つを同系異種の刺激細胞に対して生成した。実施例9において詳述するCD8⁺細胞の枯渇によってPBM CからCD4⁺リンパ球を富化した。簡単に言えば、PBM Cを、氷上で20分間、飽和濃度の抗CD8 mAb(BD Pharmingen)を含む培地中でインキュベートした。次いで、細胞を、氷冷培地で2度洗浄した。抗CD8結合細胞をDynabeads M450ヤギ抗マウスIgG常磁性ビーズによって細胞懸濁液から取り除いた。非結合細胞は、CD4⁺細胞が富化しており、そのCD4発現をフローサイトメトリーによって分析した。

【0388】

PBM C(5×10⁶)は、CD4⁺細胞が富化しているが、これを、等しい数のガン

(105)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

マ線照射 (2 7 0 0 ~ 5 0 0 0 r a d s) 同系異種 D a u d i 細胞 (A T C C) と共培養した。4 日目には I L - 2 を 4 0 0 I U / m l の最終濃度で加え、培養を 1 4 日目まで継続した。次いで、生存細胞を 2 0 0 I U / m l の I L - 2 存在下、T 細胞 : D a u d i 比を 1 : 3 とし、照射 D a u d i 細胞で再刺激し増殖させた。これが第 2 周期の初めである (図 1 4) 。7 ~ 9 日の培養後に、T リンパ球を照射 D a u d i 細胞で再刺激し、続く増殖ラウンドを開始させた。同系異種刺激細胞添加後 3 ~ 4 日目および 7 ~ 9 日目に C D 3 0 の発現を調べた。図 7 に示すように、C D 3 0 は、C D 4 ⁺ および C D 4 ⁻ 細胞の両者について各ラウンドで同系異種刺激で誘導された。C D 3 0 の発現レベルは各刺激サイクルの終わりに向けて漸減する。これらの結果は、抗原刺激 T リンパ球が、それらが抗原刺激でチャレンジされたときに C D 3 0 を発現する能力を保持していることを確認するものである。

10

【実施例 1 0】

【0 3 8 9】

1 5 . T リンパ球クローンの生成

エフェクターリンパ球を i n v i t r o でシミュレートする別の方法は、T リンパ球クローンを作製することである。図 1 6 は、抗原非特異性のヘルパー (T h) および細胞傷害性 (T c) T リンパ球クローンを作製するためのプロトコルを示す。P B M C を出発原料として用いた。実施例 8 および 9 に記載した免疫選択方法を使用して C D 4 ⁺ または C D 8 ⁺ 細胞を富化した。T リンパ球を刺激し増殖するために 2 つのアプローチを適用した。第 1 のアプローチでは、9 6 穴 T C プレート中の限界希釈において、固定した抗 C D 3 プラス可溶性抗 C D 2 8 および r h I L - 2 (2 0 0 I U / m l) とで細胞を刺激した。実施例 6 に記載するようにして抗 C D 3 を 1 μ g / m l で T C ウェルに固定した。あるいは、細胞は、フィトヘムアグルチニン (シグマ (S i g m a) 、 (1 ~ 2 μ g / m l)) 、1 0 , 0 0 0 個の照射された C E S S 細胞 (A T C C 、照射量 : 2 7 0 0 r a d)) および r h I L - 2 (2 0 0 I U / m l) で刺激した (9 6 穴プレート中の限界希釈) 。サイトカインおよび / またはサイトカインに対する抗体を異なる組合せで含むものを添加して T リンパ球クローンの T h ₁ エフェクター細胞または T h ₂ エフェクター細胞への発達をそらすこともできる。

20

【0 3 9 0】

限界希釈アッセイで同定されたクローンを多数回の再刺激によってさらに増殖した。各ラウンドは 1 0 ~ 1 2 日間続けた。第 2 ラウンドの増殖では、P H A (1 ~ 2 μ g / m l) 、1 × 1 0 ⁶ 被照射フィーダー細胞 (C E S S) および r h I L - 2 (2 0 0 I U / m l) でクローンを刺激した。いくつかの実験では、抗 I L - 1 2 (R & D S y s t e m s 、5 μ g / m l)) および I L - 4 (R & D S y s t e m s 、1 0 n g / m l) を添加して、T リンパ球クローンの T h ₂ または T c ₂ サブセットへの発達を促した。続く再刺激ラウンドでは、T リンパ球 : フィーダー細胞比を 1 : 2 とし、I L - 2 を 2 0 0 I U / m l で添加した。T 細胞クローンのいくつかのパネルはこれらの刺激プロトコルを使用して作製したもので、それらについてはさらに表現型と機能分析を行った。

30

【実施例 1 1】

【0 3 9 1】

1 6 . T リンパ球クローンの表現型

フローサイトメトリーによって決定した 1 0 個の T リンパ球クローンの表面表現型を、図 1 6 に示す。1 0 のクローンはすべて、C D 3 を高レベルで、C D 2 8 を検出できるレベルで発現した。1 0 のクローンのうちの 6 つは C D 4 を発現したが、それらは T ヘルパークローン (T h) と考えることができる。残りの 4 つのうちの 3 つは C D 8 を発現したため、細胞傷害性 T リンパ球クローン (T c) と考えることができる。最後のクローンは C D 4 ⁺ / C D 8 ⁺ であった。C D 3 0 の発現は 1 0 のクローンすべてで検出できた。分析は休止クローンについて行ったので、シグナル強度は比較的低かった。

40

【0 3 9 2】

T リンパ球クローンについてはサイトカイン発現も分析した (図 1 7) 。休止クローン

50

(106)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

を白血球活性化カクテル (BD Pharmingen) を用い 37℃ で 4 時間刺激した。タンパク質分泌のブロッキングにより細胞内のサイトカインの蓄積を可能にするために、ゴルジプラグ (BD Pharmingen) を添加した。次いで、細胞を洗浄し、メーカーの指示によって Cytotfix / Cytoperm キット (BD Pharmingen) で固定した。細胞内サイトカインは、様々な抗サイトカイン抗体 (BD Pharmingen) を使用して検出し、染色した細胞をフローサイトメトリー分析によって分析した。Th クローンのうちの 2 つは IL-4、IL-13 および IFN γ を発現したが、これは Th₀ のプロファイルと一致している。4 つの Th クローンは Th₂ プロファイルを示した。すなわち、それらは IL-4、IL-5 または IL-13 を発現したが、IFN γ は発現しなかった。2 つの Tc クローンは Tc₀ サイトカイン・プロファイルを示した、また、1 つの Tc クローンは Tc₂ プロファイルを示した。CD4⁺ / CD8⁺ クローンは IL-4、IL-5 および IL-13 を発現したが、IFN γ は発現しなかった。

10

【実施例 12】

【0393】

17. T リンパ球クローンの再刺激が CD30 の発現を誘導した

T リンパ球クローン再活性化の間の CD30 発現について調べた。休止 T リンパ球クローンを、1 または 2 μ g / ml の PHA、被照射 CESS フィーダー細胞 (T : CESS 細胞比 1 : 2 ~ 1 : 10、200 IU / ml の IL-2) で再刺激した。20 ng / ml の IL-4 も Th₂ および Tc₂ クローンに添加した。フローサイトメトリー分析によって CD25 および CD30 の発現をモニターした。図 18 は、代表的な Th クローンと代表的な Tc クローンから得られた結果を示す。すべてのクローンの中で CD25 の広範囲なアップレギュレーションが観察され、これは、2 日目にピークに達した。これは T リンパ球の活性化を示す。CD25 の発現はその日以後は漸減した。CD30 発現の誘導は、CD25 のそれと平行していた。ピーク誘導も刺激の後 2 日目に観察された。発現は、4 日目にもまだ検出できたが、それは漸減して 7 日目にはほとんど基線レベルに落ちた。検討した他の 8 つのクローンも、CD25 および CD30 発現について同様の動力学および大きさを示した (データは示していない)。CD25 および CD30 の両者についての活性化-誘導発現はこれらの T リンパ球クローンの一貫した特徴であった。

20

【実施例 13】

【0394】

18. cAC10 ADC が活性化 T リンパ球クローンの増殖を阻害した

次に、cAC10 ADC に対する T リンパ球クローンの応答を調べた。実施例 12 に記載するようにして休止 T リンパ球クローンを活性化して CD30 を発現させた。活性化後 2 日目に、細胞の一部についてフローサイトメトリーによって CD30 発現を分析し、細胞の活性化と CD30 誘導を確認した。残りの細胞はペレット化し、200 IU / ml の rIL-2 または 200 IU / ml の IL-2、および Th₂ と Tc₂ クローンについては 10 ng / ml の IL-4 を含む新しい培地中に再懸濁した。次いで、細胞を、図 19 および図 20 に示すようにして、cAC10 ADC または非結合 IgG ADC を段階的濃度で含む培地 (最終容積 200 μ l) 中に、10,000 細胞 / ウェルで播種した。細胞をさらに 48 時間または 72 時間インキュベートし、細胞の DNA 合成を評価するために最後の 16 時間は ³H-TdR でパルス処理した。ADC 処理に対する 2 つの Th₂ クローンの応答結果を図 19 および図 20 に示した。0.01 μ g / ml を超える濃度のキメラ cAC10 ADC は、いずれのクローンについても有意に増殖を阻害した。対照 ADC cIgG-fkMMAE は 0.1 μ g / ml 未満の濃度では、有意に増殖を抑制しなかったが、cIgG-vcMMAE では、2 μ g / ml の高濃度でも増殖抑制活性をまったく示さず、cAC10 ADC の抗原特異性が確認された。また、合計 72 時間のインキュベーションでは、48 時間のインキュベーションより顕著な増殖阻害をもたらした。

40

【0395】

次いで、実施例 4 に記載したアネクシン (Annexin) V の結合および PI への細

50

(107)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

胞膜透過性を用いて、c A C 1 0 A D C によって達成された増殖阻害が細胞死によるものかどうかを評価した（図 2 1）。 $1 \mu\text{g} / \text{ml}$ の A D C と共に 4 8 時間のインキュベーションの後、c A C 1 0 - v c M M A E で処理した細胞の 2 7 % はアポトーシスであったかまたは死滅していた。これに対して c I g G - v c M M A E で処理した細胞は 7 ~ 1 4 % であった。c A C 1 0 - f k M M A E 処理した細胞では、c I g G - f k M M A E で処理した細胞の 1 3 % および 3 1 % と比較して、4 4 ~ 4 8 % がアポトーシスであるかまたは死滅していた。これらのデータから、試験した c A C 1 0 A D C が C D 3 0 ⁺ T 細胞クローンに対して細胞傷害性を有することが確認された。

【 0 3 9 6 】

活性化した T リンパ球クローンの増殖に対する c A C 1 0 A D C の影響を分析する過程で、いくつかのクローンは c A C 1 0 - v c M M A E 処理に比較的強いことがわかった（例えば、図 2 2 のうちのクローン 3 . 2 7 . 2 および 4 . 0 1 . 1）。記憶およびナイーブ T 細胞（図 1 3）の中で観察されたものと同様に、c A C 1 0 の A E F P コンジュゲートは、T リンパ球クローンに対して強い阻害活性を示した。この結果、c A C 1 0 - f k A E F P コンジュゲートおよび c A C 1 0 - v c A E F P コンジュゲートは両方とも、 $0 . 0 1 \sim 0 . 1 \mu\text{g} / \text{ml}$ の I C ₅₀ を与えた（これに対し、c A C 1 0 - v c M M A E では $> 1 \mu\text{g} / \text{ml}$ ）。これらのデータは、T リンパ球増殖の標的阻害において様々な c A C 1 0 A D C が有用性を有することをさらに確認するものである。

【実施例 1 4】

【 0 3 9 7 】

1 9 . 抗原刺激された T リンパ球は c A C 1 0 A D C に対してより感受性が高い

図 2 3 は、c A C 1 0 - v c M M A E および c A C 1 0 - v c A E F P が様々なタイプの T リンパ球の増殖を阻害する効果をまとめて示したものである。以下の傾向が観察された。第 1 に、ナイーブ T 細胞は、記憶 T リンパ球または T リンパ球クローンと比較した場合、c A C 1 0 - v c M M A E および c A C 1 0 - v c A E F P の両方に対し最も強いようである。第 2 に、T リンパ球クローンと記憶 T 細胞の間では、1 0 の T リンパ球クローンのうち 8 は記憶 T リンパ球と比較して、c A C 1 0 - v c M M A E より感受性が高いことがわかった。これらのクローンは、炎症性および自己免疫性応答にかかわる慢性的に刺激されたエフェクター T 細胞と同様に、T 細胞受容体およびサイトカインによる多数回の刺激によって増殖していた。第 3 に、C D 4 ⁺ および C D 8 ⁺ T リンパ球クローンのいずれの増殖も、c A C 1 0 A D C に影響を受けやすかった。第 4 に、c A C 1 0 A D C への感受性は、それらのサイトカイン分泌プロファイルによって定義されるような何らかの特定の T リンパ球サブセットに相互に関連するようにも見えなかった。したがって、T h ₀、T h ₂、および T c ₀ クローンおよび T c ₂ の各 1 個と C D 4 ⁺ / C D 8 ⁺ クローンは、c A C 1 0 A D C に感受性を有することがわかった。これらの結果は、c A C 1 0 A D C は、複合的な T リンパ球サブセット（ナイーブ T リンパ球または記憶 T リンパ球、ヘルパー（C D 4 ⁺）または細胞傷害性（C D 8 ⁺）リンパ球を含む）および様々な組合せでサイトカインを分泌するエフェクターリンパ球を標的とするために使用され得ることを示唆する。さらに、免疫疾患の病因に参加するエフェクター T リンパ球は、ナイーブ T 細胞より慢性的に活性化した T リンパ球クローンに生物学上より似ているので、c A C 1 0 A D C は、自己免疫応答、炎症性応答およびアレルギー性応答の病因に含まれる C D 3 0 ⁺ エフェクター T リンパ球の目的とする枯渇に特に適しているかもしれない。

【 0 3 9 8 】

2 0 . 特定の実施形態および参考文献の引用

本発明は本願明細書に記載した特定の実施形態によってその範囲が限定されるものではない。実際、本願明細書に記載したものに加えての本発明の様々な改変は、これまでの記載および添付図面から当業者には明らかであろう。そのような改変は、添付する特許請求の範囲内に含まれる。

【 0 3 9 9 】

本願明細書に引用した、特許出願、特許および学術的な刊行物を含む様々な参考文献の

10

20

30

40

50

(108)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

各開示は、参照によってその全体が本願明細書に組み込まれる。

【図面の簡単な説明】

【0400】

【図1】ジャーカット（J u r k a t）T細胞の上でのC D 3 0の発現を示す図である。ジャーカットT細胞系統について、フローサイトメトリー分析により、C D 3、C D 4、C D 2 8およびC D 3 0の発現を調べた。

【図2】ジャーカットT細胞の増殖に対する抗C D 3 0の影響を示す図である。ジャーカットT細胞を、2次架橋性ヤギ抗ヒト（G A H）F c y 特異的A bの存在と共に（X L c A C 1 0）または存在させずに（c A C 1 0）、段階的投与量のキメラA C 1 0（c A C 1 0）抗C D 3 0 m A bと共にインキュベートした。72時間のインキュベーションの最後の4時間において、トリチウムを含むチミジン（³ H - T d R）のパルスによって増殖を評価した。

10

【図3】抗C D 3 0 m A bの2次架橋によるジャーカットT細胞の増殖阻害を示す図である。ジャーカットT細胞を、2次架橋性ヤギ抗マウス（G A M）F c y 特異的A bの存在下、段階的投与量のA C 1 0またはH e F i - 1 m A bと共にインキュベートした。1次A bと2次A bの比は図中に示すように変えた。48時間のインキュベーションの最後の4時間において、³ H - T d Rのパルスにより増殖を評価した。

【図4】抗C D 3 0 m A bの2次架橋によるジャーカットT細胞のアポトーシス誘導を示す図である。ジャーカットT細胞を、0.8 μ g / m lのG A M 2次A bで架橋したA C 1 0またはH e F i - 1 0.2 μ g / m lで処理した。処理後24時間および48時間の時点で、細胞周期の状態およびD N A合成を、ヨウ化プロピジウム（P I）および抗プロモデオキシウリジン（B r d U）染色によって検出した。

20

【図5】抗C D 3 0 m A bの2次架橋によるジャーカットT細胞のアポトーシス誘導を示す図である。ジャーカットT細胞を、G A M 2次A bで架橋したA C 1 0またはH e F i - 1の段階的投与量で処理した。1次A bと2次A bの濃度比は1：4とした。処理後24時間および48時間の時点で細胞周期の状態およびD N A合成をP Iおよび抗B r d U染色によって検出した。

【図6】抗C D 3 m A bによるジャーカットT細胞の抗C D 3 0誘導アポトーシスの増強効果を示す図である。図中に示す段階的投与量のA C 1 0、抗C D 3 m A b O K T 3または両方のm A bの組合せでジャーカットT細胞を処理した。4倍過剰のG A M 2次A bを用いて1次m A bを架橋した。処理後24時間および48時間の時点で細胞周期の状態およびD N A合成をP Iおよび抗B r d U染色によって検出した。

30

【図7】アネクシン（A n n e x i n）V結合によるジャーカットT細胞の中の抗C D 3 0誘導アポトーシスの検出。ジャーカットT細胞は、A C 1 0、H e F i - 1、抗C D 3 m A b O K T 3、またはA C 1 0もしくはH e F i - 1およびO K T 3の組合せで処理した。抗C D 3 0および抗C D 3 m A bは2 μ g / m lで使用した。G A M 2次A bは1次m A bを架橋するために10倍過剰で使用した。F I T CをコンジュゲートしたアネクシンVの結合は、アポトーシス進行中の細胞の検出を可能にした。P Iへの細胞膜透過性を用いて細胞膜の完全性を失った死細胞を検出した。図中で、アネクシンV⁻ / P I⁻事象は生存細胞（左下四分域）を、アネクシンV⁺ / P I⁻事象はアポトーシス細胞（右下四分域）を、アネクシンV⁺ / P I⁺事象は死細胞（右上四分域）を表す。密度プロットの外の数は、各四分域中に存在する細胞のパーセンテージを表す。

40

【図8】抗体-薬剤コンジュゲート（A D C）であるc A C 1 0 - v c M M A E、c A C 1 0 - f k M M A E、c A C 1 0 - v c A E F Pおよびc A C 1 0 - f k A E F Pの化学構造を示す図である。

【図9】ジャーカットT細胞の増殖に対するc A C 1 0 - v c M M A Eコンジュゲートの増殖抑制効果を示す図である。c A C 1 0 - v c M M A Eコンジュゲートまたは非結合対照I g G（c I g G）- v c M M A Eコンジュゲートを段階的投与量で培養開始時にジャーカットT細胞に加えた。細胞は、合計96時間、A D Cに連続的に暴露した。インキュベーションの最後の16時間に³ H - T d Rのパルスによって増殖を評価した。

50

(109)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

【図10】活性化された正常な末梢血上単核細胞（PBM C）でのC D 3 0誘導を示す図である。正常なドナーから得たPBM Cを、抗C D 3、抗C D 3 + 抗C D 2 8、または培地のみ（ネガティブ・コントロール）で刺激した。0、2、4、6および8日目において細胞を回収した。また、C D 3 0の発現はC D 4細胞（図示）とC D 8細胞（図示していない）の両方について多色フローサイトメトリー分析によって決定した。

【図11】活性化された正常なヒトPBM Cに対するc A C 1 0 A D Cの成長抑制効果を示す図である。正常なドナーから得たPBM Cを、図10に記載するように抗C D 3 + 抗C D 8 m A bで活性化した。図中に示す様々なA D Cの段階的投与量を、培養開始時に細胞に加えた。細胞は、合計48時間または72時間、A D Cに連続的に暴露した。インキュベーションの最後の16時間に³ H - T d Rの取り込みによって増殖を評価した。

10

【図12】記憶およびナイーブT細胞におけるC D 3 0の誘導を示す図である。末梢血Tリンパ球、記憶Tリンパ球およびナイーブTリンパ球を、免疫選択を使用してPBM Cから富化した。次いで、T細胞を、組み換えヒトインターロイキン（r h I L）- 2およびr h I L - 4の両者の存在下、抗C D 3 + 抗C D 2 8 m A bによって72時間活性化した。次いで、C D 4⁺およびC D 8⁺細胞上のC D 3 0発現をフローサイトメトリー分析によって決定した。

【図13】活性化した記憶およびナイーブTリンパ球に対するc A C 1 0 A D Cの成長抑制効果を示す図である。PBM Cから富化した記憶およびナイーブT細胞を誘導して、図12に記載するようにC D 3 0を発現させた。誘導の72時間後にT細胞を回収し、r h I L - 2存在下、図中に示す様々なA D Cの段階的投与量で処理した。細胞は、さらに48時間または72時間、A D Cに連続的に暴露した。インキュベーションの最後の16時間に³ H - T d Rの取り込みによって増殖を評価した。

20

【図14】同種異系細胞によって刺激されたT細胞におけるC D 3 0誘導を示す図である。C D 4富化したPBM Cを、照射された同種異系パーキット（B u r k i t t）リンパ腫D a u d i細胞の連続サイクルで刺激した。C D 4細胞上のC D 3 0の発現は、同種異系刺激細胞の添加後3～5日目および7～9日目に、フローサイトメトリー分析によって決定した。

【図15】Tリンパ球クローンの作製を示す図である。PBM CからのT細胞クローンの生成を模式的に要約した。

【図16】Tリンパ球クローンの表現型を示す図である。図15の中のスキームによる3人の異なる正常なドナーから単離した10種の独立したTリンパ球クローンについて、フローサイトメトリー分析によって、C D 3、C D 4、C D 8、C D 2 8およびC D 3 0の表面発現を調べた。2つの代表的なクローンから得たヒストグラムを示す。また、フローサイトメトリー分析から得られた平均蛍光強度によって示される10クローンすべてにおける受容体発現レベルを表にして示す。

30

【図17】Tリンパ球クローンによるサイトカイン発現を示す図である。図16に示したTリンパ球クローンを、フローサイトメトリー分析によって、I L - 2、4、5、13、I F N γ およびT N F α 発現能力について調べた。2つの代表的なクローンから得たヒストグラムを示す。また、フローサイトメトリー分析から得られた平均蛍光強度によって示される10クローンすべてにおけるサイトカイン発現のレベルを表にして示す。表の最下

40

【図18】Tリンパ球クローンの刺激によるC D 3 0のアップレギュレーションを示す図である。図16および17に示したパネル中の休止T h ₂ クローンおよび休止T c ₂ クローンを、フィトヘムアグチニン（P H A）、照射されたフィーダー細胞、I L - 2およびI L - 4で刺激した。0、2、4および7日目におけるC D 2 5およびC D 3 0発現を、フローサイトメトリー分析によって決定した。

【図19】Tリンパ球クローン40E10に対するc A C 1 0 A D Cの成長抑制効果を示す図である。40E10細胞は、図18に記載するようにしてC D 3 0発現を誘導した。活性化2日目のC D 3 0発現のピーク時に細胞を回収し、r h I L - 2およびr h I L

50

(110)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

- 4 存在下、図中に示す様々な段階的濃度の A D C で処理した。細胞は、さらに 48 時間または 72 時間、A D C に連続的に暴露した。インキュベーションの最後の 16 時間に ³ H - T d R の取り込みによって増殖を評価した。

【図 20】T リンパ球クローン 40 H 7 に対する c A C 10 A D C の成長抑制効果を示す図である。40 H 7 細胞は、図 18 に記載するようにして C D 30 発現を誘導した。活性化 2 日目の C D 30 発現のピーク時に細胞を回収し、r h I L - 2 および r h I L - 4 存在下、図中に示す様々な段階的濃度の A D C で処理した。細胞は、さらに 48 時間または 72 時間、A D C に連続的に暴露した。インキュベーションの最後の 16 時間に ³ H - T d R のパルスによって増殖を評価した。

【図 21】c A C 10 A D C によって誘導された T 細胞クローン中の増殖抑制には、アポトーシス誘導が伴うことを示す図である。クローン 40 E 10 および 40 H 7 を、図中に示す様々な A D C 1 μ g / m l と共にインキュベートした。インキュベーション 48 時間後に、アネクシン V 結合および P I の透過性を用いてアポトーシス誘導の程度を評価した。

【図 22】T リンパ球クローン 3 . 2 7 . 2 と 4 . 0 1 . 1 に対する c A C 10 A D C の成長抑制効果を示す図である。3 . 2 7 . 2 および 4 . 0 1 . 1 細胞では、図 18 に記載するようにして C D 30 発現が誘導された。活性化 2 日目の C D 30 発現のピーク時に細胞を回収し、r h I L - 2 存在下、図中に示す様々な段階的濃度の A D C で処理した。細胞は、さらに 72 時間、A D C に連続的に暴露した。インキュベーションの最後の 4 時間に ³ H - T d R のパルスによって増殖を評価した。

【図 23】C D 30 + T リンパ球クローンおよび活性化された正常な T リンパ球の増殖を抑制する c A C 10 A D C の効果を要約して示す図である。

【配列表】

10

20

(111)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

SEQUENCE LISTING

110> SEATTLE GENETICS, INC.

Law, Che-Leung
Klussman, Kerry
Wahl, Alan
Senter, Peter
Doronina, Svetlana
Toki, Brian<120> TREATMENT OF IMMUNOLOGICAL DISORDERS USING
ANTI-CD30 ANTIBODIES

<130> 9632-077-228

<140>

<141>

<150> 60/331,750

<151> 2001-11-20

<160> 33

<170> FastSEQ for Windows Version 3.0

<210> 1

<211> 351

<212> DNA

<213> Mus musculus

<220>

<221> CDS

<222> (1)...(351)

<400> 1

cag atc cag ctg	cag cag tct gga cct gag gtg	gtg aag cct ggg gct	48
Gln Ile Gln Leu	Gln Gln Ser Gly Pro Glu Val	Val Lys Pro Gly Ala	
1	5	10 15	
tca gtg aag ata	tcc tgc aag gct tct ggc tac	acc ttc act gac tac	96
Ser Val Lys Ile	Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr	Phe Thr Asp Tyr	
20	25	30	
tat ata acc tgg	gtg aag cag aag cct gga cag gga	ctt gag tgg att	144
Tyr Ile Thr Trp	Val Lys Gln Lys Pro Gly Gln Gly	Leu Glu Trp Ile	
35	40	45	
gga tgg att tat	cct gga agc ggt aat act aag tac	aat gag aag ttc	192
Gly Trp Ile Tyr	Pro Gly Ser Gly Asn Thr Lys Tyr	Asn Glu Lys Phe	
50	55	60	
aag ggc aag gcc	aca ttg act gta gac aca tcc	tcc agc aca gcc ttc	240
Lys Gly Lys Ala	Thr Leu Thr Val Asp Thr Ser	Ser Ser Thr Ala Phe	
65	70	75 80	
atg cag ctc agc	agc ctg aca tct gag gac act gct	gtc tat ttc tgt	288
Met Gln Leu Ser	Ser Leu Thr Ser Glu Asp Thr	Ala Val Tyr Phe Cys	
85	90	95	
gag aac tat ggt	aac tac tgg ttt gct tac tgg	ggc caa ggg act cag	336
Ala Asn Tyr Gly	Asn Tyr Trp Phe Ala Tyr Trp	Gly Gln Gly Thr Gln	
100	105	110	

10

20

30

40

(112)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

gtc act gtc tot gca
Val Thr Val Ser Ala
115

351

<210> 2
<211> 117
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 2
Gln Ile Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Val Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15
Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
20 25 30
Tyr Ile Thr Trp Val Lys Gln Lys Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45
Gly Trp Ile Tyr Pro Gly Ser Gly Asn Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe
50 55 60
Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Thr Ser Ser Thr Ala Phe
65 70 75 80
Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95
Ala Asn Tyr Gly Asn Tyr Trp Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Gln
100 105 110
Val Thr Val Ser Ala
115

10

<210> 3
<211> 15
<212> DNA
<213> Mus musculus

20

<400> 3
gactactata taacc

15

<210> 4
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 4
Asp Tyr Tyr Ile Thr
1 5

<210> 5
<211> 51
<212> DNA
<213> Mus musculus

30

<400> 5
tggatttatc ctggaagcgg taatactaag tacaatgaga agttcaaggg c

51

<210> 6
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 6

(113)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

Trp Ile Tyr Pro Gly Ser Gly Asn Thr Lys Tyr Asn Glu Lys Phe Lys
 1 5 10 15
 Gly

<210> 7
 <211> 24
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 7
 tatggtaact actggtttgc ttac

24

<210> 8
 <211> 8
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

10

<400> 8
 Tyr Gly Asn Tyr Trp Phe Ala Tyr
 1 5

<210> 9
 <211> 333
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<220>
 <221> CDS
 <222> (1)...(333)

<400> 9
 gac att gtg ctg acc caa tot cca got tct ttg gct gtg tct cta ggg
 Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
 1 5 10 15

48

cag agg gcc acc atc tcc tgc aag gcc agc caa agt gtt gat ttt gat
 Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Phe Asp
 20 25 30

96

ggt gat agt tat atg aac tgg tac caa cag aaa cca gga cag cca ccc
 Gly Asp Ser Tyr Met Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro
 35 40 45

144

aaa gtc ctc atc tat gct gca tcc aat cta gaa tct ggg atc cca gcc
 Lys Val Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Ile Pro Ala
 50 55 60

192

agg ttt agt ggc agt ggg tct ggg aca gac ttc acc ctc aac atc cat
 Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His
 65 70 75 80

240

cct gtg gag gag gag gat gct gca acc tat tac tgt cag caa agt aat
 Pro Val Glu Glu Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn
 85 90 95

288

gag gat ccg tgg acg ttc ggt gga ggc acc aag ctg gaa atc aaa
 Glu Asp Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

333

<210> 10

20

30

(114)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

```

<211> 111
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 10
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
1      5      10      15
Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Phe Asp
20     25     30
Gly Asp Ser Tyr Met Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro
35     40     45
Lys Val Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Ile Pro Ala
50     55     60
Arg Phe Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His
65     70     75     80
Pro Val Glu Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn
85     90     95
Glu Asp Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100    105    110

<210> 11
<211> 45
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 11
aaggccagcc aaagtgttga ttttgatggt gatagttata tgaac
45

<210> 12
<211> 15
<212> PRT
<213> Mus musculus
20

<400> 12
Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Phe Asp Gly Asp Ser Tyr Met Asn
1      5      10      15

<210> 13
<211> 21
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 13
gctgcatcca atctagaatc t
21

<210> 14
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus
30

<400> 14
Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser
1      5

<210> 15
<211> 27
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 15
cagcaaagta atgaggatcc gtggacy
27

```

(115)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

```

<210> 16
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 16
Gln Gln Ser Asn Glu Asp Pro Trp Thr
1 5

<210> 17
<211> 375
<212> DNA
<213> Mus musculus

<220>
<221> CDS
<222> (1)...(375)
10

<400> 17
gag gtg aag ctg gtg gag tct gga gga ggc ttg gta cag cct ggg ggt 48
Gln Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1 5 10 15

tct ctg aga ctc tcc tgt gca act tct ggg ttc acc ttc agt gat tac 96
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Thr Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Tyr
20 25 30

tat atg aac tgg gtc cgc cag cct cca gga aag gct ctt gag tgg ttg 144
Tyr Met Asn Trp Val Arg Gln Pro Pro Gly Lys Ala Leu Glu Trp Leu
35 40 45

ggt ttt att aga aac aaa gct aat ggt tac aca aca gag ttc agt gca 192
Gly Phe Ile Arg Asn Lys Ala Asn Gly Tyr Thr Thr Glu Phe Ser Ala
50 55 60
20

tct gtg atg ggt cgg ttc acc atc tcc aga gat gat tcc caa agc atc 240
Ser Val Met Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Gln Ser Ile
65 70 75 80

ctc tat ctt cag atg aac acc ctg aga gct gag gac agt gcc act tat 288
Leu Tyr Leu Gln Met Asn Thr Leu Arg Ala Glu Asp Ser Ala Thr Tyr
85 90 95

tac tgt gca aga gat ccc ccc tat ggt aac ccc cat tat tat gct atg 336
Tyr Cys Ala Arg Asp Pro Pro Tyr Gly Asn Pro His Tyr Tyr Ala Met
100 105 110

gac tac tgg ggt caa gga acc tca gtc acc gtc tcc tca 375
Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
115 120 125
30

<210> 18
<211> 125
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 18
Glu Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1 5 10 15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Thr Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Tyr
20 25 30

```

(116)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

```

Tyr Met Asn Trp Val Arg Gln Pro Pro Gly Lys Ala Leu Glu Trp Leu
      35      40      45
Gly Phe Ile Arg Asn Lys Ala Asn Gly Tyr Thr Thr Glu Phe Ser Ala
      50      55      60
Ser Val Met Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Gln Ser Ile
      65      70      75      80
Leu Tyr Leu Gln Met Asn Thr Leu Arg Ala Glu Asp Ser Ala Thr Tyr
      85      90      95
Tyr Cys Ala Arg Asp Pro Pro Tyr Gly Asn Pro His Tyr Tyr Ala Met
      100      105      110
Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
      115      120      125

```

```

<210> 19
<211> 15
<212> DNA
<213> Mus musculus

```

10

```

<400> 19
gattactata tgaac

```

15

```

<210> 20
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

```

```

<400> 20
Asp Tyr Tyr Met Asn
1      5

```

```

<210> 21
<211> 57
<212> DNA
<213> Mus musculus

```

20

```

<400> 21
tttattagaa acaaagctaa tggttacaca acagagttca gtgcacatctgt gatgggt

```

57

```

<210> 22
<211> 19
<212> PRT
<213> Mus musculus

```

```

<400> 22
Phe Ile Arg Asn Lys Ala Asn Gly Tyr Thr Thr Glu Phe Ser Ala Ser
1      5      10      15
Val Met Gly

```

30

```

<210> 23
<211> 42
<212> DNA
<213> Mus musculus

```

```

<400> 23
gatccccct atggtaacc ccattattat gctatggact ac

```

42

```

<210> 24
<211> 14
<212> PRT
<213> Mus musculus

```

(117)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

```

<400> 24
Asp Pro Pro Tyr Gly Asn Pro His Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr
 1           5           10

<210> 25
<211> 333
<212> DNA
<213> Mus musculus

<220>
<221> CDS
<222> (1)...(333)

<400> 25
gac att gtc ctg acc cag tct cct gct tcc tta gct gtt tct ctg ggg      48
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly      10
 1           5           10           15

cag agg gcc acc atc tca tgc agg gcc agc aaa agt gtc agt gca tct      96
Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Lys Ser Val Ser Ala Ser
      20           25           30

ggc tat aat tat atg cac tgg tac caa cag aaa gca ggg cag cca ccc      144
Gly Tyr Asn Tyr Met His Trp Tyr Gln Gln Lys Ala Gly Gln Pro Pro
      35           40           45

aaa ctc ctc atc cat ctt gca tcc aac cta gaa tct ggg gtc cct gcc      192
Lys Leu Leu Ile His Leu Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
      50           55           60

agg ttc agt gcc agt ggg tct ggg aca gac ttc acc ctc aac atc cat      240
Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His      20
      65           70           75           80

cct gtg gag gag gag gat gct tca acc tat tac tgt cag cac agt ggg      288
Pro Val Glu Glu Glu Asp Ala Ser Thr Tyr Tyr Cys Gln His Ser Gly
      85           90           95

gag ctt cca ttc acg ttc gcc tgc ggg aca aag ttg gaa ata aaa      333
Glu Leu Pro Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
      100           105           110

<210> 26
<211> 111
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 26
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
 1           5           10           15
Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Lys Ser Val Ser Ala Ser
      20           25           30
Gly Tyr Asn Tyr Met His Trp Tyr Gln Gln Lys Ala Gly Gln Pro Pro
      35           40           45
Lys Leu Leu Ile His Leu Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
      50           55           60
Arg Phe Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His
      65           70           75           80
Pro Val Glu Glu Glu Asp Ala Ser Thr Tyr Tyr Cys Gln His Ser Gly
      85           90           95
Glu Leu Pro Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys

```

(118)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

```

100                                105                                110
<210> 27
<211> 45
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 27
aggggccagca aaagtgtcag tgcattctggc tataattata tgcac
45

<210> 28
<211> 15
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 28
Arg Ala Ser Lys Ser Val Ser Ala Ser Gly Tyr Asn Tyr Met His
1      5      10      15
10

<210> 29
<211> 21
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 29
cttgcattcca acctagaatc t
21

<210> 30
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 30
Leu Ala Ser Asn Leu Glu Ser
1      5
20

<210> 31
<211> 27
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 31
cagcacagtg gggagcttcc attcagc
27

<210> 32
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 32
Gln His Ser Gly Glu Leu Pro Phe Thr
1      5
30

<210> 33
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial


<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 33
agttgagggg accttcccag gc
22


```

(119) J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28


【 図 1 】




【 図 2 】




【 図 3 】




【 図 4 】




【 図 5 】




【 図 6 】



【 図 7 】




【 図 8 】





(121) J P 2005-511627 A 2005.4.28


【 図 9 】




【 図 11 】




【 図 10 】




【 図 12 】




【 図 1 3 】




【 図 1 4 】



【 図 1 5 】




【 図 1 6 】




平均蛍光強度											
	3:27.2	4.01.1	20G5	40E10	40H7	C2A	C9D	C5H	C7A		
IgG	5	4	6	4	4	4	3	3	3		
CD30	6	6	10	8	8	8	6	6	4		
CD3	281	203	209	223	224	121	137	135	164		
CD4	187	202	168	137	142	150	4	3	4		
CD8	5	4	5	4	3	4	192	422	98		
CD28	24	38	37	35	44	46	20	16	10		


【 図 1 7 】




【 図 1 8 】




【 図 1 9 】




【 図 2 0 】



【 図 2 1 】



【 図 2 2 】



【 図 2 3 】

下細胞クロールン または正當T細胞	表型型	サイトカイン・ プロファイル	IC50 (ug/ml)	
			CAC10-vdMAE	CAC10-vdMAE
3.27.2	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-5, IL-13, IFN γ	3.8	0.07
4.01.1	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-5, IL-13, IFN γ	2.5	0.01
20G5	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-13	0.006	0.003
40D8	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-13	0.005	0.003
40E10	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-13	0.01	n.d.
40H17	CD3, CD4, CD30	IL-4, IL-13	0.009	n.d.
C1A	CD3, CD8, CD30	IL-4, IL-13, IFN γ	0.83	0.2
C9D	CD3, CD8, CD30	IL-13, IFN γ	0.005	n.d.
C5H	CD3, CD8, CD30	IL-5, IL-13	0.037	n.d.
C7A	CD3, CD4/CD8, CD30	IL-5, IL-13	0.32	n.d.
ナイーブT細胞	CD3, CD4, CD8, CD30		>2	1.3
記憶T細胞	CD3, CD4, CD8, CD30		1	0.09

n.d. = 測定せず

(125)

J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US02/37223
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) : A61K 39/395 US CL : 424/143.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 424/143.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WEST, STN and MEDLINE		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	HANEKOM et al. Plasma-soluble CD30 in childhood tuberculosis: effects of disease severity, nutritional status, and vitamin A therapy. Clin. Diagn. Lab. Immunol. March 1999, Vol. 6, No. 2, pages 204-208.	1-210
A	OKUMURA et al. Increased Serum Concentration of Soluble CD30 in Patients with Graves' Disease and Hashimoto's Thyroiditis. J. Clin. Endocrinol. Metab. June 1997, Vol. 82, No. 6, pages 1757-1760.	1-210
A	KRAMS et al. Elevations in IFN-gamma, IL-5, and IL-10 in patients with the autoimmune disease primary biliary cirrhosis: association with autoantibodies and soluble CD30. Clin. Immunol. Immunopathol. September 1996, Vol. 80, No. 3, pages 311-320.	1-210
A	GERLI et al. Soluble CD30 in early rheumatoid arthritis as a predictor of good response to second-line therapy. Rheumatology (Oxford). December 1999, Vol. 38, No. 12, pages 1282-1284.	1-210
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to underscore the principle or theory underlying the invention
"B"	earlier application or patent published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 16 July 2004 (16.07.2004)		Date of mailing of the international search report 11 AUG 2004
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (703) 872-9306		Authorized officer Maher M. Haddad <i>M. Roberts for</i> Telephone No. (571) 272-1600

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

(126)

J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/US02/37223

C. (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ICHIKAWA et al. Circulating soluble CD30 levels in primary Sjogren's syndrome, SLE and rheumatoid arthritis. Clin. Exp. Rheumatol. 1998, Vol. 16, No. 6, pages 759-760.	1-210
A	WANG et al. High plasma levels of the soluble form of CD30 activation molecule reflect disease activity in patients with Wegener's granulomatosis. Am J Med. June 1997, Vol. 102, No. 6, pages 517-523.	1-210
A	PIZZOLÒ et al. High serum level of the soluble form of CD30 molecule in the early phase of HIV-1 infection as an independent predictor of progression to AIDS. AIDS. 1994, Vol. 8, No. 6, pages 741-745.	1-210
A	WO 03/059282 A2 (MEDAREX, INC.) 24 July 2003 (24.07.2003), entire document.	1-210

(127)

J P 2005-511627 A 2005.4.28

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
A 6 1 P 5/14	A 6 1 K 48/00	
A 6 1 P 11/06	A 6 1 P 1/16	
A 6 1 P 17/00	A 6 1 P 5/14	
A 6 1 P 17/06	A 6 1 P 11/06	
A 6 1 P 19/02	A 6 1 P 17/00	
A 6 1 P 25/00	A 6 1 P 17/06	
A 6 1 P 27/14	A 6 1 P 19/02	
A 6 1 P 27/16	A 6 1 P 25/00	
A 6 1 P 29/00	A 6 1 P 27/14	
A 6 1 P 31/12	A 6 1 P 27/16	
A 6 1 P 35/00	A 6 1 P 29/00	
A 6 1 P 37/02	A 6 1 P 29/00	1 0 1
	A 6 1 P 31/12	
	A 6 1 P 35/00	
	A 6 1 P 37/02	
	A 6 1 K 37/02	

(81) 指定国 AP(GH GM KE, LS, MW, NZ, SD, SL, SZ, TZ, UG ZM ZW), EA(AM AZ, BY, KG KZ, MD RU TJ, TM), EP(AT, BE, BG CH CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU MC, NL, PT, SE, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG CI, CM GA, GN GQ GW ML, MR, NE, SN TD, TG), AE, AG AL, AM AT, AU AZ, BA, BB, BG BR, BY, BZ, CA, CH CN CQ CR, CU, CZ, DE, DK, DM DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH GM HR, HU ID, IL, IN IS, JP, KE, KG KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG MK, MN, MW, MX, NZ, NQ, NZ, OM PH, PL, PT, RQ RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 ロー, チェー リュン

アメリカ合衆国 9 8 1 3 3 ワシントン州, ノース ショアーライン, フレモント アベニュー
1 8 8 3 4

(72) 発明者 クルスマン, ケリー

アメリカ合衆国 9 8 1 0 3 ワシントン州, シアトル, ナンバー 2 0 8, インターレイク アベ
ニュー ノース 4 8 1 4

(72) 発明者 ウォール, アラン, エフ.

アメリカ合衆国 9 8 0 2 0 ワシントン州, マーサー アイランド, イースト マーサー ウェ
イ 6 1 5 0

(72) 発明者 センター, ピーター

アメリカ合衆国 9 8 1 1 5 ワシントン州, シアトル, 4 0 ティーエイチ アベニュー エヌイ
ー 9 0 0 0

(72) 発明者 ドロニナ, スヴェトラナ

アメリカ合衆国 9 8 2 9 6 ワシントン州, シアトル, エス. イー., 1 9 8 ティーエイチ ブ
レイス 1 0 9 1 0

(72) 発明者 トキ, ブライアン

アメリカ合衆国 9 8 2 0 8 ワシントン州, エヴェレット, エス. イー., 1 エスティー アベ
ニュー 9 8 0 7

F ターム(参考) 4C084 AA02 AA06 AA07 AA13 BA01 BA08 BA18 BA19 BA21 BA23
CA23 CA25 DA01 MA01 NA14 ZA012 ZA332 ZA342 ZA592 ZA752
ZA892 ZA942 ZA962 ZB022 ZB052 ZB072 ZB112 ZB132 ZB152 ZB212
ZB262 ZB332
4C085 AA13 AA14 AA21 AA23 AA25 BB01 BB41 BB42 BB43 BB44
CC32 DD88 EE01 GG01

(128)

J P 2005- 511627 A 2005. 4. 28

4C086	AA01	AA02	AA03	AA04	EA16	MA01	MA04	NA14	ZA01	ZA33
	ZA34	ZA59	ZA75	ZA89	ZA94	ZA96	ZB02	ZB05	ZB07	ZB11
	ZB13	ZB15	ZB21	ZB26	ZB33					

J P 2006-511526 A 2006.4.6

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2006-511526**(P2006-511526A)**(43) 公表日 **平成18年4月6日(2006.4.6)**

(51) Int. Cl.		F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 47/48 (2006.01)		A 6 1 K 47/48	4 C O 7 6
A 6 1 K 47/20 (2006.01)		A 6 1 K 47/20	4 C O 8 5
A 6 1 K 47/42 (2006.01)		A 6 1 K 47/42	4 C O 8 6
A 6 1 K 47/22 (2006.01)		A 6 1 K 47/22	
A 6 1 K 31/4745 (2006.01)		A 6 1 K 31/4745	
		審査請求 未請求 予備審査請求 未請求	(全 31 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2004-559895 (P2004-559895)	(71) 出願人	504149971
(86) (22) 出願日	平成15年12月15日 (2003.12.15)		イミューノメディクス、インコーポレイテッド
(85) 翻訳文提出日	平成17年8月15日 (2005.8.15)		IMMUNOMEDICS, INC.
(86) 国際出願番号	PCT/GB2003/005454		アメリカ合衆国ニュージャージー州、モリス、ブレインズ、アメリカン、ロード、300
(87) 国際公開番号	W02004/054622	(74) 代理人	100075812
(87) 国際公開日	平成16年7月1日 (2004.7.1)		弁理士 吉武 賢次
(31) 優先権主張番号	60/433,017	(74) 代理人	100091487
(32) 優先日	平成14年12月13日 (2002.12.13)		弁理士 中村 行幸
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(74) 代理人	100094640
			弁理士 紺野 昭男
		(74) 代理人	100107342
			弁理士 横田 修孝
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 細胞内で開裂可能な結合を有する免疫接合体

(57) 【要約】

本発明は、ターゲッティング残基と治療残基を含む様々な癌細胞をターゲットするための改善された能力を有する治療接合体に関する。ターゲッティングと治療残基とは、免疫接合体の治療効力を増強する酸開裂可能な結合を介して結合している。

(2)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(a) ターゲッティング残基、
(b) 化学療法薬残基、および
(c) チオール基を介してターゲッティング残基へ結合し、かつヒドラゾン以外の細胞内で開裂可能な残基を介して化学療法薬残基へ結合するリンカーを含んでなる、免疫接合体。

【請求項 2】

前記細胞内で開裂可能な残基が、細胞内エステラーゼによって開裂可能なものである、請求項 1 に記載の免疫接合体。

10

【請求項 3】

前記細胞内で開裂可能な残基がエステル残基である、請求項 1 または 2 に記載の免疫接合体。

【請求項 4】

前記エステル残基が、アミノ酸の α -カルボン酸から形成されるエステルである、請求項 3 に記載の免疫接合体。

【請求項 5】

前記細胞内で開裂可能な残基が、細胞内酵素によって開裂可能なペプチド結合を含んでなるものである、請求項 1 に記載の免疫接合体。

【請求項 6】

前記細胞内で開裂可能な残基が、酸性 pH にて細胞内コンパートメントの開裂を受けやすいエーテル結合を含んでなるものである、請求項 1 に記載の免疫接合体。

20

【請求項 7】

前記エーテル結合が、化学療法薬と前記細胞内で開裂可能な残基との間で形成されるエーテル結合である、請求項 6 に記載の免疫接合体。

【請求項 8】

前記細胞内で開裂可能な残基が、テトラヒドロピラン残基、テトラヒドロフラン残基、またはオルソエステル残基を含んでなるものである、請求項 7 に記載の免疫接合体。

【請求項 9】

前記リンカーが、前記ターゲッティング残基のチオール基に結合するチオール反応性基を含んでなるものである、請求項 1 に記載の免疫接合体。

30

【請求項 10】

前記チオール反応性基が、ターゲッティング残基のチオール基に結合するマレイミドまたはビニルスルホンである、請求項 9 に記載の免疫接合体。

【請求項 11】

前記リンカーが、前記ターゲッティング残基のリシン側鎖のマレイミド残基と反応するチオール基を含んでなるものである、請求項 1 に記載の免疫接合体。

【請求項 12】

前記化学療法薬残基とターゲッティング残基との間に、水可溶化残基をさらに含んでなる、請求項 1 ~ 11 のいずれか一項に記載の免疫接合体。

40

【請求項 13】

前記水可溶化残基がアミノポリカルボキシレートである、請求項 12 に記載の免疫接合体。

【請求項 14】

前記アミノポリカルボキシレートが、DTPA、EDTA、TTHA、ベンジル-DTPA、DOTA、ベンジル-DOTA、NOTA、ベンジル-NOTA、TETA、およびN,N'-ジアルキル置換ピペラジンからなる群から選択される、請求項 13 に記載の免疫接合体。

【請求項 15】

前記化学療法薬残基が、ドキソルビシン(DOX)、エピルビシン、モルホリノドキソルビシン(モルホリノ-DOX)、シアノモルホリノ-ドキソルビシン(シアノモルホリノ-DOX)、2-

50

(3)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

ピロリノ-ドキソルピシン(2-PDOX)、CPT、CPT-11、SN-38、トポテカン、タキサン、ゲルダナマイシン、アンサマイシン、およびエボチロンからなる群から選択されるものである、請求項1～14のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項16】

前記ターゲッティング残基が、抗体、またはその断片と結合する抗原である、請求項1～15のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項17】

前記抗体がモノクローナル抗体(mAb)である、請求項16に記載の免疫接合体。

【請求項18】

前記抗体が、多価および/または多重特異性であるモノクローナル抗体である、請求項17に記載の免疫接合体。 10

【請求項19】

前記ターゲッティング残基がネズミ、キメラ、ヒト化、またはヒトモノクローナル抗体であり、前記抗体が完全な、断片(Fab、Fab'、F(ab)₂、F(ab')₂)または小断片(一本鎖構築物)形態である、請求項1～18のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項20】

前記ターゲッティング残基が、癌または悪性細胞上で発現した、抗原または抗原のエピトープと反応性のモノクローナル抗体である、請求項1～19のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項21】

前記癌細胞が、造血腫瘍、癌、肉腫、黒色腫、またはグリア腫瘍由来の細胞である、請求項20に記載の免疫接合体。 20

【請求項22】

前記ターゲッティング残基が、B細胞系抗原、T細胞系抗原、骨髄系抗原、およびHLA-DR抗原に結合するモノクローナル抗体である、請求項1～19のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項23】

前記ターゲッティング残基が、CD74、CD22、上皮糖タンパク質-1、MUC1、癌胎児性抗原(CEAまたはCD66e)、結腸特異性抗原-p、α-フェトプロテイン、CC49、前立腺特異性膜抗原、カルボニックアンヒドラーゼIX、HER-2/neu、BrE3、CD19、CD20、CD21、CD23、CD33、CD45、CD74、CD80、VEGF、EGF受容体、P1GF、MUC2、MUC3、MUC4、ガングリオシド、HCG、EGP-2、CD37、HLA-DR、CD30、Ia、A3、A33、Ep-CAM、KS-1、Le(y)、S100、PSA、テネイシン、葉酸受容体、Thomas-Friedreich抗原、腫瘍壊死抗原、腫瘍血管新生抗原、Ga 733、IL-2、IL-6、T101、MAGE、L243に結合する抗原、CD66a-d(それぞれ、BGP、CGM5、NCAおよびCGM1)、抗TAC、およびそれらの組合せからなる群から選択される抗原に結合するモノクローナル抗体である、請求項1～19のいずれか一項に記載の免疫接合体。 30

【請求項24】

前記ターゲッティング残基が、LL1、LL2、hA20、1F5、L243、RS7、PAM 4、MN-14、Mu-9、AFP-31、G250、J591、CC49、およびImmu 31からなる群から選択されるものである、請求項1～19のいずれか一項に記載の免疫接合体。 40

【請求項25】

前記ターゲッティング残基が、LL1、LL2、hA20、1F5、L243、RS7、PAM 4、MN-14、Mu-9、AFP-31、G250、J591、CC49、およびImmu 31からなる群から選択される1種類以上の抗体を含んでなる二重特異性および/または二価抗体構築物である、請求項1～19のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項26】

前記ターゲッティング残基が少なくとも1つの化学療法薬残基に結合するものである、請求項1～25のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項27】

前記ターゲッティング残基が約7～12個の前記化学療法薬残基に結合するものである 50

(4)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

、請求項 26 に記載の免疫接合体。

【請求項 28】

前記リンカーが、ターゲッティング残基に結合するためのそのN末端におけるチオール反応性残基と、少なくとも 1 つの化学療法薬残基に結合するための 1 以上の側鎖アミノ基を含むペプチドを含んでなる、請求項 1 ~ 27 のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項 29】

前記リンカーが、N末端における官能基と、C末端における水可溶化残基と、前記化学療法薬残基に結合するのに利用可能な側鎖を有する 1 以上の内部塩基性アミノ酸とを含んでなる、請求項 1 ~ 28 のいずれか一項に記載の免疫接合体。


【請求項 30】

前記水可溶化残基が、DTPA、EDTA、TTHA、ベンジル-DTPA、DOTA、ベンジル-DOTA、NOTA、ベンジル-NOTA、またはN,N'-ジアルキル置換ピペラジンである、請求項 29 に記載の免疫接合体。

【請求項 31】

前記リンカーが、下式に示されるものである、請求項 1 ~ 30 のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【化 1】



【請求項 32】

前記免疫接合体が非経口投与に適した形態とされた、請求項 1 ~ 31 のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項 33】

前記化学療法薬残基が、ドキソルピシン(DOX)、エピルピシン、モルホリノドキソルピシン(モルホリノ-DOX)、シアノモルホリノ-ドキソルピシン(シアノモルホリノ-DOX)、2-ピロリノ-ドキソルピシン(2-PDOX)、CPT、CPT-11、SN-38、トポテカン、タキサン、ゲルダナマイシン、アンサマイシン、およびエボチロンからなる群から選択される、請求項 1 ~ 32 のいずれか一項に記載の免疫接合体。

【請求項 34】

患者の悪性腫瘍、自己免疫疾患、感染症、または感染性病変の治療のための、請求項 1 ~ 33 のいずれか一項に記載の免疫接合体の治療上有効量の使用。

【請求項 35】

前記悪性腫瘍が悪性固形腫瘍または造血新生物である、請求項 34 に記載の使用。

【請求項 36】

前記免疫接合体が、前記感染症または感染性病変と関連した病原体上の抗原またはエプिटープまたは鉄-シデロフォアキレート受容体をターゲットとする、請求項 34 に記載の使用。

【請求項 37】

前記病原体が、細菌、真菌、ウイルス、リケッチア、マイコプラズマ、および原生動物からなる群から選択される、請求項 36 に記載の使用。

【請求項 38】

前記病原体が、*Streptococcus agalactiae*、*Legionella pneumophila*、*Streptococcus pyogenes*、*Escherichia coli*、*Neisseria gonorrhoeae*、*Neisseria meningitidis*、*Pneumococcus*、*Hemophilus influenzae* B、*Treponema pallidum* ライム病スピロヘータ、*Pseudomonas aeruginosa*、*Mycobacterium leprae*、*Brucella abortus*、*Mycobacterium tuberculosis*、狂犬病ウイルス、インフルエンザウイルス、サイトメガロウイルス、単純ヘルペスウイルスI、単純ヘルペスウイルスII、ヒト血清パルボ様ウイルス、呼吸器シンシチウムウイルス、帯状疱疹ウイルス、B型肝炎ウイルス、麻疹ウイルス、アデノウイルス、

10

20

30

40

50

(5)

JP 2006-511526 A 2006.4.6

ヒトT細胞白血病ウイルス、エプスタイン-バーウイルス、ネズミ白血病ウイルス、耳下腺炎ウイルス、水疱性口内炎ウイルス、シンドビスウイルス、リンパ球脈絡髄膜炎ウイルス、疣ウイルス、ブルータングウイルス、センダイウイルス、ネコ白血病ウイルス、レオウイルス、ポリオウイルス、シミアンウイルス40、マウス乳癌ウイルス、デングウイルス、風疹ウイルス、*Plasmodium falciparum* *Plasmodium vivax*、*Toxoplasma gondii*、*Trypanosoma rangeli*、*Trypanosoma cruzi*、*Trypanosoma rhodesiense*、*Trypanosoma brucei*、*Schistosoma mansoni*、*Schistosoma japonicum*、*Babesia bovis*、*Elmeria tenella*、*Onchocerca volvulus*、*Leishmania tropica*、*Trichinella spiralis*、*Theileria parva*、*Taenia hydatigena*、*Taenia ovis*、*Taenia saginata*、*Echinococcus granulosus*、*Mesocostoides corti*、*Mycoplasma arthritidis*、*M. hyorhini*、*M. orale*、*M. arginini*、*Acholeplasma laidlawii*、*M. salivarium* および *M. pneumoniae* からなる群から選択される、請求項36に記載の使用。

【請求項39】

前記自己免疫疾患がクラスIIIの自己免疫疾患である、請求項34に記載の使用。

【請求項40】

前記クラスIIIの自己免疫疾患が、免疫依存性血小板減少症、皮膚筋炎、シェーグレン症候群、多発性硬化症、シデナム舞蹈病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、リウマチ熱、慢性関節リウマチ、多腺性症候群、水疱性類天疱瘡、糖尿病、ヘノッホ・シェーンライン紫斑病、連鎖球菌感染後腎炎 (*post-streptococcal nephritis*)、結節性紅斑、高安動脈炎、アジソン病、慢性関節リウマチ、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、多形性紅斑、IgA腎症、結節性多発性動脈炎、強直性脊椎炎、グットパスチャー症候群、血栓性血管炎 (*thromboangitis obliterans*)、原発性胆汁性肝硬変、橋本甲状腺炎、甲状腺中毒症、強皮症、慢性活性肝炎、多発性筋炎/皮膚筋炎、多発性軟骨炎、尋常性天疱瘡、ウェゲナー肉芽腫症、膜性腎症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄口、巨細胞性動脈炎/多発性筋痛、悪性貧血、急速進行性糸状体腎炎および繊維化肺炎からなる群から選択される、請求項39に記載の使用。

【請求項41】

非経口投与のための、請求項34～40のいずれか一項に記載の使用。

【発明の詳細な説明】

【発明の背景】

【0001】

発明の分野

本発明は、様々な癌細胞、感染性疾患生物をターゲットし、自己免疫疾患を治療するための改善された能力を有する治療接合体であって、ターゲティング残基および治療残基を含む接合体に関する。ターゲティングと治療残基とは、治療効力を増強する、細胞内で開裂可能な結合を介して結合している。

【0002】

背景技術

長年にわたり、ヒト癌に毒性因子を特異的に送達するためのモノクローナル抗体 (mAb) の使用は、特異的にターゲティングした薬物療法の分野における科学者の目標となっている。腫瘍関連mAbと適当な毒性因子との接合体が開発され、癌の治療において複合的に成功しているが、他の疾患には実質的に応用されていない。毒性因子は、最も一般的には化学療法薬であるが、粒子放射放射性核種や、細菌性または植物性毒素もmAbに接合されている。

【0003】

mAb-化学療法薬接合体の使用の利点は、(a) 化学療法薬自体が構造的に明確に規定され、(b) 化学療法薬が、明確に規定された接合化学を用いて結合され、多くの場合にはmAb抗原結合領域とは離れた特異的部位によりmAbタンパク質に結合され、(c) mAb-化学療法薬接合体は、mAbおよび細菌性または植物性毒素を含む化学的接合体よりも再現性よく作製することができ、かつそれ自体商業的開発および規制認可を得やすく、(d) mAb-化学療

10

20

30

40

50

(6)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

法薬接合体は放射性核種mAb接合体より毒性が遙かに小さい。

【0004】

mAb-化学療法薬接合体に関連する初期の研究では、イン・ビトロおよびイン・ビボでの前臨床試験中、用いた化学結合が薬剤の失効をしばしば招くことが見いだされた。これらの結果は、mAb-化学療法薬接合体を有用な治療薬とするためには、薬剤をターゲット細胞中に一担置いたならば、薬剤は理想的には元の形態で放出される必要があることを示していた。従って、1980年代および1990年代初期の研究は、主として化学療法薬とmAbとの間の化学的リンカーの性質に集中した。特に、穏和な酸で開裂可能なリンカーを用いて調製したmAb-化学療法薬接合体は、腫瘍内部のpHが正常な生理学的pHより低いことが多いという観察に基づいて開発された(米国特許第4,542,225号明細書、第4,569,789号明細書、第4,618,492号明細書および第4,952,394号明細書)。この方法は、適当なリンカーを用いて調製したmAb-ドキソルピシン(DOX)接合体を用い、前臨床研究における様々なヒト腫瘍異種移植片を担持するマウスを治療することができることを示したTrail et al.(Science 261: 212-215 (1993))の画期的論文において、一つの頂点に達した。この有望な結果は、ターゲッティングを行う腫瘍細胞上の非常に多数の受容体に結合した抗体にて達成され、そのmAb-化学療法薬接合体はmAbの単位当たり6-8個のDOX残基で置換された。さらに、mAb-化学療法薬接合体は、反復的投薬スケジュールにおいて大用量にて投与された。

10

【0005】

上記のmAb-化学療法薬接合体の開発にあっては、化学療法薬とmAbの間のリンカーは、イン・ビトロおよびイン・ビボのいずれにおいても良好な抗腫瘍活性を保持する上で重要であると考えられた。幾つかの場合には、mAb-化学療法薬接合体は、化学療法薬とmAbとの間を酸に不安定な結合(例えば、ヒドラゾン)および還元的に不安定な(例えば、ジスルフィド)結合として作製された。ヒドラゾン結合はイン・ビボでの血清条件に対しては明らかに安定であるが、通常のジスルフィド結合は実用に十分なほど安定ではないことが分かった。従って、標準的ジスルフィド結合の代わりに、ヒンダードジェミナルジメチルジスルフィド結合またはメチルジスルフィド結合を用いるmAb-化学療法薬接合体が開発された。

20

【0006】

当該技術分野における他の研究が、開裂可能な残基としてのヒドラゾン、およびジスルフィド結合の代わりにチオエーテル基の使用に集中して行われた。Willner et al.は、開裂可能な単位としてヒドラゾンを組み、ジスルフィドの代わりにチオエーテル基を介し、DOXをmAbに結合することによって優れた結果が得られることを見出した(米国特許第5,708,146号明細書)。このような手法でかつmAb置換部位当たりのDOX単位の数に二倍にする分岐リンカーを用いて結合すると、新たなDOX-mAb接合体の効力はほぼ10倍に増加した(King et al., Bioconjugate Chem 10: 279-288 (1999))。

30

【0007】

検討されたもう一つの開裂可能な残基は、抗体と化学療法薬との間のリンカーに組み込まれたエステル結合である。Gillimard and Saragoviは、パクリタキセルのエステルを抗ラットp75mAb、MC192または抗ヒトTrkAmAbである5C3に接合すると、接合体はターゲット特異的な毒性を示すことを見出した(Gillimard and Saragovi, Cancer Res. 61: 694-699(2001))。

40

【0008】

mAb-化学療法薬接合体の構築におけるリンカーの重要性に鑑み、本発明者らは様々な化学療法薬および他の毒性物質とともに一般的に使用可能な新規リンカーを開発した。

【発明の概要】

【0009】

一つの態様によれば、本発明は、

(a) ターゲッティング残基、

(b) 化学療法薬残基、および

(c) チオール基を介してターゲッティング残基へ結合し、かつヒドラゾン以外の細胞内

50

(7)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

で開裂可能な残基を介して化学療法薬残基へ結合するリンカーを含んでなる、免疫接合体に関する。他の態様によれば、本発明は、

(a) ターゲッティング残基、

(b) 化学療法薬残基、および

(c) チオール基を介してターゲッティング残基へ結合し、かつヒドラゾン以外の細胞内で開裂可能な残基を介して化学療法薬残基へ結合するリンカーを含んでなる、免疫接合体であって、上記リンカーがアミノ酸残基とチオール反応性残基とを含んでなり、アミノ酸残基を介して化学療法薬残基におよびチオール反応性残基を介してターゲッティング残基に結合している免疫接合体に関する。

【0010】

本発明の他の態様は、本明細書に記載の免疫接合体を用いる、癌、悪性腫瘍、自己免疫疾患、感染症、または感染性病変の治療方法である。

【発明の具体的説明】

【0011】

特に断らない限り、単数の単語への言及は「その1個以上」を意味する。

【0012】

以下の説明では、本発明を理解しやすくする目的で多数の用語が用いられておりかつ以下の定義が提供される。

【0013】

本明細書に記載の抗体は、完全長の(すなわち、天然に存在するまたは通常の免疫グロブリン遺伝子断片組換え法によって形成された)免疫グロブリン分子(例えば、IgG抗体)、または抗体断片のような免疫グロブリン分子の免疫活性(すなわち、特異結合性)部分を表す。

【0014】

抗体断片は、 $F(ab')_2$ 、 $F(ab)_2$ 、 Fab' 、 Fab 、 Fv 、 $scFv$ (一本鎖 Fv)のような抗体の部分などである。構造には関係なく、抗体断片は完全な抗体によって認識される同一抗原と結合する。

【0015】

また、「抗体断片」という用語は、特異抗原に結合して複合体を形成することによって抗体のような作用を行う任意の合成または遺伝子工学処理を施したタンパク質を包含する。例えば、抗体断片は重鎖および軽鎖の様々な利用域からなる「 Fv 」断片のような可変領域からなる単離断片、軽および重可変領域がペプチドリinker(「 $scFv$ タンパク質」)によって結合されている組換え一本鎖ポリペプチド分子、および超可変領域に類似しているアミノ酸残基からなる最小認識単位を包含する。 Fv 断片は、多価および/または多重特異的結合形態の生成に関する様々な方法で構築することができる。前者の多価の場合には、それらは特異的エピトープに対する2個以上の結合部位と反応し、多重特異的形態では、(抗原の、または特異抗原および異なる抗原に対する)2個以上のエピトープが結合する。

【0016】

本明細書で用いられる抗体成分という用語は、完全な抗体、融合タンパク質およびそれらの断片のいずれをも包含する。

【0017】

裸の抗体は、一般的には治療薬に接合していない完全な抗体である。そう呼ばれるのは、抗体分子の Fc 部分が、補体固定およびADCC(抗体依存性細胞傷害)のようなエフェクターまたは免疫学的機能を提供して、機構を作動させて細胞リシスを生じることができるからである。しかしながら、 Fc 部分は抗体の治療機能には必要とせず、むしろ、アポトーシス、抗血管新生、抗転移活性、異型または同型接着の阻害のような抗接着活性、およびシグナリング経路における干渉のようなむしろ他の機構が効果を示し、疾患の進行を干渉することがある。裸の抗体は、ポリクローナルおよびモノクローナルの両抗体およびそれらの断片であって、ネズミ抗体、並びにキメラ、ヒト化またはヒト抗体およびそれらの断片のようなある種の組換え抗体を包含するものを包含する。本発明において定義されるよう

10

20

30

40

50

(8)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

に、「裸の」は「接合していない」と同義であり、一緒に投与する治療薬には結合または接合していないことを意味する。

【0018】

キメラ抗体は、一種、好ましくは齧歯類抗体由来の抗体の相補性決定領域(CDR)などの重および軽抗体鎖の可変ドメインを含む組換えタンパク質であり、一方抗体分子の定常ドメインはヒト抗体に由来する。動物への応用には、キメラ抗体の定常ドメインはネコまたはイヌのような他の種のものから誘導することができる。

【0019】

ヒト化抗体は、一種からの抗体、例えば、齧歯類抗体からのCDRが、齧歯類抗体の重および軽可変鎖からヒト重および軽可変ドメインに導入されている組換えタンパク質である。抗体分子の定常ドメインは、ヒト抗体の定常ドメインから誘導される。

10

【0020】

ヒト抗体は、抗原投与に応答して特異的ヒト抗体を産生するように「人工的に処理された」トランスジェニックマウスから得られた抗体である。この手法では、ヒト重および軽鎖座の要素が、内在性重鎖および軽鎖座のターゲッティングされた崩壊を含む、胚幹細胞系由来のマウスの系統に導入される。トランスジェニックマウスはヒト抗原に特異的なヒト抗体を合成することができ、このマウスを用いてヒト抗体-抗原ハイブリドーマを産生することができる。トランスジェニックマウスからヒト抗体を得る方法は、Green et al., Nature Genet. 7: 13 (1994)、Lonberg et al., Nature 368: 856 (1994)、およびTaylor et al., Int. Immun. 6: 579 (1994)に記載されている。また、完全なヒト抗体は、遺伝子または染色体トランスフェクション法、並びにファージディスプレイ法、当該技術分野で知られているいずれもによって構築することができる。例えば、免疫していないドナーからの免疫グロブリン可変ドメイン遺伝子レパートリー由来の、ヒト抗体およびその断片のイン・ビトロでの産生については、McCafferty et al., Nature 348: 552-553 (1990)を参照されたい。この手法では、抗体可変ドメイン遺伝子を、糸状バクテリオファージのメジャーまたはマイナーコートタンパク質遺伝子のインフレームでクローニングし、ファージ粒子の表面上に機能的抗体断片として表示する。糸状粒子はファージゲノムの一本鎖DNAコピーを含むので、抗体の機能特性に基づく選択により、その特性を示す抗体をコードする遺伝子もまた選択される。この方法において、ファージは、B細胞の特性に幾分類似している。ファージディスプレイは様々なフォーマットで行うことができ、それらの総説については、例えば、Johnson and Chiswell, Current Opinion in Structural Biology 3: 5564-571 (1993)を参照されたい。

20

30

【0021】

ヒト抗体は、イン・ビトロで活性化されたB細胞によって生成することもできる。米国特許第5,567,610号明細書および第5,229,275号明細書を参照されたい。上記特許明細書の内容は、引用することによって本明細書の開示の一部とされている。

【0022】

治療薬は、抗体成分、すなわち、抗体または抗体断片、またはそれらの小断片とは別個に、同時にまたは逐次的に投与される分子または原子であり、疾患の治療に有用なものである。治療薬の例としては、抗体、抗体断片、免疫接合体、薬剤、細胞傷害性物質、毒素、ヌクレアーゼ、ホルモン、免疫調節剤、キレート化剤、ホウ素化合物、光活性剤または色素、放射性同位体または放射性核種、免疫接合体、またはそれらの組合せが挙げられる。

40

【0023】

免疫接合体は、治療薬に接合した抗体成分である。適当な治療薬は、上記に記載されている。

【0024】

本明細書で用いられる抗体融合タンパク質という用語は、組換えによって産生した抗原結合分子であって、2個以上の同一または異なる特異性を有する同一または異なる天然抗体、一本鎖抗体または抗体断片セグメントが結合しているものである。融合タンパク質は

50

(9)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

、少なくとも1個の特異結合部位を含んでなる。

【0025】

融合タンパク質の原子価は、融合タンパク質が(複数の)抗原または(複数の)エпитープに対して有する結合アームまたは部位の総数、すなわち、一価、二価、三価または多価を示している。抗体融合タンパク質が多価であることは、抗原への結合における複合相互作用を利用し、抗原または異なる抗原への結合のアビディティを増加させることができることを意味する。特異性は、抗体融合タンパク質がいくつの異なる種類の抗原またはエピトープに結合することができるか、すなわち、単一特異性、二重特異性、三重特異性、多重特異性を示す。これらの定義を用いれば、天然抗体、例えばIgGは、2本の結合アームを有するので二価であるが、1種類の抗原またはエピトープに結合するので単一特異性である。単一特異性の多価融合タンパク質は、同一抗原またはエピトープに2個以上の結合部位を有する。例えば、単一特異性ジアボディーは、同一抗原と反応する2個の結合部位を有する融合タンパク質である。融合タンパク質は、異なる抗体成分の多価または多重特異性を組み合わせたもの、または同一抗体成分の複数のコピーを含んでなることができる。融合タンパク質は、さらに治療薬を含んでなることもできる。

10

【0026】

免疫調節剤は、本発明で定義されている通りの治療薬であり、存在するときには身体の免疫系を変更し、抑制または刺激する。典型的には、本発明で有用な免疫調節剤は、免疫細胞を刺激し、マクロファージ、B細胞、および/またはT細胞のような免疫応答カスケードにおいて増殖させまたは活性化させる。本明細書に記載の免疫調節剤の一例は、サイトカインであり、サイトカインは特異抗原と接触した際に1個の細胞個体群(例えば、感作Tリンパ球)によって放出される約5-20kDの可溶性の小タンパク質でありかつ細胞間において細胞間メディエーターとして作用する。熟練技術者であれば理解し得るように、サイトカインの例としては、リンホカイン、モノカイン、インターロイキン、および腫瘍壊死因子(TNF)およびインターフェロンのような幾つかの関連シグナリング分子が挙げられる。ケモカインは、サイトカインのサブセットである。ある種のインターロイキンおよびインターフェロンは、T細胞または他の免疫細胞増殖を刺激するサイトカインの例である。

20

【0027】

好ましい態様によれば、細胞内で開裂可能な残基は、場合によっては、細胞内エステラーゼによって開裂可能なものである。好ましい態様によれば、細胞内で開裂可能な残基はエステル残基である。好ましい態様によれば、エステル残基は、アミノ酸の α -カルボン酸から形成されたエステルである。好ましい態様によれば、細胞内で開裂可能な残基は、細胞内酵素によって開裂可能なペプチド結合を含んでなる。好ましい態様によれば、リンカーは、上記ターゲッティング残基のチオール基に結合する、チオール反応性基を含んでなる。チオール反応性基は、場合によっては、上記ターゲッティング残基のチオール基に結合する、マレイミドまたはビニルスルホンである。好ましい態様によれば、リンカーは、上記ターゲッティング残基のリシン側鎖においてマレイミド残基と反応するチオール基を含んでなる。また、免疫接合体は、好ましくは化学療法薬残基とターゲッティング残基との間にアミノポリカルボキシレート残基を含んでなる。アミノポリカルボキシレートは、好ましくはDTPA(ジエチレントリアミン五酢酸)、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)、TTHA(トリエチレントトラミン六酢酸)、ベンジル-DTPA、DOTA(1,4,7,10-テトラアザシクロデカン-N,N',N'',N'''-四酢酸)、ベンジル-DOTA、NOTA(1,4,7-トリアザシクロノナン-N,N',N''-三酢酸)、ベンジル-NOTAおよびTETA(1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン-1,4,8,11-四酢酸)からなる群から選択される。

30

40

【0028】

化学療法薬残基は、好ましくはドキソルビシン(DOX)、エピルビシン、モルホリノドキソルビシン(モルホリノ-DOX)、シアノモルホリノ-ドキソルビシン(シアノモルホリノ-DOX)、2-ピロリノ-ドキソルビシン(2-PDOX)、カンプトテシン(CPT)、イリノテカン(CPT-11)、SN-38(イン・ビボではプロドラッグCPT-11から代謝的に産生される活性薬剤)、トポテカン、タキサン、ゲルダナマイシン、アンサマイシン、およびエボチロンからなる群から

50

(10)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

選択される。ターゲッティング残基は、モノクローナル抗体 (mAb) である。

【0029】

一つの態様によれば、ターゲッティング残基は、モノクローナル抗体 (mAb) である。もう一つの態様によれば、ターゲッティング残基は多価および/または多重特異性 mAb であってもよい。ターゲッティング残基は、ネズミ、キメラ、ヒト化、またはヒトモノクローナル抗体であり、かつ上記抗体は、完全な断片 (Fab、Fab'、F(ab)₂、F(ab')₂)、または小断片 (一本鎖構築物) の形態である。

【0030】

好ましい態様によれば、ターゲッティング残基は、癌または悪性細胞上で発現した抗原または抗原のエピトープと反応性のモノクローナル抗体である。


10

癌細胞は、好ましくは造血腫瘍 (hematopoietic tumor)、癌、肉腫、黒色腫、またはグリア腫瘍由来の細胞である。

【0031】

ターゲッティング残基は、好ましくは少なくとも1つの化学療法薬残基に結合し、さらに好ましくは約7-12個の上記化学療法薬残基に結合する。好ましいリンカーは、下式を有する。

【化1】



20

【0032】

リンカーは、場合によってはN末端における官能基と、C末端における水可溶化残基と、上記化学療法薬残基に結合するのに利用可能な側鎖を有する1以上の内部塩基性アミノ酸を含んでなる。水可溶化残基は、場合によってはDTPA、EDTA、TTHA、ベンジル-DTPA、DOTA、ベンジル-DOTA、NOTA、ベンジル-NOTA、またはN,N'-ジアルキル置換ピペラジンである。官能基は、場合によってはチオール反応性またはアミン反応性基である。

【0033】

好ましい化学療法薬残基は、ドキソルビシン (DOX)、エピルビシン、モルホリノドキソルビシン (モルホリノ-DOX)、シアノモルホリノ-ドキソルビシン (シアノモルホリノ-DOX)、2-ピロリノ-ドキソルビシン (2-PDOX)、CPT、CPT-11、SN-38、トボテカン、タキサン、ゲルダナマイシン、アンサマイシン、およびエボチロンからなる群から選択される。

30

【0034】

免疫接合体を用いて、癌、悪性腫瘍および感染性病変など様々な疾患および疾病を治療することができる。本発明によって治療される好ましい悪性腫瘍は、悪性固形腫瘍または造血新生物 (hematopoietic neoplasm) である。この方法を感染性病変の治療に向ける場合に、免疫接合体の好ましいターゲットは、抗原またはエピトープ、または病原体上の鉄-シデロフォアキレート受容体 (iron-siderophore chelate receptor) とされる。病原体は、好ましくは細菌、真菌、ウイルス、リケッチア、マイコプラズマ、および原生動物からなる群から選択される。特に、病原体は、Streptococcus agalactiae、Legionella pneumophila、Streptococcus pyogenes、Escherichia coli、Neisseria gonorrhoeae、Neisseria meningitidis、Pneumococcus、Haemophilus influenzae B、Treponema pallidum ライム (Lyme) 病スピロヘータ、Pseudomonas aeruginosa、Mycobacterium leprae、Brucella abortus、Mycobacterium tuberculosis、狂犬病ウイルス、インフルエンザウイルス、サイトメガロウイルス、単純ヘルペスウイルスI、単純ヘルペスウイルスII、ヒト血清バルボ様ウイルス、呼吸器シンシチウムウイルス、带状疱疹ウイルス、B型肝炎ウイルス、麻疹ウイルス、アデノウイルス、ヒトT細胞白血病ウイルス、エプスタイン-バー (Epstein-Barr) ウイルス、ネズミ白血病ウイルス、耳下腺炎ウイルス、水疱性口内炎ウイルス、シンドビスウイルス、リンパ球脈絡髄膜炎ウイルス、疣ウイルス、ブルータング (bluetongue) ウイルス、センダイ (Sendai) ウイルス、ネコ白血病ウイルス、レオウイルス、ポリオウイ

40

50

(11)

JP 2006-511526 A 2006.4.6

ルス、シミアンウイルス40、マウス乳癌ウイルス、 Deng ウイルス、風疹ウイルス、Plasmodium falciparum Plasmodium vivax、Toxoplasma gondii、Trypanosoma rangeli、Trypanosoma cruzi、Trypanosoma rhodesiensei、Trypanosoma brucei、Schistosoma mansoni、Schistosoma japonicum Babesia bovis、Elmeria tenella、Onchocerca volvulus、Leishmania tropica、Trichinella spiralis、Theileria parva、Taenia hydatigena、Taenia ovis、Taenia saginata、Echinococcus granulosus、Mesocostoides corti、Mycoplasma arthritidis、M. hyorhinis、M. orale、M. arginini、Acholeplasma laidlawii、M. salivarium および M. pneumoniae からなる群から選択することができる。

【0035】

免疫接合体を用いて、クラスIIIの自己免疫疾患などの自己免疫疾患を治療することも可能である。本発明による治療に好ましいクラスIIIの自己免疫疾患は、免疫依存性血小板減少症、皮膚筋炎、シェーグレン(Sjogren)症候群、多発性硬化症、シデナム(Sydenham)舞蹈病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus)、ループス腎炎、リウマチ熱、慢性関節リウマチ、多腺性症候群、水疱性類天疱瘡、糖尿病、ヘノッホ-シェーンライン(Henoch-Schönlein)紫斑病、連鎖球菌感染後腎炎(post-streptococcal nephritis)、結節性紅斑、高安(Takayasu)動脈炎、アジソン(Addison)病、慢性関節リウマチ、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、多形性紅斑、IgA腎症、結節性多発性動脈炎、強直性脊椎炎、グットパスチャー(Goodpasture)症候群、血栓性血管炎(thromboangiitis obliterans)、原発性胆汁性肝硬変、橋本(Hashimoto)甲状腺炎、甲状腺中毒症、強皮症、慢性活性肝炎、多発性筋炎/皮膚筋炎、多発性軟骨炎、尋常性天疱瘡、ウェゲナー(Wegener)肉芽腫症、膜性腎症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄口、巨細胞性動脈炎/多発性筋痛、悪性貧血、急速進行性糸状体腎炎、および繊維化肺肺炎からなる群から選択される。

【0036】

免疫接合体は、好ましくは非経口投与される。本発明の好ましい態様の一側面によれば、本発明は、ターゲッティング残基、化学療法薬残基、およびチオール基を介してターゲッティング残基へ、およびヒドラゾン以外の細胞内で開裂可能な残基を介して化学療法薬残基へ結合するリンカーを含んでなる、免疫接合体に関する。


【0037】

好ましい態様によれば、ヒドラゾン以外の細胞内で開裂可能な残基は、mAbが認識しかつ受容体に結合する細胞にインターナリゼーションしたならば、開裂することができ、特にエステラーゼおよびアミダーゼによって開裂することができる残基である。

【0038】

好ましい態様によれば、化学療法薬残基を中性pHで別個に活性化し、チオール反応性基を含むようにする。チオール反応性基を任意の化学療法薬残基に組み込む化学的方法の開発は、通常の熟練技術者の技術の範囲内にある。しかしながら、好ましい態様によれば、化学療法薬残基を活性化し、チオール反応性基を有する基がアミノ酸基によって化学療法薬残基から、間隔を空けるようにすることができる。好ましい態様によれば、アミノ酸のα-アミノ基を、マレイミド、クロロアセタミド、プロモアセタミド、ヨードアセタミド、およびビニルスルホンのようなチオール反応性基を有する試薬と反応させることができる。好ましくは、上記のチオール反応性基を有する試薬は、スクシンイミジル[4-マレイミドメチル]シクロヘキサン-1-カルボキシレート(SMCC)である。SMCCの場合には、チオール反応性基はマレイミド基である。SMCCとアミノ酸基を含んでなる化学療法薬残基との反応から生じる生成物は、下記に示される一般的化合物である。

【化2】



(12)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

(式中、Rは任意のアミノ酸の側鎖である)


【0039】

この理論によって本発明を束縛しようとするものではないが、マレイミドシクロヘキシルカルボキシレート基は、二つの理由により、本発明の好ましい態様に関して特に有用であると思われる。第一には、リンカーのシクロヘキシル基が、SMCCとアミノ酸の α -アミノ基との反応から形成されるアミド官能基を安定化するとと思われる。第二には、薬剤とアミノ酸カルボキシレートとの間に形成されたエステルは、免疫接合体が細胞中にインターナリゼーションされると、開裂する。細胞内開裂したエステル結合の一例は、パクリタキセル-MC192免疫接合体である(Gillimard and Saragovi, 上記引用)。

【0040】

本発明の好ましい態様によれば、上記に示したアミノ酸基を含んでなる化学療法薬残基はリンカー、すなわちチオール基を介してターゲッティング残基に結合するリンカーを含む。リンカーは、下記の分子の一部である。

【化3】



しかしながら、本発明の好ましい態様の範囲は、それだけに限定されない。リンカーは、単にアミノ酸基とチオール反応性基とを含んでなる残基であってもよい。アミノ酸基とチオール反応性基は、上記に示した4-メチレンシクロヘキサン-1-カルボニル残基など熟練技術者に知られている任意の残基によって、その間隔を空けることができる。

【0041】

本発明の好ましい態様の免疫接合体は、当該技術分野で周知の方法を用いて活性化した化学療法薬残基と抗体との反応から得られる。化学療法薬残基は、mAb鎖間ジスルフィド結合の還元後にチオール反応性基を介してmAbに結合させることができる。この方法は、抗体1分子当たり平均して8個の遊離チオール基を生成し、そして還元反応に用いられる範囲内のチオールの再現的にその通りとなる。

【0042】

抗体のリシン基への接合のために、抗体を最初に誘導化し、チオール反応性基を含むようにして、チオール基を含む化学療法薬残基を用いる。mAbのリシン基の修飾によって抗体にチオール基を導入する方法は、当該技術分野で周知である(Govindan et al. Bioconjugate Chemistry, 7: 290-297, 1996; Wong 「タンパク質接合および架橋の化学(Chemistry of protein conjugation and cross-linking)」, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL (1991), pp 20-22)。この方法では、二官能価化学療法薬残基を抗体断片および一本鎖構築物などの小断片に接合させる。逆に、化学療法薬残基は、還元したmAbの(複数の)チオールと反応するチオール反応性基を含む。

【0043】

ターゲッティング残基は、好ましくは抗体(完全なヒト、非ヒト、ヒト化、またはキメラ抗体など)または抗体断片(酵素的にまたは組換えによって産生した断片など)、および抗体または抗体断片からの配列を組込む結合性タンパク質である。抗体、断片、および結合性タンパク質は、上記で定義したように多価および多重特異性、または多価および単一特異性であることができる。

【0044】

本発明の好ましい態様によれば、ターゲット細胞上で高水準で発現しかつ正常組織と対比して主として疾患細胞にて発現するかまたは疾患細胞でのみ発現するマーカーまたは腫瘍関連抗原を認識しまたはに結合するmAbのような抗体、および速やかにインターナリゼーションする抗体を用いる。本発明の範囲内で有用な抗体としては、上記のような特性を有する(および細胞および微生物中への様々なレベルのインターナリゼーションの顕著な特性を示す)mAbが挙げられ、癌においては以下のmAb、すなわちLL1(抗CD74)、LL2(抗CD22

10

20

30

40

50

(13)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

)、RS7(抗上皮糖タンパク質-I(EGP-I))、PAM-4およびKC4(いずれも抗MUC1)、MN-14(抗癌胎児性抗原(CEA、CD66eとしても知られる)、Mu-9(抗結腸特異性抗原-p)、Immu 31(抗 α -フェトプロテイン)、TAG-72(例えば、CC49)、Tn、J 591(抗PSMA(前立腺特異性膜抗原))、G 250(抗カルボニクアンヒドラーゼIX mAb)、およびL243(抗HLA-DR)の使用が意図されるが、これらに限定されない。これらの接合体を用いてターゲッティングすることができる他の有用な抗原としては、HER-2/neu、BrE3、CD19、CD20(例えば、C2B8、hA20、1F5 MAb)、CD21、CD23、CD80、 α -フェトプロテイン(AFP)、VEGF、EGF受容体、P1GF、MUC1、MUC2、MUC3、MUC4、PSMA、ガングリオシド、HCG、EGP-2(例えば、17-1A)、CD37、HLA-DR、CD30、Ia、A3、A33、Ep-CAM、KS-1、Le(y)、S100、PSA(前立腺特異性抗原)、テネニン、葉酸受容体、Thomas-Friedenreich抗原、腫瘍壊死抗原、腫瘍血管新生抗原、Ga 733、IL-2、IL-6、T101、MAGE、L243が結合する抗原、CD66抗原、すなわち、CD66a-d、またはそれらの組合せが挙げられる。CD66抗原は、類似構造を有する5つの異なる糖タンパク質CD66a-eからなり、これらは、それぞれ癌胎児性抗原(CEA)遺伝子ファミリーBCG、CGM6、NCA、CGM1およびCEAによってコードされるこれらのCD66抗原は、主として顆粒球、消化管の正常な上皮細胞、および様々な組織の腫瘍細胞で発現する。多数の上記抗原は、2002年11月15日出願の「治療薬の標的設定送達のための多重特異性の非共有複合体の使用」という標題の米国仮出願連続番号第60/426,379号明細書に開示されている。

【 0 0 4 5 】

本発明の他の好ましい態様によれば、速やかにインターナリゼーションした後に細胞表面上で再発現し、加工され、提供される抗体を用いて、循環する免疫接合体の細胞による連続的摂取および癒着を可能とする。最も好ましい抗体/抗原対の一例は、抗CD74 mAb(不変鎖のクラスII特異性シャペロン、Ii)であるLL1である。CD74抗原は、B細胞リンパ腫、ある種のT細胞リンパ腫、黒色腫、およびある種の他の癌(Ong et al., Immunology 98:296-302 (1999))、並びにある種の自己免疫疾患にて高度に発現する。

【 0 0 4 6 】

抗CD74抗体で好ましく治療される疾患としては、非Hodgkinリンパ腫、黒色腫、および多発性骨髄腫が挙げられるが、これらに限定されない。CD74抗原をターゲット細胞の表面上で短時間連続発現した後、その抗原をインターナリゼーションし、その抗原を再発現することによって、ターゲッティングされたLL1抗体を、「ペイロード」として含む任意の化学療法薬残基と共にインターナリゼーションすることができる。これにより、高治療濃度のLL1-化学療法薬免疫接合体をこれらの細胞内に蓄積させることができる。インターナリゼーションしたLL1-化学療法薬免疫接合体はリソソームおよびエンドソーム中循環し、化学療法薬残基をターゲット細胞中において活性形態で放出する。

【 0 0 4 7 】

他の態様によれば、本発明は、本発明の好ましい態様の治療薬接合体の治療上有効量を患者に投与することを含んでなる、患者の治療方法に関する。本発明の好ましい態様の治療薬接合体で治療することができる疾患としては、B細胞悪性腫瘍(例えば、LL2 mAbを用いる非Hodgkinリンパ腫および慢性リンパ性白血病、米国特許第6,183,744号明細書参照)、内胚葉由来の消化管上皮の腺癌、乳癌および非小細胞肺癌のような癌、および他の癌、肉腫、グリア腫瘍、骨髄性白血病などが挙げられるが、これらに限定されない。特に、抗原、例えば、消化器、肺、乳、前立腺、卵巣、精巣、脳またはリンパ腫瘍のような悪性固形腫瘍または造血新生物によって産生されるまたは関連した腫瘍胎児性抗原)、に対する抗体が有利に用いられる。

【 0 0 4 8 】

本明細書で用いられる「患者」という用語は、哺乳類などこれらに限定されない任意の動物(すなわち、脊椎動物および無脊椎動物)を表す。患者という用語は、齧歯類(例えば、マウス、ラットおよびモルモット)も包含する。この用語は特定の年齢または性別に限定されることを意味しない。従って、成熟したおよび新生患者、並びに胎児は、雄または雌に関わらずこの用語によって包含される。

【 0 0 4 9 】

10

20

30

40

50

(14)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

他の好ましい態様によれば、本発明の好ましい態様のMu-9 mAbを含んでなる治療薬接合体を用いて、2002年4月5日出願の米国特許出願連続番号第10/116,116号明細書およびGold et al. (Cancer Res. 50:6405 (1990)、およびそこに引用されている文献)に開示されている結直腸並びに膵臓および卵巣の癌を治療することができる。さらに、2002年6月14日出願の米国仮出願連続番号第60/388,314号明細書に開示されているように、本発明の好ましい態様のPAM 4mAbを含んでなる治療薬接合体を用いて、膵臓癌を治療することができる。

【0050】

他の好ましい態様によれば、2002年3月1日出願の米国仮出願連続番号第60/360,229号明細書およびStein et al. (Cancer Res. 50:1330 (1990)、およびAntibody Immunoconj. Radiopharm 4:703 (1991))に開示されているように、好ましい態様のRS-7 mAbを含んでなる治療薬接合体を用いて、肺、胃、膀胱、乳、卵巣、子宮、および前立腺の癌などの癌を治療することができる。

【0051】

他の好ましい態様によれば、2002年8月1日出願の米国仮出願連続番号第60/399,707号明細書に開示されているように、好ましい態様の抗AFP mAbを含んでなる治療薬接合体を用い、ヒト化、キメラおよびヒト抗体形態を用いて、肝細胞癌、生殖細胞腫瘍、および他のAFP産生腫瘍を治療することができる。

【0052】

他の好ましい態様によれば、抗テネイシン抗体を含んでなる治療薬接合体を用いて造血および固形腫瘍を治療することができ、Le(y)に対する抗体を含んでなる接合体を用いて、固形腫瘍を治療することができる。

【0053】

他の好ましい態様によれば、本発明の好ましい態様の治療薬接合体を用いて治療することができる疾患としては、2002年3月1日出願の米国仮出願連続番号第60/360,259号明細書に開示されているように、急性の特発性血小板減少性紫斑病および慢性の特発性血小板減少性紫斑病のような免疫依存性血小板減少症、皮膚筋炎、シェーグレン(Sjogren)症候群、多発性硬化症、シデナム(Sydenham)舞蹈病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、リウマチ熱、多腺性症候群、水疱性類天疱瘡、糖尿病、ヘノッホ-シェーンライン(Henoch-Schonlein)紫斑病、連鎖球菌感染後腎炎(post-streptococcal nephritis)、結節性紅斑、高安(Takayasu)動脈炎、アジソン(Addison)病、慢性関節リウマチ、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、多形性紅斑、IgA腎症、結節性多発性動脈炎、強直性脊椎炎、グットパスチャー(Goodpasture)症候群、血栓性血管炎(thromboangitis obliterans)、シェーグレン(Sjogren)症候群、原発性胆汁性肝硬変、橋本(Hashimoto)甲状腺炎、甲状腺中毒症、強皮症、慢性活性肝炎、慢性関節リウマチ、多発性筋炎/皮膚筋炎、多発性軟骨炎、尋常性天疱瘡、ウェグナー(Wegener)肉芽腫症、膜性腎症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄口、巨細胞性動脈炎/多発性筋痛、悪性貧血、急速進行性糸状体腎炎、および繊維化肺炎のようなクラスIII自己免疫疾患などの免疫調節不全疾患および関連自己免疫疾患が挙げられるが、これらに限定されない。これらの疾患に有用な典型的抗体としては、HLA-DR抗原B細胞抗原(例えば、CD19、CD20、CD21、CD22、CD23、CD4、CD5、CD8、CD14、CD15、CD19、CD20、CD21、CD22、CD23、CD25、CD33、CD37、CD38、CD40、CD40L、CD46、CD52、CD54、CD74、CD80、CD126、B7、MUC1、Ia、HMI.24、およびHLA-DR)と反応性であるものが挙げられるが、これらに限定されない。これらの自己免疫疾患の多くは異常型B細胞個体群によって作製された自己抗体によって影響を受ける。本発明で用いられる薬剤と結合した抗体

を伴う治療薬接合体によってこれらB細胞を潤滑させることは、特にB細胞抗体をある情況においてHLA-DR抗体および/またはT細胞抗体(抗TAC抗体のようなIL-2を抗原としてターゲットとするものなど)と結合させるときには、自己免疫疾患治療において好ましい方法である。

【0054】

50

(15)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

他の好ましい態様によれば、病原体に対する抗体が知られているので、好ましい態様の治療薬接合体を病原体に対して用いることができる。感染性病変(例えば、細菌、リケッチア、マイコプラズマ、原生動物、真菌およびウイルスのような病原体によって引き起こされるウイルス、細菌、真菌および寄生生物の感染症など)によって産生されるかまたは感染性病変と、関連したマーカーを、特異的に結合する抗体および抗体断片、および上記のような微生物と関連した抗原および産物は、とりわけHansen et al.の米国特許第3,927,193号明細書およびGoldenbergの米国特許第4,331,647号明細書、第4,348,376号明細書、第4,361,544号明細書、第4,468,457号明細書、第4,444,744号明細書、第4,818,709号明細書、および第4,624,846号明細書に開示されている。好ましい態様によれば、病原体は、米国特許第6,440,416号明細書に開示されているように、*Streptococcus agalactiae*、*Legionella pneumophila*、*Streptococcus pyogenes*、*Escherichia coli*、*Neisseria gonorrhoeae*、*Neisseria meningitidis*、*Pneumococcus*、*Haemophilus influenzae* B、*Treponema pallidum* ライム(Lyme)病スピロヘータ、*Pseudomonas aeruginosa*、*Mycobacterium leprae*、*Brucella abortus*、*Mycobacterium tuberculosis*、狂犬病ウイルス、インフルエンザウイルス、サイトメガロウイルス、単純ヘルペスウイルスI、単純ヘルペスウイルスII、ヒト血清パルボ様ウイルス、呼吸器シンシチウムウイルス、帯状疱疹ウイルス、B型肝炎ウイルス、麻疹ウイルス、アデノウイルス、ヒトT細胞白血病ウイルス、エプスタイン-バー(Epstein-Barr)ウイルス、ネズミ白血病ウイルス、耳下腺炎ウイルス、水疱性口内炎ウイルス、シンドビスウイルス、リンパ球脈絡髄膜炎ウイルス、疣ウイルス、ブルータングウイルス、センダイ(Sendai)ウイルス、ネコ白血病ウイルス、レオウイルス、ポリオウイルス、シミアンウイルス40、マウス乳癌ウイルス、デングウイルス、風疹ウイルス、*Plasmodium falciparum*、*Plasmodium vivax*、*Toxoplasma gondii*、*Trypanosoma rangeli*、*Trypanosoma cruzi*、*Trypanosoma rhodesiense*、*Trypanosoma brucei*、*Schistosoma mansoni*、*Schistosoma japonicum*、*Babesia bovis*、*Eimeria tenella*、*Onchocerca volvulus*、*Leishmania tropica*、*Trichinella spiralis*、*Theileria parva*、*Taenia hydatigena*、*Taenia ovis*、*Taenia saginata*、*Echinococcus granulosus*、*Mesocostoides corti*、*Mycoplasma arthritidis*、*M. hyorhini*、*M. orale*、*M. arginini*、*Acholeplasma laidlawi*、*M. salivarium* および *M. pneumoniae* からなる群から選択される。

【0055】

一つの態様によれば、抗体はグラム陰性菌病原体による感染に対して用いるためのシデロフォア(shiderophore)成分を組み込む化学接合体として送達される。シデロフォアは鉄とキレート形成する、ジまたはトリアミンのビスカテコレートであり、送達ビヒクルとして用いられる。シデロフォアの鉄キレートは細菌膜状の特異的受容体によって認識され、細菌細胞内部の活性輸送をもたらす(Heinisch et al., J. Medicinal Chemistry, 45:3032-3040, 2002)。本発明に関しては、ペプチドは、N末端として保護されたりシンを有するものが構成される。次に、樹脂支持体から遊離するペプチドのカルボキシル末端を活性化して、ペニシリンNのようなアミンを含む抗生物質にカップリングさせる。N末端の保護基を開裂した後、N末端リシンのアミノ基を2,3-ジアセトキシベンゾイルクロリドに接合させて、必要なビスカテコレートを付加したペニシリン接合体を最終的に生じる。カテコール残基のジアセチル誘導体は、シデロフォア成分としても有効である(Heinisch et al., 上記引用)。

【0056】

好ましい態様によれば、ヒトの疾患の治療に用いられる抗体は、抗体のヒトまたはヒト化(CDRを移植した)誘導体であるが、抗体のネズミおよびキメラ誘導体を用いることができる。家畜での使用には、同一種のIgGが最も効果的なベクターであると思われるが、交差種IgGも有用である。送達剤と同じ種のIgG分子は、免疫応答を最小限にするのに一般に好ましい。これは、反復治療を考えるとときには特に重要である。ヒトにおいては、ヒトまたはヒト化IgG抗体は患者から抗IgG免疫応答を余り生成しない。インターナリゼーション抗原をターゲティングすると、hLL1およびhLL2のような抗体はターゲット細胞に結合した後に速やかにインターナリゼーションするが、これは、運ばれる化学療法薬が細胞に速

(16)

JP 2006-511526 A 2006.4.6

やかにインターナライズされることを意味している。しかしながら、インターナライゼーションの速度が遅い抗体を用いて、本発明による選択的療法を行うこともできる。

【0057】

本発明の好ましい態様によれば、細胞および病原体への一層効果的な組込みを多価で多重特異性または多価で単一特異性の抗体を用いることによって行うことができる。多価とは、細胞上で発現した同一または異なる抗原またはエピトープに対して数本の結合アームを用いることを意味し、一方、多重特異性抗体はターゲッティングした細胞または病原体に含まれる少なくとも2個の異なる抗原またはエピトープをターゲッティングするのに複数の結合アームを用いること含む。このような二価で二重特異性の抗体の例は、2002年8月1日出願の米国特許出願第60/399,707号明細書、2002年3月1日出願の第60/360,229号明細書、2002年6月14日出願の第60/388,314号明細書、および2002年4月5日出願の第10/116,116号明細書に見出され、上記特許明細書の内容は、その開示の一部として本明細書に引用されている。

10

【0058】

本発明の好ましい態様によれば、カンプトテシン(CPT)およびその誘導体は好ましくは化学療法薬残基であるが、本発明はそれに限定されない。本発明の範囲内にある他の化学療法薬残基は、タキサン(例えば、パカチンIII、タキソール)、エボチロン、アントラサイクリン薬(ドキソルビシン(DOX)、エピルビシン、モルホリノドキソルビシン(モルホリノ-DOX)、シアノモルホリノ-ドキソルビシン(シアノモルホリノ-DOX)、および2-ピロリノドキソルビシン(2-PDOX); Priebe W 監修), ACSシンポジウムシリーズ574, American Chemical Society刊, Washington D. C., 1995. (332pp)、およびNagy et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:2464-2469, 1996参照)、ゲルダナマイシンのようなベンゾキノイドアンサマイシン(DeBoer et al., Journal of Antibiotics 23:442-447, 1970; Neckers et al., Invest. New Drugs 17:361-373, 1999)などである。好ましくは、本発明の好ましい態様の免疫接合体において、ターゲッティング残基は少なくとも1つの化学療法薬残基、好ましくは1-約5個の化学療法薬残基、最も好ましくは、約7-約12個の化学療法薬残基に結合する。

20

【0059】

CPT誘導体は、1つのクラスの強力な抗腫瘍薬である。イリノテカン(CPT-11とも表される)およびトポテカンは、認可された癌治療薬であるCPT類似体である(Iyer and Ratain, Cancer Chemother. Pharmacol. 42: S31-S43 (1998))。CPTは、トポイソメラーゼI-DNA複合体を安定化することによりトポイソメラーゼI酵素を阻害することによって作用する(Liu, et al. 「カンプトテシン: その抗癌力の解明(The Camptothecins: Unfolding Their Anticancer Potential)」, Liehr J. G., Giovannella, B. C. and Verschraegen (監修), NY Acad. Sci., NY (2000), pp 1-10)。

30

【0060】

CPTについて、免疫接合体の調製において一組の補足説明を示す。一つの補足説明とは、水性緩衝液でほとんどのCPT誘導体が不溶性であることである。第二には、CPTは、高分子に接合するのに構造的変更の選択肢が極めて少ない。例えば、CPT自身は、環Eに第三ヒドロキシル基を1個しか含まない。CPTの場合のヒドロキシル官能基は、その後のタンパク質接合に適用されるリンカーにカップリングさせなければならない。第三には、それらの構造におけるE環の δ ラクトン残基が生理学的条件下では不安定であり、これら物質における抗腫瘍能が著しく減少する。従って、接合法は7以下のpHで行い、ラクトン環の開環を回避するように行われる。活性エステルのようなアミン反応性基を有する二官能価CPTの典型的な接合には、pHが8以上である必要がある。第四には、細胞内で開裂可能な残基は、CPTと抗体とを接続するリンカー/スペーサーに組込む必要がある。

40

【0061】

生理学的条件下での δ ラクトン開環の問題は、以前に説明した。一つの方法は、C-20ヒドロキシル基をアミノ酸でアシル化し、そのアミノ酸の α -アミノ基をポリ-L-グルタミン酸にカップリングすることであった。この方法は、ポリマー分子の腫瘍部位への受動拡散

50

(17)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

に依存している。このグリシン接合は、CPTの水溶性誘導体の作製方法(米国特許第4,943,579号明細書)として、およびCPTのPEG-誘導体形成の調製(Greenwald, et al., J. Med. Chem 39:1938-1940 (1996))においても報告されている。後者の場合には、この方法は、水溶性で長期作用性形態のCPTの開発において発明され、これによってCPTのイン・ビボでの半減期が増し、薬剤がイン・ビボで循環している間にその接合体から徐々に放出される。


【0062】

好ましい態様によれば、本発明は、上記の4つの補足説明を考慮した、CPTの免疫接合体の調製方法を提供する。本発明の好ましい態様は、下記の方法で補足説明を扱うものである。第一に、CPTの水溶性は、アミノポリカルボキシレート(すなわち、CPT)と抗体の間に配置することによって増加する。好ましい態様によれば、アミノポリカルボキシレートは、DTPA(ジエチレントリアミン五酢酸)、NOTA(1,4,7-トリアザシクロノナン-N,N',N''-三酢酸)、DOTA(1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-N,N',N'',N'''-四酢酸)、およびTETA(1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン-1,4,8,11-四酢酸)からなる群から選択される。

【0063】

好ましい態様によれば、アミノポリカルボキシレートはDTPAである。特に好ましい態様によれば、DTPAは、これを有する試薬を介して化学療法薬残基に結合している。好ましくは、アミノポリカルボキシレートを有する上記試薬は、

【化4】



(式中、「Trt」はトリチル基であり、カルボキシレート上のR基は水素またはアルキルであり、アルキルは直鎖状または分岐鎖状のC₁-C₆-アルキル基を意味する)である。通常の熟練技術者であれば、本発明の好ましい態様の実施に有用なアミノポリカルボキシレートを有する他の試薬を開発することができる。ハブテンを有する試薬は、当該技術分野で周知の方法により、チオ尿素残基のカルボン酸を介して化学療法薬残基に結合させることができる。当該技術分野で周知のこのような方法を、実施例8に記載する。Rがアルキルである場合には、エステルを脱保護して、最終的に相当するDTPA誘導体を得る。

【0064】

アミノポリカルボキシレートを有する試薬は、直接またはアミノ酸スペーサーを介して化学療法薬残基に結合させることができる。好ましい態様では、アミノポリカルボキシレートは、グリシンスペーサーを介して、さらに好ましくはバリンスペーサーを介して化学療法薬残基に結合される。さらに立体傷害の大きいバリネートを用いることによって、加水分解的に安定な残基が提供されることが示されている(Lerchen H-G et al., J. Med. Chem 44:4186-4195 (2001))。C-20ヒドロキシルのエステルとしての誘導体形成は、ジペプチドまたはポリペプチドを伴うこともできる。化学療法薬残基が10-ヒドロキシCPTであるときには、グリシルスペーサーを下記の実施例7に示されるようにA環のヒドロキシル基またはC-20ヒドロキシル基に結合させ、最も好ましくは、上記したグリシルまたは他のスペーサーはC-20ヒドロキシル基に結合している。


【0065】

好ましい態様では、化学療法薬残基の水溶性は、化学療法薬残基上のヒドロキシル基に下記の残基(A)

(18)

J P 2006- 511526 A 2006. 4. 6

【 化 5 】



A

(式中、「PEG」はポリエチレングリコールを表す)を組み込むことによって増加する。この残基は化学療法薬残基の水溶性を増加させるだけでなく、チオール反応性基も組み込む。10-ヒドロキシCPTの場合には、上記残基をA環ヒドロキシル基またはC-20ヒドロキシル基で結合させることができる。

10

【 0 0 6 6 】

C-20ヒドロキシルに結合させるには、C-10ヒドロキシルを最初に保護する。次に、C-20ヒドロキシルを、例えば、グリシネートエステルに転換させる。この時点で、C-10ヒドロキシルは脱保護してよい。次いで、C-20グリシネートエステルの遊離アミノ基を適当に合成して、例えば、細胞内Cathepsin B酵素によって認識されかつ開裂する細胞内で開裂可能な「Phe-Lys」ジペプチド結合を含むようにすることができる。次に、上記で示されたPEG含有残基を、C-20グリシネート-Phe-Lysジペプチドの末端の遊離アミノ基に組み込む。

【 0 0 6 7 】

第二に、 δ -ラク톤を、アミノ酸基でC-20ヒドロキシル基を誘導体形成することによって安定させる。CPTのC-20ヒドロキシルにおけるアミノ酸リンカー/スペーサーの使用は、チオール反応性残基を有するアミンのさらなる合成に有利である。さらに、アミノ酸リンカー/スペーサーは、細胞内で開裂可能な残基として作用する。この時点で、免疫接合体は、細胞内で活性化されるプロドラッグに事実上なる。すなわち、免疫接合体からの化学療法薬残基の放出は、免疫接合体の腫瘍特異性抗原への結合、その後のインターナリゼーション、リソソームコンパートメントへのルーティング、およびリソソーム酵素による接合体の最終処理による薬剤の放出によって変化する。

20

【 0 0 6 8 】

最後に、この接合法は、中性または酸性pHで容易に起こるチオール-マレイミドまたはチオール-ビニルスルホン反応に基づいている。これにより、例えば、活性エステルを用いるときに必要とされるような接合のためにpH条件を一層高くする必要がなくなる。

30

【 0 0 6 9 】

他の態様によれば、本発明は、水可溶化残基とチオール反応性残基(例えば、マレイミド基)を本発明の好ましい態様の免疫接合体へ導入するためのモジュール法に関する。水可溶化残基とチオール反応性残基は、MCC-Gly-Lys-Lys(R')-NH₂(上記式中、MCCは4-マレイミドメチル-シクロヘキシル-1-カルボニル(SMCCから誘導された特別なマレイミド誘導体)であり、R'はアミノポリカルボキシレート(例えば、DTPA)またはピペラジンの誘導体のような水可溶化物質である)のような鑄型上に好適に導入される。上記態様で既に示されたようにアミノ酸またはジペプチドを用いることによるC-20ヒドロキシルでのエステルとしてのCPTまたはその類似体の誘導体形成によって、活性化に利用可能なアミノ基が生じる。このアミノ基を当該技術分野で周知の方法によってイソチオシアナート基に転換し、後者を上記のペプチド鑄型の内部リシン残基の側鎖アミノ基に結合させる。この方法で、水可溶化基と抗体反応性基が単一段階で付加される。さらに、ペプチド鑄型を変更して2個以上の中心リシンまたはアルギニンのような他の側鎖アミンを含むアミノ酸を含むようにすることによって、複数の化学療法薬残基を付加することができる。

40

【 0 0 7 0 】

上記方法を用いて、1-5個、さらに好ましくは1-2個の化学療法薬残基をリンカーに導入することができると考えられる。

【 0 0 7 1 】

さらに他の好ましい態様によれば、pHに感受性の細胞内で開裂可能な残基を、ターゲッ

50

(19)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

ティング残基を化学療法薬残基に結合するリンカーとして用いる。この方法の利点は、化学療法薬残基の腫瘍内放出が、ターゲッティング残基を化学療法薬残基に結合させる細胞内で開裂可能な残基の結合を開裂させるための特異的酵素の発現の程度によらないことである。

【 0 0 7 2 】

例えば、CPTの20-ヒドロキシル基を、ジヒドロピラン残基、テトラヒドロフラン残基、またはチオール反応性残基(例えば、マレイミド)および水可溶化基(例えば、ピペラジン)をも含んでなるオルトエステルを含んでなるpH感受性の細胞内で開裂可能な残基に酸触媒下で結合させることができる。チャート1を参照されたい。ジヒドロピラン、テトラヒドロフラン、またはオルソエステル残基を含んでなるpH感受性の細胞内で開裂可能な残基は、総て細胞内コンパートメントの酸性pHで開裂されやすいエーテル結合を含んでなる。

10

【 0 0 7 3 】

下図の構造1のリンカーを用いる。この実施例では、中心のピペラジン部分は水溶性を考慮している。この分子の「左端」における置換ジヒドロピランはCPT誘導体における(複数の)ヒドロキシル基ヘカップリングするためのものであり、この分子の「右端」のマレイミドはジスルフィドで還元した抗体へ接合するためのプロトタイプのチオール反応性基である。本明細書において、「CPT」は一般的用語として用いられ、チャートに示されるように、CPT、10-ヒドロキシ-CPT、またはSN-38となることができる。10-ヒドロキシ-CPTおよびSN-38の場合には、誘導体形成は10-ヒドロキシおよび20-ヒドロキシ位の両方で予想することができる。CPTは、テトラヒドロピラン残基を介して架橋剤に結合する。この結合はpH 4-6で徐々に開裂するが、6を上回るpHでは安定である(Greene TW Wuts PGM著「有機合成における保護基(Protective groups in organic synthesis)」, 第2版; John Wiley & Sons: New York, 1991; pp 413-416)。この方法は、細胞内コンパートメントが酸性であり、通常は約5であることを利用している(Poznansky M and Juliano RL, Pharmacol Rev 36:277-336, 1984)。細胞内コンパートメントにおけるこの酸性pHによって、抗体から薬剤を無傷で放出される。

20

【 0 0 7 4 】

上記のように、テトラヒドロフラニル残基は、pH感受性の細胞内で開裂可能な残基の不可欠な部分と考えられる(Greene TW Wuts PGM著「有機合成における保護基(Protective groups in organic synthesis)」, 第2版; John Wiley & Sons: New York, 1991; pp 267-269)。pH感受性の細胞内で開裂可能な残基がテトラヒドロフラニル残基を含んでなるときには、CPT C20-酸素-テトラヒドロフラン結合はテトラヒドロピラニル残基を用いるときより速やかに開裂する。

30


【 0 0 7 5 】

(20)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【化6】

チャート



10

20

本発明の好ましい態様の免疫接合体の投与の適当な経路としては、経口、非経口、直腸、経粘膜、腸投与、筋肉内、皮下、骨髓内、髄腔内、直接心室内、静脈内、ガラス体内、腹腔内、経鼻、または眼内投与が挙げられるが、これらに限定されない。好ましい投与経路は非経口である。あるいは、化合物を例えば固形腫瘍に直接注射することによって、化合物を全身的よりは局所的に投与することができる。

【実施例】

【0076】

30


本発明を下記の実施例によって説明するが、発明の範囲を制限するものではない。

実施例

実施例1：10ヒドロキシカンブトテシンのC-20-O-(N-'MCC')グリシネート誘導体であって、MCCが4-(N-マレイミドメチル)-シクロヘキサン-1-カルボニル残基であるものの調製

【化7】

図1



40

50

(21)

J P 2006-511526 A 2006.4.6


10-ヒドロキシカンブトテシン(0.2081g; 0.57ミリモル)を、無水ジメチルホルムアミド(DMF) 20ml およびジイソプロピルエチルアミン(DIEA) 0.22ml に加えた。これに4-ニトロフェニルクロロホルメート0.1248g(0.619ミリモル)を加え、反応混合物をアルゴン下室温にて4時間攪拌した。4-ピペリジノピペリジン(0.2403g)をDMF 4ml に溶解したものを一度に加え、混合物をさらに2時間攪拌した。溶媒を留去すると粗生成物が得られ、これをシリカゲル(230-400メッシュ)上でフラッシュクロマトグラフィーによってメタノール-ジクロロメタングラディエント溶出を用いて精製し、中間体2 52.8mgを得た。電子スプレー質量スペクトルでは、ポジティブイオンモードで m/e 559に明確なピーク($M+H$)を示し、ネガティブイオンモードで m/e 557に($M+H$)および593に($M+Cl$)のピークを示した。中間体2 (25mg)を、ジクロロメタン(DCM) 10ml 中でBOC-グリシン(8.9mg)、N,N-ジメチルアミノピリジン(DMAP) (2mg) およびジシクロヘキシルカルボジイミド(DIC) (1Mジクロロメタン溶液0.058ml)と18時間(室温、アルゴン下で)反応させた。反応混合物を処理して、フラッシュクロマトグラフィーによって精製し、C-20-O-(BOC)グリシネートを約50%の収率で得た。この生成物をトリフルオロ酢酸(TFA)の10% DCM溶液と1-2時間反応させ、20-O-グリシネート誘導体を得た。これを、1.2モル当量のスクシンイミジルマレイミドメチルシクロヘキサンカルボキシレート(SMCC)および1.5当量のDIEAを用いてDMF中で約3時間(室温、アルゴン下で)誘導体形成させた。溶媒を留去し、フラッシュクロマトグラフィーを行ったところ、7.8 mgの純粋な3をゴム状固形物として回収した。分析用HPLC(C18カラム、3ml/分で10分間で溶液Aから溶液「B」に変化するグラディエント溶出の後、100%「B」に5分間保持;「A」: 0.1% TFA水溶液;「B」: 90% CH_3CN /0.1% TFA)は、単一ピーク9.48分(360nmの吸光度)を示した。電子スプレー質量スペクトルは、 m/e 835に($M+H$)の質量ピークを示した。

【0077】

実施例2: イリノテカン(CPT-11)のC-20-O-(N'-MCC')グリシネート誘導体であって、MCCが4-(N-マレイミドメチル)-シクロヘキサン-1-カルボニル残基であるものの調製

【化8】

図2



CPT-11 (4) から出発して、BOC-グリシンと反応させ(精製生成物は電子スプレー質量スペクトルにおいて m/e 744に $M+H$ を示した)、TFAで脱保護し(質量スペクトルにおいて m/e 644に $M+H$ ピーク)、実施例1と同様にしてSMCCにカップリングすることによって、3段階処理法で生成物5を調製した。生成物は、実施例1と同様にして精製した。最終生成物5は、ポジティブイオンモード電子スプレー質量スペクトルにおいて m/e 863に強いピークを示し、分析用HPLCでは9.69分に明瞭なピークを示した。純粋な生成物5は白色固形物として得られ、25mgの量で生成した。

【0078】


実施例3: 10-ピペラジノカルボニルオキシカンブトテシン(6)の調製およびヘテロ二官能価ポリ(エチレングリコール)、マレイミド-PEG-NHSへのそのカップリング

(22)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【化 9】

図3



10

図3における中間体6の調製は、図1における2の調製の行程に沿ってピペリジノピペリジンの代わりにピペラジンを用いて行った。フラッシュクロマトグラフィー精製の後、6を43.3%の収率(橙色固形物)で得た。電子スプレー質量スペクトルは、 m/e 477に $M+H$ を示し、 m/e 475に $M+H$ (ネガティブイオンモード)を示した。7を調製するため、前駆体6を0.5モル当量のポリ(エチレングリコール- α -N-ヒドロキシスクシンイミジルプロピオネート、(β -マレイミド, MW 3400 (Shearwater Polymers, Huntsville, ALから入手)とDMF中で混合し、30分間インキュベーションした。反応混合物は、そのまま精製せずに用いた。活性化したCPTのモル含量は、使用した限定的PEG試薬のモル含量と等しいと考えた。

20

【0079】

実施例4：CPT誘導体3または5または7をモノクローナル抗体と接合させるための一般的手順

抗体を、20-40倍モル過剰量のジチオトレイトールおよびエチレンジアミン四酢酸(EDTA)(約5mM最終濃度)でpH 7.4で処理し、アルゴンを通じ、37°Cで45分間インキュベーションした。冷却した内容物を、遠心分離溶出条件(遠心分離SEC)下にて50mM酢酸ナトリウム-150mM塩化ナトリウム、pH 5.3(「ABS緩衝液」)中Sephadex G50/80の2本の連続した3mlカラムで精製した。溶出液を280nmでの吸光度を用いてタンパク質濃度について分析し、チオール含量をEllman分析法によって分析した。還元抗体は7-9チオール基を含んでいた。還元抗体を20倍モル過剰量のCPT誘導体とDMF中で反応させ、接合混合物中のDMFの最終濃度が $\leq 5\%v/v$ となるようにし、氷上(約4°C)で20-30分間インキュベーションした。Sephadex G50/80上ABS緩衝液で2回連続して遠心分離-SEC精製を行った後、溶出液を疎水性カラムを通過させて非共有結合CPT誘導体を除去し、最終的接合体を得た。7を用いる接合体の場合には、さらに30K MMCO遠心分離フィルター上での限外濾過による精製が必要であった。総ての調製物において、反応混合物並びに精製接合体は透明溶液であり、CPT誘導体の水溶性が用いられたことを示していた。SE-HPLCによる分析は、ガードカラムとイン・ライン吸光度検出器を備えた分析用SEC250カラム上で溶離剤として0.2Mリオン酸ナトリウムpH 6.8および流速として1ml/分を用いて行った。生成物は、260-540nmの領域で分光光度法による吸光度掃引によっても分析した。360nmでの吸光度をCPT-11標準品で得られた吸光度で補正して、接合体におけるCPT濃度を決定した。CPT誘導体からのスピルオーバー(spillover)について補正した280nmでの吸光度を用いて、抗体濃度を計算した。この方法で、CPT誘導体対IgGのモル比を決定した。生成物を10%(v/v)の1Mスクロースと混合し、1mgおよび0.1mgずつのロットに等分し、凍結乾燥した。凍結乾燥した調製物をアルゴン置換した後、冷凍庫に保管した。

30

40

【0080】

実施例5：10-ヒドロキシCPT, 3の誘導体のMAb接合体

接合体は、実施例4に記載の方法で調製した。下記のものは、様々な接合体に関するデータである。

50

(23)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【 0 0 8 1 】

3のネズミLL2 (抗CD-22 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾LL2の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 1.6%。接合体における3のモル置換(すなわち、3対IgG比)は、吸光度掃引により8.3であり、MALDI質量スペクトル分析により6であった。

【 0 0 8 2 】

3のネズミLL1 (抗CD-74 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾LL1の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 2.5%。接合体における3のモル置換(すなわち、3対IgG比)は、吸光度掃引により7.9であった。

【 0 0 8 3 】

3のネズミRS7(抗EGP-1 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾RS7の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 1.4%。接合体における3のモル置換(すなわち、3対IgG比)は、吸光度掃引により6.9であった。

【 0 0 8 4 】

3のヒト化LL2(抗CD-22 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾hLL2の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 0%。接合体における3のモル置換(すなわち、3対IgG比)は、吸光度掃引により7.1であった。

【 0 0 8 5 】

3のヒト化AFP31(抗AFP MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾hAFP31の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 0%。接合体における3のモル置換(すなわち、3対IgG比)は、吸光度掃引により8.0であった。

【 0 0 8 6 】

実施例6: CPT-11, 5の誘導体のMAAb接合体

接合体は、実施例4に記載の方法で調製した。下記のもの、様々な接合体に関するデータである。

【 0 0 8 7 】

5のネズミLL2 (抗CD-22 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾LL2の保持時間に溶出する単一ピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 2.2%。接合体における5のモル置換(すなわち、5対IgG比)は、吸光度掃引により9.7であった。

【 0 0 8 8 】

5のネズミLL1 (抗CD-74 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、未修飾LL1の保持時間に溶出するピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 8.8%。接合体における5のモル置換(すなわち、5対IgG比)は、吸光度掃引により10.9であった。

【 0 0 8 9 】

5のネズミ MN-14 (抗CEA MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、未修飾MN-14の保持時間に溶出するピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 9.3%。接合体における5のモル置換(すなわち、5対IgG比)は、吸光度掃引により10.0であった。

【 0 0 9 0 】

5のヒト化LL2(抗CD-22 MAAb) 接合体: 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、主として未修飾hLL2の保持時間に溶出するピークを示し、後者は280nmに設定した検出により同一条件下で分析した。総含量: 0%。接合体における5のモル置換(すなわち、5対IgG比)は、吸光度掃引により8.4であった。

(24)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【 0 0 9 1 】

実施例7：10-ヒドロキシCPT，7のPEG-誘導体のMAb接合体

接合体は、実施例4に記載の方法で調製した。下記のもの、様々な接合体に関するデータである。

【 0 0 9 2 】

7のネズミLL2（抗CD-22 MAb）接合体： 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、未修飾LL2の保持時間附近に溶出するピーク(83%)を示し、総含量は16.3%であった。接合体における7のモル置換(すなわち、7対IgG比)は、吸光度掃引により8.0であった。

【 0 0 9 3 】

7のネズミLL1（抗CD-74 MAb）接合体： 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、未修飾LL1の保持時間附近に溶出するピーク(94%)を示し、総含量は6.0%であった。接合体における7のモル置換(すなわち、7対IgG比)は、吸光度掃引により8.1であった。

【 0 0 9 4 】

7のネズミRS7（抗EGP-1 MAb）接合体： 360nmのCPT最大吸光度に設定した吸光度検出によるSE-HPLC分析は、未修飾RS7の保持時間附近に溶出するピークを示し、総含量は9.3%であった。接合体における7のモル置換(すなわち、7対IgG比)は、吸光度掃引により8.0であった。

【 0 0 9 5 】

実施例8：抗体上のリシンまたはチオール基への接合に適するアミノポリカルボキシレート
を付加した二官能価CPTの調製の一般的方法

一般的方法は、図4に示す。簡単に説明すれば、CPTおよび10-ヒドロキシ-CPTをSingerの方法(上記引用)によって相当するC-20-O-グリシネートに転換した。平行合成において、イソチオシアナトベンジルDTPAペンタ第三ブチルエステルを相当するアミン前駆体から生成させた後、S-トリチルシステインにカップリングした。フラッシュクロマトグラフィー精製により、中間体11(質量スペクトル：M+Na m/e 1207; M+H: 1183)を得た。

【 0 0 9 6 】

次に、中間体11をCPT誘導体9にカップリングさせた。第三ブチルカチオンを捕捉するためのスカベンジャーを用いてカルボキシレートの第三ブチル基とS-トリチル基をTFAによる脱保護を行った後、IgGに付加したマレイミド基への接合に適するDTPAを付加した二官能価CPT誘導体(R = HまたはOH)を得た。

【 0 0 9 7 】

チオール基は、過剰のジビニルスルホンで誘導体形成して、ビニルスルホン基を有する中間体を生成させ、これはジスルフィド還元した抗体のチオール基への接合に適する。

【 0 0 9 8 】

中間体13は、これらの変換においてイソチオシアナトベンジルDTPAの代わりに用いることができるアミノポリカルボキシレートのもう一つの例である。

10

20


30

(25)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【化 1 0】

図 4 (R = H for CPT or OH for 10-OH-CPT)



【 0 0 9 9】

実施例 9: SN-38 接合体の調製方法

SN-38は、プロドラッグCPT-11からイン・ビボで代謝により転換される活性薬剤である (Liehr, Giovanella, Verschraegen (監修)(上記引用))。SN-38は、トポイソメラーゼI活性の阻害においてCPT-11より3桁強力な活性化学療法薬である。抗体接合に適する二官能価SN-38は、下記の通りに簡単に調製される。すなわち、[CPT-11]-20-O-バリネートを、そのバリンN末端をBOCとして保護したものを、水酸化物のような塩基1当量を用いてそのC-10-カルバメートで選択的に開裂させる。カリウム第三ブトキ2当量と水1当量とから誘導されるような「無水水酸化物」(Gassman and Schenk, J. Org. Chem., 42: 918-920 (1977))は、この目的に有利に用いられる。CPTのバリネートエステルは、1N水酸化ナトリウム水溶液の1当量に少なくとも1時間安定であることが示されている。この方法により、C-10-カルバメートを選択的に開裂する。次に、バリン残基のアミノ基をイソチオシアネートに転換し、ペプチド鑄型MCC-Gly-Lys-Lys(R')-NHにカップリングする。あるいは、SN-38自身を、最初にメトキシトリチル誘導体のような酸感受性誘導体としてC10-ヒドロキシル基を保護することによって誘導体形成する。次に、C20-ヒドロキシル基をバリネートエステルに転換する。この時点で、C-10位のメトキシトリチル基を除去する。別の方法は、最初に相当する「BOC」エステルとしてC-10ヒドロキシルを保護し、20-ヒドロキシル基を誘導体形成し、脱保護することによってすることによってSN-38の20-バリネートエステル(または任意の他のエステル)誘導体を調製する。次に、これに続いてトリメチルシリルクロリドで処理して、C-10ヒドロキシルとC-20のエステルのアミノ基を誘導体形成させ、マレイミド-PEG-NHSのようなアミン反応性のヘテロ二官能価架橋剤と反応させ、C-10位のトリメチルシリル基を脱保護する。

(26)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【 0 1 0 0 】

上記の方法はCPT誘導体に限定されず、パクリタキセル、ゲルダナマイシンなどのような他の疎水性薬剤にも応用することができる。

【 0 1 0 1 】

上記の説明から、当業者であれば、本発明の本質的特徴を容易に突き止めることができ、発明の精神および範囲から離反することなく発明の様々な変化および変更を行い、過度の実験を行うことなく様々な用法および条件に適合させることができる。本明細書に引用した総ての特許明細書、特許出願明細書および公表文献の内容は、引用することに本明細書の開示の一部とされている。

(27)

J P 2006-511526 A 2006.4.6

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		PCT/GB 03/05454
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61K47/48 A61P35/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61K A61P		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, MEDLINE, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 708 146 A (BRASLAWSKY GARY R ET AL) 13 January 1998 (1998-01-13) claims; examples	I-41
Y	KING H D ET AL: "MONOCLONAL ANTIBODY CONJUGATES OF DOXORUBICIN PREPARED WITH BRANCHED LINKERS: A NOVEL METHOD FOR INCREASING THE POTENCY OF DOXORUBICIN IMMUNOCONJUGATES" BIOCONJUGATE CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, vol. 10, no. 2, March 1999 (1999-03), pages 279-288, XP000804254 ISSN: 1043-1802 abstract	I-41
-/-		
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *Z* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 12 March 2004		Date of mailing of the international search report 05/04/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2640, Tx: 31 651 epo.nl, Fax: (+31-70) 340-9010		Authorized officer Dideon, F

(28)

J P 2006- 511526 A 2006. 4. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/GB 03/05454

C. (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 00 76551 A (KRATZ FELIX ; KTB TUMORFORSCHUNGS GMBH (DE)) 21 December 2000 (2000-12-21)	1-11, 15, 26, 27, 32-35
Y	claims; example 1	1-41
X	CHARI R V J ET AL: "IMMUNOCONJUGATES CONTAINING NOVEL MAYTANSINOIDS: PROMISING ANTICANCER DRUGS" CANCER RESEARCH, AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, BALTIMORE, MD, US, vol. 52, no. 1, 1992, pages 127-131, XP000453560 ISSN: 0008-5472	1-11, 16-23, 26-29, 31, 32, 34, 35
Y	the whole document	1-41
X	EP 0 253 202 A (ONCOGEN) 20 January 1988 (1988-01-20)	1-12, 16-21, 26-29, 31, 32, 34, 35, 41
Y	examples V, VI	1-41
X	EP 0 306 943 A (NEORX CORP) 15 March 1989 (1989-03-15)	1-12, 16-21, 26-29, 31, 32, 34, 35, 41
Y	claims; examples claim 6	1-41
X	US 4 359 457 A (YOULE RICHARD J ET AL) 16 November 1982 (1982-11-16)	1-11, 16-21, 26-29, 31, 32, 34-41
Y	the whole document	1-41
Y	HEINDEL N D ET AL: "A NOVEL HETEROBIFUNCTIONAL LINKER FOR FORMYL TO THIOL COUPLING" BIOCONJUGATE CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, vol. 2, November 1991 (1991-11), pages 427-430, XP000983437 ISSN: 1043-1802 abstract	1-41

	--- --/--	

Form PCT/GB 03/05454 (continuation of second sheet) (January 2004)

page 2 of 3

(29)

J P 2006- 511526 A 2006. 4. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/GB 03/05454

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ROWLINSON-BUSZA G ET AL: "Targeted delivery of biologic and other antineoplastic agents." CURRENT OPINION IN ONCOLOGY, UNITED STATES DEC 1992, vol. 4, no. 6, December 1992 (1992-12), pages 1142-1148, XP009027478 ISSN: 1040-8746 the whole document -----	1-41

(30)

J P 2006- 511526 A 2006. 4. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/GB 03/05454

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5708146	A	13-01-1998	US 5622929 A	22-04-1997
			AU 666903 B2	29-02-1996
			AU 3188193 A	29-07-1993
			BG 61899 B1	30-09-1998
			CA 2087286 A1	24-07-1993
			CN 1074684 A ,B	28-07-1993
			CN 1207946 A	17-02-1999
			CN 1180711 A	06-05-1998
			CZ 9300057 A3	19-01-1994
			EG 20406 A	28-02-1999
			EP 0554708 A1	11-08-1993
			FI 930240 A	24-07-1993
			HU 68345 A2	28-06-1995
			JP 6025012 A	01-02-1994
			MX 9300298 A1	01-12-1993
			NO 930189 A	26-07-1993
			NZ 245725 A	28-08-1995
			OA 9859 A	15-08-1994
			PL 297514 A1	23-08-1993
			PL 172718 B1	28-11-1997
			PL 172837 B1	31-12-1997
			PL 172827 B1	31-12-1997
			PL 172715 B1	28-11-1997
			PL 172824 B1	31-12-1997
			RO 112618 B1	28-11-1997
			US 5606017 A	25-02-1997
			ZA 9300444 A	21-07-1993
WO 0076551	A	21-12-2000	DE 19926154 A1	14-12-2000
			AU 5970900 A	02-01-2001
			CA 2374964 A1	21-12-2000
			WO 0076551 A2	21-12-2000
			EP 1183050 A2	06-03-2002
			JP 2003501486 T	14-01-2003
EP 0253202	A	20-01-1988	US 4997913 A	05-03-1991
			AU 7466387 A	07-01-1988
			AU 636493 B2	29-04-1993
			AU 7813191 A	29-08-1991
			CA 1304293 C	30-06-1992
			EP 0253202 A2	20-01-1988
			EP 0428188 A2	22-05-1991
			JP 1876502 C	07-10-1994
			JP 5088686 B	24-12-1993
			JP 63115827 A	20-05-1988
EP 0306943	A	15-03-1989	US 5084560 A	28-01-1992
			US 4981979 A	01-01-1991
			AT 114479 T	15-12-1994
			AU 2209588 A	16-03-1989
			CA 1336496 C	01-08-1995
			DE 3852250 D1	12-01-1995
			DE 3852250 T2	29-06-1995
			EP 0306943 A2	15-03-1989
US 4359457	A	16-11-1982	JP 1163132 A	27-06-1989
			US 4440747 A	03-04-1984

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

(31)

J P 2006- 511526 A 2006. 4. 6

フロントページの続き

(51) Int. Cl.

F I

テーマコード (参考)

A 6 1 K 31/337 (2006. 01)	A 6 1 K 31/337	
A 6 1 K 31/704 (2006. 01)	A 6 1 K 31/704	
A 6 1 K 31/438 (2006. 01)	A 6 1 K 31/438	
A 6 1 K 31/427 (2006. 01)	A 6 1 K 31/427	
A 6 1 K 39/395 (2006. 01)	A 6 1 K 39/395	L
A 6 1 P 35/00 (2006. 01)	A 6 1 P 35/00	
A 6 1 P 37/06 (2006. 01)	A 6 1 P 37/06	
A 6 1 P 31/04 (2006. 01)	A 6 1 P 31/04	
A 6 1 P 31/10 (2006. 01)	A 6 1 P 31/10	
A 6 1 P 31/12 (2006. 01)	A 6 1 P 31/12	
A 6 1 P 33/02 (2006. 01)	A 6 1 P 33/02	
A 6 1 P 25/00 (2006. 01)	A 6 1 P 25/00	1 0 1
A 6 1 P 21/04 (2006. 01)	A 6 1 P 21/04	
A 6 1 P 29/00 (2006. 01)	A 6 1 P 29/00	1 0 1
A 6 1 P 3/10 (2006. 01)	A 6 1 P 3/10	
A 6 1 P 1/04 (2006. 01)	A 6 1 P 1/04	
A 6 1 P 1/16 (2006. 01)	A 6 1 P 1/16	
A 6 1 P 13/12 (2006. 01)	A 6 1 P 13/12	
A 6 1 P 7/06 (2006. 01)	A 6 1 P 7/06	
A 6 1 P 11/00 (2006. 01)	A 6 1 P 11/00	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RQ, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CQ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NI, NQ, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RQ, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(74) 代理人 100126099

弁理士 反町 洋

(72) 発明者 ブイ . セレングラム、ゴビンダン

アメリカ合衆国ニュージャージー州、サミット、パサイク、アベニュー、 1 0 6

F ターム(参考) 4C076 BB11 CC01 CC03 DD60 EE41 FF68

4C085 AA14 AA23 AA24 AA25 BB11 CC21

4C086 AA01 BA02 CA01 CB22 CB25 EA10 MA66 NA13 ZA02 ZA55

ZA59 ZA66 ZA68 ZA75 ZA81 ZA94 ZB08 ZB15 ZB26 ZB32

ZB33 ZB35 ZB38 ZC35

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2007-527872**(P2007-527872A)**(43) 公表日 **平成19年10月4日(2007. 10. 4)**

(51) Int. Cl.			F I		テーマコード (参考)	
A 6 1 K	31/4355	(2006.01)	A 6 1 K	31/4355	4 C O 3 4	
A 6 1 K	31/5377	(2006.01)	A 6 1 K	31/5377	4 C O 5 0	
A 6 1 K	31/473	(2006.01)	A 6 1 K	31/473	4 C O 6 3	
A 6 1 K	31/496	(2006.01)	A 6 1 K	31/496	4 C O 6 5	
A 6 1 K	31/4365	(2006.01)	A 6 1 K	31/4365	4 C O 7 1	
			審査請求 未請求 予備審査請求 未請求		(全 217 頁)	最終頁に続く
<hr/>						
(21) 出願番号	特願2007-501043 (P2007-501043)		(71) 出願人	504080179		
(86) (22) 出願日	平成17年2月25日 (2005. 2. 25)			イノテック ファーマシューティカルズ		
(85) 翻訳文提出日	平成18年10月16日 (2006. 10. 16)			コーポレイション		
(86) 国際出願番号	PCT/US2005/006243			アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 O		
(87) 国際公開番号	W02005/082368			1 9 1 5 ビヴァリー クミンズ センタ		
(87) 国際公開日	平成17年9月9日 (2005. 9. 9)			ー 1 0 0		
(31) 優先権主張番号	60/547, 899		(74) 代理人	100068755		
(32) 優先日	平成16年2月26日 (2004. 2. 26)			弁理士 恩田 博宣		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		(74) 代理人	100105957		
				弁理士 恩田 誠		
			(72) 発明者	ジャグタップ、ブラカシュ		
				アメリカ合衆国 O 1 9 1 5 マサチュー		
				セッツ州 ビバリー ブリッジ ストリー		
				ト 1 9 8		
<hr/>						
最終頁に続く						

(54) 【発明の名称】 イソキノリン誘導体及びその使用方法

(57) 【要約】

本発明は、イソキノリン誘導体、有効量のイソキノリン誘導体を含む組成物、及び必要に応じて有効量のイソキノリン誘導体を動物に投与することを含む、炎症性疾患、再灌流傷害、虚血性症状、腎不全、糖尿病、糖尿病合併症、循環器疾患以外の血管系疾患、循環器疾患、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害、パーキンソン病、又は癌を治療する又は予防する方法に関する。

(2)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

有効量の式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化 1】



(I)

式中、

R₅ は、O、NH又はSであり；

R₆ は、-H又は-C₁～C₅のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁R₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-(C₁～C₅アルキル)-(-3～7員環の単環式複素環)であり；

R₁₁及びR₁₂は、独立して水素、又は-C₁～C₁₀のアルキル又はNであり、R₁₁及びR₁₂は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁～C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁～C₅のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁～C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁～C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、-C₁～C₁₀のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-3～7員環の単環式複素環、-7～10員環の二環式複素環、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-(C₁～C₅のアルキレン)-NZ₁Z₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-(C₁～C₅のアルキル)-(-3～7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁～C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O-(C₁～C₅のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、-C₁～C₁₀のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₂～C₁₀のアルキニル、-アリール、-ベンジル、-C(O)OH、-C₁～C₅のアルキレン-C(O)O-(C₁～C₅のアルキル)又は-C₁～C₅のアルキレン-OC(O)-(C₁～C₅のアルキル)の1以上で置換され；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁～C₅のアルキル)、-C₁～C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁～C₅のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₃～C₈の単環式シクロアルキ

(3)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

ル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-OC(O)(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Z₁及びZ₂は独立して、-H又は-C₁~C₁₀のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；


nは0~5の整数である。

10

【請求項2】

有効量の式(II)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化2】



(II)

20

式中、

30

R₆は、-H又はC₁~C₅のアルキルであり；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A'-B'であり；

A'は、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

B'は、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-(C₁~C₅のアルキル)-(-3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-NZ₁Z₂であり；

40

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は、独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-OC(O)(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

50

(4)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；


B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-(\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環)、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$ 置換のアリール、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ フェニル、又は $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 、 $-\text{OH}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 3】

有効量の式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化 3】



(III)

式中、

X は、 $-\text{CH}_2-$ 又は $-\text{O}-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{CONH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル又は $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-\text{水素}$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり、

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、又は $-\text{NHCO}-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-\text{ヒドロキシ}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{アミノ}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{水素}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒にな

(5)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

って窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 4】

有効量の式 (IV) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化 4】



10

式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 5】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項 2 に記載の方法。

【請求項 7】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 8】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項 4 に記載の方法。

【請求項 9】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 2 に記載の方法。

【請求項 11】

20

30

40

50

(6)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 1 2】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 4 に記載の方法。

【請求項 1 3】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 9 に記載の方法。

【請求項 1 4】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 5】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 6】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 1 2 に記載の方法。

【請求項 1 7】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン- 2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 1 に記載の方法。


【請求項 1 8】

化合物が、

【化 5】

10

20



30

又は薬学上許容可能なその塩である請求項 1 7 に記載の方法。

【請求項 1 9】

薬学上許容可能な塩がメシル酸塩である請求項 1 8 に記載の方法。

【請求項 2 0】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン- 2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 2 に記載の方法。

40

【請求項 2 1】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン- 2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 3 に記載の方法。

【請求項 2 2】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン- 2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 4 に記載の方法。

【請求項 2 3】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とからなる組成物、又はその薬学上許


50

(7)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

容可能な塩。

【化6】



(I)

式中、

R₅ は、O、NH又はSであり；R₆ は、-H又は-C₁～C₅のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁R₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-(C₁～C₅アルキル)-(3～7員環の単環式複素環)であり；

R₁₁及びR₁₂は、独立して水素、又は-C₁～C₁₀のアルキル又はNであり、R₁₁及びR₁₂は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁～C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁～C₅のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁～C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁～C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)_n-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、-C₁～C₁₀のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-3～7員環の単環式複素環、-7～10員環の二環式複素環、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-(C₁～C₅のアルキレン)-NZ₁, Z₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-(C₁～C₅のアルキル)-(3～7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁～C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O-(C₁～C₅のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、-C₁～C₁₀のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₂～C₁₀のアルキニル、-アリール、-ベンジル、-C(O)OH、-C₁～C₅のアルキレン-C(O)O-(C₁～C₅のアルキル)又は-C₁～C₅のアルキレン-OC(O)-(C₁～C₅のアルキル)の1以上で置換され；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁～C₅のアルキル)、-C₁～C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁～C₅のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁～C₅アルキル)、-OC(O)(C₁～C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Z₁及びZ₂は独立して、-H又は-C₁～C₁₀のアルキルであり、それは置換され

10

20

30

40

50

(8)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


ないか、又は-ハロ、-OH又は-N(Z_3)(Z_4)の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

nは0~5の整数である。

【請求項24】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化7】



(II)

式中、

R₆は、-H又はC₁~C₅のアルキルであり；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A'-B'であり；

A'は、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

B'は、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-(C₁~C₅のアルキル)-(3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-NZ₁Z₂であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は、独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-OC(O)(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-O-、-CO-、-OC(O)-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-

10

20

40

50

(9)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ル) - 、 - NH - 、 - CH₂ - 、 - S - 又は - C(S) - であり ;

B は、 - C₁ ~ C₁₀ のアルキル、 - C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、 - 3 ~ 7 員環の単環式複素環、 - 7 ~ 10 員環の二環式複素環、 - C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、 - アリール、 - (C₁ ~ C₅ のアルキル) - (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環)、 - H₂NC(O) - 置換のアリール、 - C(O)OH、 - C(O)O - (C₁ ~ C₅ のアルキル)、 - C(O)O - フェニル、又は - NZ₁Z₂ であり ;


Z₁ 及び Z₂ は、独立して、 - H 又は - C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、 - OH 又は - N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して - H 又は - C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、 - ヒドロキシ又は - NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し ; 或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

10

【請求項 25】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 8】



20

30

式中、

X は、 - CH₂ - 又は - O - であり ;

R₂ 及び R₃ は独立して、 - 水素、 - ハロ、 - ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、 - ヒドロキシ、 - O - (C₁ ~ C₅ のアルキル)、 - C₁ ~ C₅ のアルキル、 - NO₂、 - NH₂、 - CONH₂、 - C(O)OH、 - OC(O) - C₁ ~ C₅ のアルキル又は - C(O)O - C₁ ~ C₅ のアルキルであり ;

R₈ 及び R₉ は独立して、 - 水素又は - A - B であり、

A は、 - SO₂ - 、 - SO₂NH - 、又は - NHCO - であり ;

B は、 - C₁ ~ C₅ のアルキル、 - NZ₁Z₂、 - 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、 - アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、 - 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され ; 且つ

40

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、 - 水素又は - C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して - H 又は - C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し ; 或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

50


(10)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【請求項 26】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(IV)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化9】



10

式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

20

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCO-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-H$ 、 $-OH$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ


n は0～5の整数である。

【請求項 27】

30

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(I)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化10】



40

式中、

R_5 は、 O 、 NH 又は S であり；

R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

50

(11)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

Xは、 $-\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}(\text{ハロ})-$ 、 $-\text{CH}(\text{OH})-(\text{CH}_2)_n$ 、 $-\text{CH}(\text{OH})-$ 、 $-\text{CH}(-\text{アリーール})-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{CH}(\text{NR}_{11}\text{R}_{12})-$ 、又は $-\text{N}(\text{SO}_2\text{Y})-$ であり、その際、Yは、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{NH}_2$ 又は $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{ハロ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

Aは、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-(\text{CH}_2)-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

Bは、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキレン})-\text{NZ}_1$ 、 Z_2 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$ 置換のアリーール、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{フェニル}$ 、又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ であり、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{窒素含有の}\mathbf{3 \sim 7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルキニル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{ベンジル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキレン}-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキレン}-\text{OC}(\text{O})-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{ハロ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{OC}(\text{O})(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{OH}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

n は $0 \sim 5$ の整数である。

【請求項28】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(13)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 29】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 12】



(III)

式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ~ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 30】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(14)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化13】



10

式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCO-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、他の基が水素であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-H 又は -C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H、-OH 又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H、-ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

20


n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項31】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、及び式(I)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化14】

30



40

式中、

R₅ は、O、NH 又は S であり；R₆ は、-H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

X は、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁R₁₂)-、又は -N(SO₂Y)- であり、その際、Y は、-OH、-NH₂ 又は -(C₁ ~ C₅ アルキル)- (3 ~ 7 員環の単環式複素環) であり；

50

(15)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 32】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(17)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 33】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 16】



(III)

10

式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ~ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

30

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

40


【請求項 34】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(18)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 7】



10

式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

20


 n は 0～5 の整数である。

【請求項 35】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は薬学上許容可能な化合物の塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 1 8】

30



40

式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ ($3 \sim 7$ 員環の単環式複素環) であり；

50

(19)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ～ 5 の整数である。


【請求項 36】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(20)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 19】



(II)

10

式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

20

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

30

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

40

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は

50

(21)


JP 2007-527872 A 2007.10.4

一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項37】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(III)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化20】



(III)

式中、

Xは、-CH₂-又は-O-であり；

R₂及びR₃は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換されたC₁～C₅のアルキル、-ヒドロキシ、-O-(C₁～C₅のアルキル)、-C₁～C₅のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁～C₅のアルキル又は-C(O)O-C₁～C₅のアルキルであり；

R₈及びR₉は独立して、-水素又は-A-Bであり、

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、又は-NHCO-であり；

Bは、-C₁～C₅のアルキル、-NZ₁Z₂、-3～7員環の単環式複素環又は-7～10員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁～C₁₀のアルキル又はヒドロキシ置換されたC₁～C₅のアルキルで置換されないか、又は置換された-ヒドロキシ置換されたC₁～C₅のアルキル、-アミノ置換されたC₁～C₅のアルキル、-3～7員環の単環式複素環又は-7～10員環の二環式複素環の1以上で置換され；且つ

Z₁及びZ₂は、独立して、-水素又は-C₁～C₈のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁～C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。


【請求項38】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(IV)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(22)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 1】



10

式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

20


 n は 0～5 の整数である。

【請求項 39】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 2】

30



40

式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ であり；

50

(23)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 40】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(I)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(25)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 4 1】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I I I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 4】



(III)

式中、

X は、- CH₂ - 又は - O - であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- ヒドロキシ、- O - (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₅ のアルキル、- NO₂、- NH₂、- CONH₂、- C (O) OH、- OC (O) - C₁ ~ C₅ のアルキル又は - C (O) O - C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、- 水素又は - A - B であり、

A は、- SO₂ -、- SO₂ NH -、又は - NHCO - であり；

B は、- C₁ ~ C₅ のアルキル、- NZ₁Z₂、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、- 水素又は - C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - N (Z₃) (Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して - H 又は - C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 4 2】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I V) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(26)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 5】



10

式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ


20

 n は 0～5 の整数である。

【請求項 43】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化 2 6】



30

式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H口)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環) であり；

 R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R

50

(27)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、- 水素、- ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S - 又は - C(S) - であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NZ_1Z_2 、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン}) - NZ_1, Z_2$ 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル}) - (- 3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O$ - フェニル、又は - $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は - $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は - $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- ハロ、- ヒドロキシ、- NO_2 、- CN 、- NZ_1Z_2 、- 窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、- アリール、- ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $OC(O) - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 44】

有効量の、式 (II) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じ動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(29)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 45】

有効量の、式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化 28】



(III)

式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ~ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 46】

有効量の、式 (IV) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(30)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 9】



10

式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-H$ 、 $-OH$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

20

n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 4 7】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘤、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 3 に記載の方法。

【請求項 4 8】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘤、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 4 に記載の方法。

30

【請求項 4 9】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘤、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 5 に記載の方法。

【請求項 5 0】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘤、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 6 に記載の方法。

40


【請求項 5 1】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

(31)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 0】



(I)

10

式中、

 R_5 は、O、NH又はSであり； R_6 は、-H又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH$ (ハロ) $-$ 、 $-CH(OH)-$ (CH_2) $_n$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH$ (アリール) $-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、Yは、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

Bは、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1$ 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、-H又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、Z

40

50

(32)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-H_2O$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 52】

有効量の、式 (II) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化 31】



式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H_2O$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-H_2O$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H_2O$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環

(33)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル) - (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O$ - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C(O)O$ - フェニル、又は - NZ_1Z_2 であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

10

【請求項 53】

有効量の、式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化 32】



(III)

20

式中、

X は、- CH_2 - 又は - O - であり；

R_2 及び R_3 は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- ヒドロキシ、- O - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NO_2 、- NH_2 、- $CONH_2$ 、- $C(O)OH$ 、- $OC(O)$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキル又は - $C(O)O$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

30

R_8 及び R_9 は独立して、- 水素又は - A - B であり、

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、又は - $NHCO$ - であり；

B は、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NZ_1Z_2 、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

40

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- 水素又は - $C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 54】


有効量の、式 (IV) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

50

(34)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 3】



10

式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCO-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、他の基が水素であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-H 又は -C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H、-OH 又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、
 Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H、-ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ
 n は 0 ~ 5 の整数である。

20

【請求項 55】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 51 に記載の方法。

【請求項 56】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 52 に記載の方法。

【請求項 57】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 53 に記載の方法。

30


【請求項 58】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 54 に記載の方法。

【請求項 59】

式 (IV) の化合物又は薬学上許容可能なその塩。

【化 3 4】



40

式中、

50

(35)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；
 R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；
 Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-H_2O$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ
 n は 0 ～ 5 の整数である。

10

【請求項 60】

R_{14} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{15} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 61】

R_{15} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{14} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 62】

n が 1 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

20

【請求項 63】

n が 2 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 64】

n が 3 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 65】

n が 4 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 66】

n が 5 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 67】

生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクル及び有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を含む組成物。

30

【請求項 68】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、再灌流傷害を治療する方法。

【請求項 69】

再灌流傷害が、脳卒中又は心筋梗塞である請求項 68 に記載の方法。

【請求項 70】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、炎症性疾患を治療する方法。

【請求項 71】

炎症性疾患が、関節の炎症性疾患、歯肉の慢性炎症性疾患、炎症性腸疾患、炎症性肺疾患、中枢神経系の炎症性疾患、目の炎症性疾患、グラム陽性のショック、グラム陰性のショック、出血性ショック、アナフィラキシー性ショック、外傷性ショック又は化学療法のショックである請求項 70 に記載の方法。

40

【請求項 72】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、糖尿病及び糖尿病合併症を治療する方法。

【請求項 73】

糖尿病が、I 型糖尿病又は II 型糖尿病である請求項 72 に記載の方法。

【請求項 74】

50

(36)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、虚血性の症状を治療する方法。

【請求項 7 5】

虚血性の症状が、心筋虚血、安定狭心症、不安定狭心症、脳卒中、虚血性心疾患又は脳虚血である請求項 7 4 に記載の方法。

【請求項 7 6】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、臓器移植の結果生じる再酸化化傷害を治療する方法。

【請求項 7 7】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、パーキンソン病を治療する方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、イソキノリン誘導体、有効量のイソキノリン誘導体を含む組成物、及び必要に応じて有効量のイソキノリン誘導体を動物に投与することを含む、炎症性疾患、再灌流傷害、虚血性症状、腎不全、糖尿病、糖尿病合併症、循環器疾患以外の血管系疾患、循環器疾患、臓器移植の結果生じる再酸化化傷害、パーキンソン病、又は癌を治療する又は予防する方法に関する。

【0002】

本出願は、2004年2月26日出願された米国特許仮出願第60/547,899号の恩典を主張し、その全体を参照によって本明細書に組み入れる。

【背景技術】

【0003】

たとえば、関節炎、大腸炎及び自己免疫性糖尿病のような炎症性疾患は通常、たとえば、脳卒中や心臓発作のような再灌流傷害に関連するものとははっきり異なった障害として表れ、臨床的に異なった存在として表すことができる。しかしながら、これら2つの障害の間には共通する基礎を成すメカニズムが存在しうる。特に、炎症性疾患及び再灌流傷害は、炎症誘発性サイトカイン及びケモカインの合成を誘導し、それは、次には、たとえば、一酸化窒素及びスーパーオキシドのような細胞傷害性の遊離ラジカルを結果として生じる。NOとスーパーオキシドが反応してペルオキシ亜硝酸(ONOO⁻)を形成することがある(非特許文献1)。

【0004】

炎症性疾患及び再灌流傷害で認められるONOO⁻が誘導する細胞壊死には、核内酵素、ポリ(ADP-リボース)合成酵素(PARS)の活性化が関与する。PARSの活性化は、炎症性疾患及び再灌流傷害で認められる細胞介在性の死における重要な工程であると考えられる(非特許文献2)。

【0005】

多数のPARS阻害剤が当該技術で記載されている。たとえば、非特許文献3及び非特許文献4~9、特許文献1~11を参照のこと。PARS阻害剤の投与に関連する有害な影響は、非特許文献10で議論されている。

【0006】

イソキノリン化合物は当該技術で以前議論されている。たとえば、細胞傷害性の非カンプトセイントボイソメラーゼI阻害剤は、非特許文献11,12で報告されており、インデノ[1,2-c]イソキノリン類は、抗癌剤として特許文献12及び腫瘍阻害剤として特許文献13に報告されている。

【0007】

イソキノリン化合物の合成は報告されている(たとえば、非特許文献13~17を参照)。

10

20

30

40

50

(37)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

- 【特許文献1】国際公開第WO00/39104号
 【特許文献2】国際公開第WO00/39070号
 【特許文献3】国際公開第WO99/59975号
 【特許文献4】国際公開第WO99/59973号
 【特許文献5】国際公開第WO99/11649号
 【特許文献6】国際公開第WO99/11645号
 【特許文献7】国際公開第WO99/11644号
 【特許文献8】国際公開第WO99/11628号
 【特許文献9】国際公開第WO99/11623号
 【特許文献10】国際公開第WO99/11311号 10
 【特許文献11】国際公開第WO00/42040号
 【特許文献12】国際公開第WO00/21537号、クッシュマン (Cushman) 等
 【特許文献13】国際公開第WO93/05023号、ハーバタ (Hrbata) 等
 【特許文献14】米国特許第5,262,564号
 【特許文献15】米国特許第3,710,795号
 【非特許文献1】ゼイボー (Szabo) 等、Shock 第6巻、79~88ページ (1996年)
 【非特許文献2】ゼイボー (Szabo) 等、Trends Pharmacol. Sci. 第19巻、287~298ページ (1998年) 20
 【非特許文献3】バナジック (Banasik) 等、J. Biol. Chem 第267巻、1569~1575ページ (1992年)
 【非特許文献4】バナジック (Banasik) 等、Mol. Cell. Biochem 第138巻、185~197ページ (1994年)
 【非特許文献5】ザング (Zhang) 等、Biochem Biophys. Res. Commun. 第278巻、590~598ページ (2000年)
 【非特許文献6】ホワイト (White) 等、J. Med. Chem 第43巻、4084~4097ページ (2000年)
 【非特許文献7】グリフィン (Griffin) 等、J. Med. Chem 第41巻、5247~5256ページ (1998年) 30
 【非特許文献8】シンクウィン (Shinkwin) 等、Bioorg. Med. Chem 第7巻、297~308ページ (1999年)
 【非特許文献9】ソリアーノ (Soriano) 等、Nature Medicine 第7巻、108~113ページ (2001年)
 【非特許文献10】ミラン (Milan) 等、Science 第223巻、589~591ページ (1984年)
 【非特許文献11】クッシュマン (Cushman) 等、J. Med. Chem 第43巻、3688~3698ページ (2003年)
 【非特許文献12】クッシュマン (Cushman) 等、J. Med. Chem 第42巻、446~457ページ (1999年) 40
 【非特許文献13】ワウゾネック (Wawzonek) 等、Org. Prep. Proc. Int. 第14巻、163~168ページ (1982年)
 【非特許文献14】ワウゾネック (Wawzonek) 等、Can J. Chem 第59巻、2833ページ (1981年)
 【非特許文献15】アンドイ (Andoi) 等、Bull. Chem. Soc. Japan, 第47巻、1014~1017ページ (1974年)
 【非特許文献16】ドゥーズマンド (Dusemund) 等、Arch. Pharm. (Weinheim Ger), 第3巻17、381~382ページ (1984年)
 【非特許文献17】ラル (Lal) 等、Indian J. Chem, Sect. B, 38B、33~39ページ (1999年) 50

(38)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 発 明 の 開 示 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 0 0 0 8 】

しかしながら、炎症性疾患、再灌流傷害、虚血性症状、腎不全、糖尿病、糖尿病合併症、循環器疾患以外の血管系疾患、又は癌を治療する又は予防するのに有用な化合物に対する当該技術におけるニーズは残されたままである。

【 0 0 0 9 】

本出願の背景技術の項目における参考文献の引用は、参考文献が従来技術であるという承認ではない。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

10

【 0 0 1 0 】

従って、一実施形態では、本発明は、以下で述べるような式 I、式 I I、式 I I I、式 I V の化合物又は薬学上許容可能なその塩（「イソキノリン誘導体」）に関する。イソキノリン誘導体は、炎症性疾患、再灌流傷害、虚血性症状、腎不全、糖尿病、糖尿病合併症、循環器疾患以外の血管系疾患、循環器疾患、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害、パーキンソン病、又は癌（それぞれ「症状」であること）を治療する又は予防するのに有用である。

【 0 0 1 1 】

また、有効量のイソキノリン誘導体及び薬学上許容可能なキャリア又はビヒクルを含む組成物が提供される。

20


また、本発明によって、そのような治療又は予防の必要に応じて動物に、有効量のイソキノリン誘導体を投与することを含む、症状を治療する又は予防する方法が提供される。

【 0 0 1 2 】

(39)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 化 1 】




10

(I)




20

(II)



30

(III)



40

(IV)

【 0 0 1 3 】

50

(40)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

本発明の詳細は、以下に続く説明で述べられる。

本明細書に記載されるものに類似した又はそれと同等のいかなる方法及び材料も本発明の実践又は試験において使用することができるが、今や、例示となる方法及び材料が記載される。本発明のそのほかの特徴、目的及び利点は、以下の説明及び請求項から明白になるであろう。本明細書で引用される参考文献はすべて参照によって組み入れられる。

【発明を実施するための最良の形態】


【0014】

本発明は、以下の式 I、式 II、式 III 及び式 IV に従ったイソキノリン誘導体及び薬学上許容可能なその塩を提供する。

【0015】

10

【化2】



(I)

20

【0016】

式中、

R₅ は、O、NH又はSであり；

R₆ は、-H又は-C₁～C₅のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁NR₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-(C₁～C₅アルキル)-(-3～7員環の単環式複素環)であり；

R₁₁及びR₁₂は、独立して水素、又は-C₁～C₁₀のアルキル又はNであり、R₁₁及びR₁₂は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁～C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁～C₅のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁～C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁～C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、-C₁～C₁₀のアルキル、-C₂～C₁₀のアルケニル、-3～7員環の単環式複素環、-7～10員環の二環式複素環、-C₃～C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-(C₁～C₅のアルキレン)-NZ₁, Z₂、-アミノ置換のC₁～C₅のアルキル、-(C₁～C₅のアルキル)-(-3～7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁～C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O-(C₁～C₅のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、

50

(41)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

- 窒素含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $C(O)O-(C_1 \sim C_5)$ のアルキル又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $OC(O)-(C_1 \sim C_5)$ のアルキルの1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5)$ のアルキル、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5)$ アルキル、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5)$ アルキル、 $-NO_2$ 又は-A-Bであり；

10

Z_1 及び Z_2 は独立して、-H又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して-H又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

nは0～5の整数である。

【0017】

実施態様の1つでは、Xは $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(\text{ハロ})-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-\text{アリール})-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、又は $-CH(NR_{11}R_{12})-$ であり、その際、nは0～5の整数である。

20

【0018】

実施態様の1つでは、 R^5 はOである。

別の実施態様では、 R^5 はSである。

さらなる実施態様では、 R^5 はNHである。

【0019】

別の実施態様では、Xは $-N(SO_2Y)-$ である。

実施態様の1つでは、Aは $-SO_2-$ 又は $-SO_2NH-$ である。

別の実施態様では、Bは、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5)$ のアルキル- $-(3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5)$ のアルキル、又は $-C(O)O-$ フェニルであり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5)$ のアルキル、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキル、又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキルの1以上で置換される。

30

【0020】

別の実施態様では、 $R_1 \sim R_4$ は水素である。

さらなる実施態様では、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は水素以外である。

40

【0021】

実施態様の1つでは、 $R_7 \sim R_{10}$ は、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-OAc$ 又は $NHC(O)-(CH_2)_n-OH$ である。

他の例示となる実施態様では、式Iの化合物中の R^5 及びXは、以下に述べるとおりである。

【0022】

(42)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 表 1 】

R^5	X
NH	-C(O)-
NH	-CH ₂ -
NH	-CH(halo)-
NH	-CH(OH)CH ₂) _n -
NH	-CH(OH)-
NH	-CH(-aryl)-
NH	-O-
NH	-NH-
NH	-S-
NH	-CH(NR ¹¹ R ¹²)-
NH	-N(SO ₂ Y)-
S	-C(O)-
S	-CH ₂ -
S	-CH(halo)-
S	-CH(OH)(CH ₂) _n -
S	-CH(OH)-
S	-CH(-aryl)-
S	-O-
S	-NH-
S	-S-
S	-CH(NR ¹¹ R ¹²)-
O	-N(SO ₂ Y)-
O	-C(O)-

10

20

30

40

(43)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

R^5	X
O	$-\text{CH}_2-$
O	$-\text{CH}(\text{halo})-$
O	$-\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_n-$
O	$-\text{CH}(\text{OH})-$
O	$-\text{CH}(\text{-aryl})-$
O	$-\text{O}-$
O	$-\text{NH}-$
O	$-\text{S}-$
O	$-\text{CH}(\text{NR}^{11}\text{R}^{12})-$
O	$-\text{N}(\text{SO}_2\text{Y})-$

10


20

【 0 0 2 3 】

別の実施態様では、式 (I) の化合物は、式 (I a) を有する

【 0 0 2 4 】

【 化 3 】



30

40

【 0 0 2 5 】

式中、 R_8 及び R_9 は、式 I と同義である。

実施態様の 1 つでは、式 (I a) の化合物は、 R_8 が $-\text{H}$ 、 R_9 が $-\text{A}-\text{B}$ であり、A が $-\text{SO}_2-$ 及び B が $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 又は $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキレン})\text{NZ}_1\text{Z}_2$ であるようなものである。

【 0 0 2 6 】

式 (I a) の化合物の例示となる例は、以下に述べられる：

【 0 0 2 7 】

(44)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 表 2 】

化合物	R ₈	R ₉
43	-H	-NHC(O)CH ₂ N(CH ₃) ₂
44	-H	-SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -(morpholin-4-yl)
45	-NHC(O)CH ₂ N(CH ₃) ₂	-H
46	-SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -(morpholin-4-yl)	-H
97	-NO ₂	-H
98	-H	-NO ₂
99	-F	-H
100	-H	-F
101	-NH ₂	-H
102	-H	-NH ₂
103	-H	-NHCOCH ₂ OAc
104	-H	-NHCOCH ₂ OH
105	-H	-NHCONH-n-propyl
106	-H	-SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -phenyl
107	-F	-SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -morpholine
108	-F	-SO ₂ NH-morpholine
109	-F	-SO ₂ -imidazole
110	-H	-SO ₃ Na
111	-SO ₃ Na	-H

10

20

30

【 0 0 2 8 】

及び薬学上許容可能なその塩である。


別の実施態様では、式 (I) の化合物は式 (I b) を有し

【 0 0 2 9 】

(45)

J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

【 化 4 】



(Ib)

10

【 0 0 3 0 】

式中、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は式(Ⅰ)と同義である。

式(Ⅰb)の化合物の例示となる例は、以下に述べられる：

【 0 0 3 1 】

(46)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【表 3】

化合物	R ₇	R ₈	R ₉	R ₁₀
22a	-H	-H	-H	-H
22b	-H	-OMe	-H	-H
22c	-H	-H	-OMe	-H
22d	-H	-H	-H	-OMe
22e	-H	-Me	-H	-H
22f	-H	-COOH	-H	-H
22g	-H	-H	-COOH	-H
23a	-H	-OH	-H	-H
23b	-H	-H	-OH	-H
23c	-H	-H	-H	-OH
25a	-H	-H	-(CH ₂) ₄ OH	-H
25b	-H	-H	-(CH ₂) ₅ OH	-H
25c	-H	-H	-(CH ₂) ₆ OH	-H
25d	-H	-H	-(CH ₂) ₄ COOH	-H
25e	-H	-H	-(CH ₂) ₅ COOH	-H
26a	-H	-C(O)NH(CH ₂) ₃ -(morpholin-1-yl)	-H	-H
26b	-H	-C(O)NH(CH ₂) ₂ -COOH	-H	-H
26c	-H	-C(O)NH(CH ₂) ₃ -N-(1,3-imidazole)	-H	-H
26d	-H	-C(O)NH(CH ₂) ₂ -NMe ₂	-H	-H
26e	-H	-H	-SO ₃ Na	-H
26f	-H	-SO ₃ Na	-H	-H

【0032】

及び薬学上許容可能なその塩である。


別の実施態様では、式(I)の化合物は式(Ic)を有し

【0033】

(47)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化5】



10

【0034】

式中、X及びR₉は式(I)と同義である。

式(Ic)の化合物の例示となる例は、以下に述べられる：

【0035】

【表4】

化合物	X	R ₉
34	-N(SO ₃ H)-	-SO ₃ H
35a	-N(SO ₂ NH ₂)-	-SO ₂ NH ₂
35b	-N[SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -(morpholin-4-yl)]-	-SO ₂ NH(CH ₂) ₃ -(morpholin-4-yl)
40a	-S-	-H

20

30


【0036】

及び薬学上許容可能なその塩である。

別の実施態様では、式(I)の化合物は式(Id)を有し

【0037】

【化6】



40

【0038】

50

(48)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

式中、Bは式(I)の化合物と同義である。


実施態様の1つでは、Bは、 $-\text{NH}_2$ 又は $-\text{OH}$ で置換された $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキレン})-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 又は $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキレン})$ である。

【0039】

本発明はまた、式IIの化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【0040】

【化7】



(II)

【0041】

式中、

R_6 は、 $-\text{H}$ 又は $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{H}$ 置換の $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5\text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}'-\text{B}'$ であり；

A' は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-(\text{CH}_2)-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

B' は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5\text{のアルキル}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-(\text{3} \sim \text{7} \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$ 置換のアリール、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{フェニル}$ 、又は $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{H}$ 置換の $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の}\text{C}_1 \sim \text{C}_5\text{のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{OC}(\text{O})(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-(\text{3} \sim \text{7} \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$

(49)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-NZ₁Z₂であり；

Z₁及びZ₂は、独立して、-H又は-C₁~C₁₀のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成する。

【0042】

実施態様の1つでは、Bは、窒素含有の3~7員環の単環式複素環である。

10

さらに別の実施態様では、R₁は、-水素、-ハロ、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A'-B'であり；

A'は、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-CH₂-、-S-又は-C(S)-であり；

B'は、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₁~C₅のアルキル-(-3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又はNZ₁Z₂である。

20

【0043】

さらなる実施態様では、R₁、R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀の少なくとも1つが水素ではない。

別の実施態様では、R₂、R₄及びR₁₀の少なくとも1つが水素ではない。

【0044】


実施態様の1つでは、Aは-CONH-以外である。

本発明はまた、式IIIの化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【0045】

30

【化8】



(III)

40

【0046】

式中、

Xは、-CH₂-又は-O-であり；

R₂及びR₃は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換されたC₁~C₅のアルキル、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₅のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁~C₅のアルキル又は-

50

(50)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

C(O)O-C₁~C₅のアルキルであり；

R₈及びR₉は独立して、-水素又は-A-Bであり、

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、又は-NHCO-であり；

Bは、-C₁~C₅のアルキル、-NZ₁Z₂、-3~7員環の単環式複素環又は-7~10員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁~C₁₀のアルキル又はヒドロキシ置換されたC₁~C₅のアルキルで置換されないか、又は置換された-ヒドロキシ置換されたC₁~C₅のアルキル、-アミノ置換されたC₁~C₅のアルキル、-3~7員環の単環式複素環又は-7~10員環の二環式複素環の1以上で置換され；且つ

Z₁及びZ₂は、独立して、-水素又は-C₁~C₈のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成する。

【0047】

実施態様の1つでは、Xは-CH₂-である。

別の実施態様では、Xは-O-である。

実施態様の1つでは、R₈は水素であり、R₉は-A-Bである。

【0048】

別の実施態様では、R₈は-A-Bであり、R₉は水素である。

実施態様の1つでは、R₈は水素であり、R₉は-A-Bであるか、又はR₈は-A-Bであり、R₉は水素であるのいずれかである。

【0049】

さらに別の実施態様では、R₂、R₃及びR₈は水素であり、R₉は、Aが-SO₂-又は-SO₂-NH-である-A-Bである。


さらなる実施態様では、R₂、R₃、R₈及びR₉の少なくとも1つは水素ではない。

【0050】

本発明はさらに、式13の化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【0051】

【化9】



13

【0052】

式中、

R₁、R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は、独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)

10

20

30

40

50

(51)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

OH、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{OC}(\text{O})(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキレン})-\text{NZ}_1, \text{Z}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の}$
 $\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-(\text{3} \sim \text{7} \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$ 置換のアリール、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{フェニル}$ 、又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ であり、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ 以外のそれぞれが、置換されないか、又は $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{窒素含有の3} \sim \text{7} \text{ 員環の単環式複素環}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルキニル、 $-\text{アリール}$ 、 $-\text{ベンジル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキレン}-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキレン}-\text{OC}(\text{O})-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{OH}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【0053】

実施態様の1つでは、 R_9 は $-\text{A}-\text{B}$ であり、その際、A は $-\text{SO}_2-$ 又は $-\text{SO}_2-\text{NH}-$ である。

別の実施態様では、 $\text{R}_1 \sim \text{R}_4$ はそれぞれ水素である。

【0054】

さらなる実施態様では、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} の少なくとも1つは水素以外である。


実施態様の1つでは、A は $-\text{CONH}-$ 以外である。

【0055】

本発明はさらにその上、式22の化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【0056】

【化10】



22

(52)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 0 0 5 7 】

式中、

 $R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式 1 3 と同義である。

実施態様の 1 つでは、 R_9 は $-A-B$ であり、その際、 A は $-SO_2-$ 又は $-SO_2-NH-$ である。

【 0 0 5 8 】

別の実施態様では、 $R_1 \sim R_4$ はそれぞれ水素である。


さらなる実施態様では、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} の少なくとも 1 つは水素以外である。

【 0 0 5 9 】

本発明はさらにその上、式 3 7 の化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【 0 0 6 0 】

【 化 1 1 】



37

【 0 0 6 1 】

式中、

 $R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式 1 3 と同義である。

実施態様の 1 つでは、 $R_1 \sim R_4$ はそれぞれ水素である。

【 0 0 6 2 】

別の実施態様では、 R_9 は $-A-B$ であり、その際、 A は $-SO_2-$ 又は $-SO_2-NH-$ である。

さらなる実施態様では、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} の少なくとも 1 つは水素以外である。

【 0 0 6 3 】

本発明はまた、式 4 0 の化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【 0 0 6 4 】

10


20

30

(53)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 化 1 2 】



40

10

【 0 0 6 5 】

式中、

$R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式 13 と同義である。

実施態様の 1 つでは、 $R_1 \sim R_4$ はそれぞれ水素である。

【 0 0 6 6 】

実施態様の 1 つでは、 R_9 は $-A-B$ であり、その際、 A は $-SO_2-$ 又は $-SO_2-NH-$ である。 20


さらなる実施態様では、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} の少なくとも 1 つは水素以外である。

【 0 0 6 7 】

本発明はさらに、式 IV の化合物及び薬学上許容可能なその塩に関するものであり、

【 0 0 6 8 】

【 化 1 3 】



(IV)

30

【 0 0 6 9 】

式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 50

40

(54)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【 0 0 7 0 】

実施態様の 1 つでは、 R_{14} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、 R_{13} 、 R_{15} 及び R_{16} がそれぞれ水素である。

実施態様の 1 つでは、 R_{15} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、 R_{13} 、 R_{14} 及び R_{16} がそれぞれ水素である。

【 0 0 7 1 】

実施態様の 1 つでは、 n は 1 である。

別の実施態様では、 n は 2 である。

別の実施態様では、 n は 3 である。

【 0 0 7 2 】


実施態様の 1 つでは、 n は 4 である。

別の実施態様では、 n は 5 である。

式 (I V) の化合物の例示となる例には、式 (I V a) の化合物

【 0 0 7 3 】

【 化 1 4 】



【 0 0 7 4 】

及び薬学上許容可能なその塩が挙げられる。






実施態様の 1 つでは、式 (I V a) の化合物は、

【 0 0 7 5 】

(55)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 表 5 】

化合物	n	-NZ ₁ Z ₂
57	2	-N(CH ₃) ₂
58	3	-N(CH ₃) ₂
59	4	-N(CH ₃) ₂
60	5	-N(CH ₃) ₂
61	1	
62	2	
63	3	
64	4	
65	5	

10

20

【 0 0 7 6 】


であり、又は薬学上許容可能なその塩である。

式 (I V) の化合物の例示となる例には、式 (I V b) の化合物

【 0 0 7 7 】

【 化 1 5 】

30



40

【 0 0 7 8 】

及び薬学上許容可能なその塩が挙げられる。






実施態様の 1 つでは、式 (I V b) の化合物は、

【 0 0 7 9 】

(56)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【表 6】

化合物	n	-NZ ₁ Z ₂
67	2	-N(CH ₃) ₂
68	3	-N(CH ₃) ₂
69	4	-N(CH ₃) ₂
70	5	-N(CH ₃) ₂
71	1	
72	2	
73	3	
74	4	
75	5	

10

20

【0080】

であり、又は薬学上許容可能なその塩である。

式(IV)の追加的例示となる化合物には、上記化合物43、45及び97~109並びに薬学上許容可能なその塩が挙げられる。

(定義)

30

イソキノリン誘導体と関連して以下の定義を使用する。

【0081】

「C₁~C₅のアルキル」は、1~5の炭素原子を含有する直鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素を言う。C₁~C₅のアルキル基の例には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、イソプロピル、イソブチル、sec-ブチル及びtert-ブチル、イソペンチル及びネオペンチルが挙げられるが、これらに限定されない。

【0082】

「C₁~C₈のアルキル」は、1~8の炭素原子を含有する直鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素を言う。C₁~C₈のアルキル基の例には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、イソプロピル、イソブチル、sec-ブチル及びtert-ブチル、イソペンチル、ネオペンチル、イソヘキシル、イソヘプチル及びイソオクチルが挙げられるが、これらに限定されない。

40

【0083】

「C₁~C₁₀のアルキル」は、1~10の炭素原子を含有する直鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素を言う。C₁~C₁₀のアルキル基の例には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、イソプロピル、イソブチル、sec-ブチル及びtert-ブチル、イソペンチル、ネオペンチル、イソヘキシル、イソヘプチル、イソオクチル、イソノニル及びイソデシルが挙げられるが、これらに限定されない。

【0084】

50

【 0 0 8 5 】

10

【 0 0 8 6 】

20

【 0 0 8 7 】

30

【 0 0 8 8 】

【 0 0 8 9 】

40

【 0 0 9 0 】

50

(58)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

○)置換されたアリール基の代表例には、2-C(O)NH₂-フェニル、3-C(O)NH₂-フェニル、4-C(O)NH₂-フェニル、2-C(O)NH₂-ピリジル、3-C(O)NH₂-ピリジル及び4-C(O)NH₂-ピリジルが挙げられる。

【0091】

「-(C₁~C₅のアルキル)-3~7員環の単環式複素環」は、C₁~C₅のアルキル基の水素原子の1つが、-3~7員環の単環式複素環で置き換えられた上で定義したようなC₁~C₅のアルキル基を言う。-(C₁~C₅のアルキル)-(3~7員環の単環式複素環)基の代表例には、-CH₂CH₂-モルフォリン、-CH₂CH₂-ピペリジン、-CH₂CH₂CH₂-モルフォリン及び-CH₂CH₂CH₂-イミダゾールが挙げられるが、これらに限定されない。

10

【0092】

「ヒドロキシ置換されたC₁~C₅のアルキル」は、C₁~C₅のアルキル基の水素原子の1つがヒドロキシル基で置き換えられた上で定義したようなC₁~C₅のアルキル基を言う。アルカノール基の代表例には、-CH₂OH、-CH₂CH₂OH、-CH₂CH₂CH₂OH、-CH₂CH₂CH₂CH₂OH、-CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH、-CH₂CH(OH)CH₃、-CH₂CH(OH)CH₂CH₃、-CH(OH)CH₂CH₃、及び-C(CH₃)₂CH₂OHが挙げられるが、これらに限定されない。

【0093】

「アリーレン」基は、フェニル基の水素原子の1つが結合で置き換えられたフェニル基である。アリーレン基は、オルソ、メタ又はパラの立体配置であることができ、置換することができないか、又は独立して以下の基：C₁~C₅のアルキル、ハロ、ヒドロキシ、O-C₁~C₅のアルキル、-N(R^a)₂、-COOH、ハロ置換されたC₁~C₅のアルキル、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-OC(O)-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)NH₂又は-NO₂の1以上で置換することができ、その際R^aの各存在は独立して、-H又は-C₁~C₁₀のアルキルである。

20

【0094】

「C₃~C₈の単環式シクロアルキル」は、3~8の炭素原子を含有する非芳香族の飽和炭化水素環である。C₃~C₈の単環式シクロアルキルの代表例には、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル及びシクロオクチルが挙げられるが、これらに限定されない。C₃~C₈の単環式シクロアルキルは、置換することができないか、又は独立して以下の基：C₁~C₅のアルキル、ハロ、ハロ置換されたC₁~C₅のアルキル、ヒドロキシ、O-C₁~C₅のアルキル、N(R^a)₂、-COOH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-OC(O)-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)NH₂又は-NO₂の1以上で置換することができ、その際R^aの各存在は独立して、-H又は-C₁~C₁₀のアルキルである。

30

【0095】

「3~7員環の単環式複素環」は、1~4の環炭素原子がN、O又はS原子で独立して置き換えられている単環式3~7員環の芳香族又は非芳香族の単環式シクロアルキルを言う。窒素原子、イオウ原子又は炭素原子を介して3~7員環の単環式複素環を結合することができる。3~7員環の単環式複素環基の代表例には、ピペリジニル、ピペラジニル、モルフォリニル、ピロリル、オキサジニル、チアジニル、ジアジニル、トリアジニル、テトラジニル、イミダゾリル、テトラゾリル、ピロリジニル、イソキサゾリル、フラニル、フラザニル、ピリジニル、オキサゾリル、チアゾリル、チオフェニル、ピラゾリル、トリアゾリル及びピリミジニルが挙げられるが、これらに限定されない。

40

【0096】

「7~10員環の二環式複素環」は、1~4の環炭素原子がN、O又はS原子で独立して置き換えられている二環式7~10員環の芳香族又は非芳香族の二環式シクロアルキルを言う。窒素原子、イオウ原子又は炭素原子を介し7~10員環の二環式複素環を結合することができる。7~10員環の二環式複素環基の代表例には、ベンジミダゾリル、イン

50

(59)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ドリル、イソキノリニル、インダゾリル、キノリニル、キナゾリニル、プリニル、ベンジソキサゾリル、ベンゾキサゾリル、ベンズチアゾリル、ベンゾジアゾリル、ベンゾトリアゾリル、イソインドリル及びインダゾリルが挙げられるが、これらに限定されない。

【0097】

「窒素含有の3～7員環の単環式複素環」は、少なくとも1つの環窒素原子を含有する上で定義した3～7員環の単環式複素環を言う。窒素原子、イオウ原子又は炭素原子を介して窒素含有の3～7員環の単環式複素環を結合することができる。窒素含有の3～7員環の単環式複素環の代表例には、ピペリジニル、ピペラジニル、ピロリル、オキサジニル、チアジニル、ジアジニル、トリアジニル、テトラジニル、イミダゾリル、テトラゾリル、ピロリジニル、イソキサゾリル、ピリジニル、オキサゾリル、チアゾリル、ピラゾリル、トリアゾリル、ピリミジニル及びモルフォリニルが挙げられるが、これらに限定されない。

10

【0098】

「ハロ」は、F、Cl、Br又はIである。

「動物」は、哺乳類であり、たとえば、ヒト、マウス、ラット、モルモット、イヌ、ネコ、ウマ、ウシ、ブタ、又は非ヒト霊長類、たとえば、サル、チンパンジー、ヒヒ又はアカゲザルである。実施態様の1つでは、動物はヒトである。

【0099】

代表的な「薬学上許容可能な塩」には、たとえば、水溶性の塩及び水に不溶性の塩、たとえば、酢酸塩、アムソネート塩(4,4-ジアミノスチルベン-2,2-ジスルホネート)、ベンゼンスルホネート塩、ベンゾネート塩、ベシレート塩、重炭酸塩、重硫酸塩、重酒石酸塩、ホウ酸塩、臭化物、酪酸塩、エデト酸カルシウム、カンファースルホネート、カンシル酸塩、炭酸塩、塩化物、クエン酸塩、クラブルアリエート、二塩酸塩、エデト酸塩、エジシル酸塩、エストレート、エシレート、フマル酸塩、グルセプテート、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、グリコリルアルサニレート、ヘキサフルオロリン酸塩、ヘキシルレゾルシネート、ヒドラバミン、ヒドロ臭化物、ヒドロ塩化物、ヒドロキシナフト酸塩、ヨウ化物、イソチオネート、乳酸塩、ラクトビオン酸塩、ラウリン酸塩、リンゴ酸塩、マレイン酸塩、マンデル酸塩、メシル酸塩、メチル臭化物、メチル硝酸塩、メチル硫酸塩、ムケート、ナブシル酸塩、硝酸塩、N-メチルグルカミンアンモニウム塩、3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸塩、オレイン酸塩、シュウ酸塩、パルミチン酸塩、パモエート(1,1-メタン-ビス-2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸塩、エインボネート)、パントテン酸塩、リン酸塩/ニリン酸塩、ピクリン酸塩、ポリガラクトン酸塩、プロピオン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、サリチル酸塩、ステアリン酸塩、塩基性酢酸塩、コハク酸塩、硫酸塩、スルホサリクレート、スラメート、タンニン酸塩、酒石酸塩、テオクレート、トシル酸塩、トリエチオダイト及び吉草酸塩が挙げられる。水和物は、薬学上許容可能な塩の別の例である。

20

30

【0100】

イソキノリン誘導体に関連して使用される場合、「有効量」は、(a)症状を治療する又は予防するのに、又は(b)インビトロ(in vitro)若しくはインビボ(in vivo)の細胞においてPARSを阻害するのに有効な量である。

40

【0101】

別の抗癌剤に関連して使用される場合、「有効量」は、単独で又はイソキノリン誘導体との併用で癌を治療する又は予防するのに有効である量である。「併用」には、同一組成物の範囲内で及び別々の組成物の範囲内で投与することが含まれる。後者の例では、イソキノリン誘導体とその予防効果又は治療効果を発揮している間に抗癌剤が投与され、逆もまた同様である。

【0102】

本明細書では以下の略記が使用され、示される定義を有する：AcOHは酢酸であり；AIBNはアジビスイソブチロニトリルであり；CCl₄は四塩化炭素であり；CEPは盲腸結紮及び穿刺であり；DMEFはダルベッコの改変イーグル培地であり；DMFはN

50

(60)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

, N-ジメチルホルムアミドであり; DMSOはジメチルスルホキシドであり; EtOAcは酢酸エチルであり; EtOHはエタノールであり; HEPESは4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジニエタンスルホン酸であり; HPLCは高圧液体クロマトグラフィであり; LPSはリポ多糖であり; Meはメチルであり; MeCNはアセトニトリルであり; MeOHはメタノールであり; MSは質量分析であり; Msはメシル(メタンスルホニル)であり; NBSはN-ブロモスクシンイミドであり; NEt₃はトリエチルアミンであり; NMRは核磁気共鳴であり; PBSはリン酸緩衝化生理食塩水(pH 7.4)であり; PARSはポリ(ADP-リボース)合成酵素であり; Pyはピリジンであり; SDSはドデシル硫酸(ナトリウム塩)であり; STZはストレプトゾトシンであり; TCAはトリクロロ酢酸であり; Tfはトリフルリル(トリフルオロメタンスルホニル)であり; TFAはトリフルオロ酢酸であり; THFはテトラヒドロフランであり; TLCは薄層クロマトグラフィであり; TMZはテモゾロミドであり; TNFは腫瘍壊死因子であり; TRISはトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンであり; Tsはトシル(p-トルエンシルホニル)である。

10

(5.2.イソキノリン誘導体の使用方法)

本発明はまた、細胞におけるPARSを阻害する方法を包含する。ポリ(ADP-リボース)合成酵素、PARP(ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ、PARP-1、EC 2.4.9.9)及びADP-リボシルトランスフェラーゼ(ADPRT、EC 2.4.2.30)として知られるPARSは、NAD⁺のADPリボース部分の受容体タンパク質への転移を触媒する核内酵素である。

20

【0103】

実施態様の1つでは、方法は、細胞でPARSを阻害するのに有効な量のイソキノリン誘導体と細胞を接触させることを含む。一般に、PARS活性を有する又は有することが可能である又はPARSを発現することが可能であるいかなる細胞も使用することができる。細胞はいかなる形態でも提供することができる。たとえば、インビトロで、エキスビボ(ex vivo)で又はインビボで細胞を提供することができる。当該技術で既知の方法、たとえば、バナジック(Banasik)等、J. Biol. Chem. 第267巻、1569~1575ページ(1991年)に記載されるような方法を用いてPARS活性を測定することができる。PARSを発現することが可能である細胞の例示となる例には、筋肉、骨、歯肉、神経、脳、肝臓、腎臓、脾臓、肺、心臓、膀胱、胃、結腸、直腸、小腸、皮膚、食道、目、咽頭、子宮、卵巣、前立腺、腱、骨髄、血液、リンパ、精巣、膣及び腫瘍の細胞が挙げられるが、これらに限定されない。

30

【0104】

本発明に従って、症状の治療又は予防の必要に応じて動物にイソキノリン誘導体が投与される。

(5.2.1.炎症性疾患の治療及び予防)

炎症性疾患を治療するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。生体組織の炎症があるところで炎症性疾患は生じうる。これらには、局所の炎症反応及び全身性の炎症が含まれる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な炎症性疾患には、臓器移植の拒絶; 関節炎、関節リウマチ、変形性関節症を含む関節の慢性炎症性疾患及び骨の再吸収の増加に関連した骨疾患; 回腸炎、潰瘍性大腸炎、バレット症候群及びクローン病のような炎症性腸疾患; 喘息、成人呼吸窮迫症候群及び慢性閉塞性気道疾患のような炎症性肺疾患; 角膜ジストロフィー、トラコーマ、回旋糸状虫症、ブドウ膜炎、交感性眼炎及び眼内炎を含む目の炎症性疾患; 歯肉炎及び歯周炎を含む歯肉の慢性炎症性疾患; 結核; ハンセン病; 尿毒性合併症、糸球体腎炎及びネフローゼを含む腎臓の炎症性疾患; 硬化性皮膚炎、乾癬及び湿疹を含む皮膚の炎症性疾患; 神経系の慢性脱髄疾患、神経疾患、多発性硬化症、AIDS関連の神経変性及びアルツハイマー病、感染性脳膜炎、脳脊髄炎、パーキンソン病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症及びウイルス性又は自己免疫性の脳炎を含む中枢神経系の炎症性疾患; 免疫複合体血管炎、全身性紅斑性狼瘡(SLE)を含むが、これらに限定されない糖尿病合併症; 心筋症、虚血性心疾患、高コレステロール

40

50

(61)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

血症及びアテローム性動脈硬化症のような心臓の炎症性疾患；並びに、子癇前症、慢性肝不全及び脳と脊髄の外傷を含む重大な炎症部分を有しうるその他の種々の疾患が挙げられるが、これらに限定されない。炎症性疾患は、グラム陽性又はグラム陰性のショック、出血性又はアナフィラキシー性のショック、又は、炎症誘発性サイトカインに反応した癌化学療法により誘導されるショック、たとえば、炎症誘発性サイトカイン関連したショックによって例示される、生体の全身性の炎症でもありうる。そのようなショックは、たとえば、癌の治療として投与される化学療法剤によって誘発することができる。

【 0 1 0 5 】

実施態様の1つでは、炎症性疾患は、関節の炎症性疾患、歯肉の慢性炎症性疾患、炎症性腸疾患、炎症性肺疾患、中枢神経系の炎症性疾患、目の炎症性疾患、グラム陽性ショック、グラム陰性ショック、出血性ショック、アナフィラキシー性ショック、外傷性ショック又は化学療法ショックである炎症性疾患である。

10

(5 . 2 . 2 . 再灌流傷害の治療及び予防)

再灌流傷害を治療するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。再灌流は、たとえば、血管の収縮又は閉塞に続いて起きるような虚血の後で、それによって血管の血流が再開される過程を言う。再灌流傷害は、たとえば、心筋梗塞、脳卒中のような自然に生じる発作に続いて、又は血管の血流が故意に若しくは無意識に阻止される外科的処置の間に生じうる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な再灌流傷害の例には、腸管の再灌流傷害、心筋の再灌流傷害、及び心肺バイパス手術、大動脈瘤修復手術、頸動脈血管内膜切除術又は出血性ショックの結果生じる再灌流傷害が挙げられるが、これら

20

【 0 1 0 6 】

実施態様の1つでは、再灌流傷害は、心肺バイパス手術、大動脈瘤修復手術、頸動脈血管内膜切除術又は出血性ショックの結果生じる。

(5 . 2 . 3 . 臓器移植の結果生じる再酸素化傷害の治療及び予防)

別の実施態様では、再灌流傷害は、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害である。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な再酸素化傷害の例には、以下の臓器：心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、腸管及び角膜の移植が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 0 7 】

30

実施態様の1つでは、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害は、臓器移植の最中に生じる。

(5 . 2 . 4 . 虚血性症状の治療及び予防)

虚血性症状を治療するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な虚血性症状の例には、安定狭心症、不安定狭心症、心筋虚血、肝臓虚血、腸間膜動脈虚血、腸管虚血、下肢虚血、慢性下肢虚血、脳虚血、急性心臓虚血、及び脳卒中や脳虚血のような中枢神経系の虚血性疾患が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 0 8 】

実施態様の1つでは、虚血性症状は、心筋虚血、安定狭心症、不安定狭心症、脳卒中、虚血性心疾患又は脳虚血である。

40

(5 . 2 . 5 . 腎不全の治療及び予防)

腎不全を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。

【 0 1 0 9 】

実施態様の1つでは、腎不全は慢性腎不全である。

別の実施態様では、腎不全は急性腎不全である。

(5 . 2 . 6 . 血管系疾患の治療及び予防)

循環器疾患以外の血管系疾患を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な血管系疾患の例には、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レーノー病及び現象、肢端チアノーゼ、肢端

50

(62)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘤、リンパ水腫及び脂肪血が挙げられるが、これらに限定されない。

(5 . 2 . 7 . 循環器疾患の治療及び予防)

循環器疾患を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な循環器疾患の例には、慢性心不全、アテローム性動脈硬化症、鬱血性心不全、循環ショック、心筋症、心臓移植、心筋梗塞、及び心房細動、上室性頻拍、心房粗動、発作性心房頻拍のような心臓不整脈が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 1 0 】

実施態様の 1 つでは、循環器疾患は慢性心不全である。

10

別の実施態様では、循環器疾患は心臓不整脈である。

さらに別の実施態様では、心臓不整脈は、心房細動、上室性頻拍、心房粗動、又は発作性心房頻拍である。

(5 . 2 . 8 . 糖尿病又は糖尿病合併症の治療及び予防)

糖尿病又はその合併症を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な糖尿病の例には、Ⅰ型糖尿病(インスリン依存性糖尿病)、Ⅱ型糖尿病(インスリン非依存性糖尿病)、妊娠糖尿病、自己免疫性糖尿病、異常インスリン症、膵臓疾患による糖尿病、そのほかの内分泌疾患(クッシング症候群、末端肥大症、褐色細胞腫、グルカゴン産生腫瘍、原発性アルドステロン症又はソマトスタチン産生腫瘍)に関連する糖尿病、A 型インスリン耐性症候群、B 型インスリン耐性症候群、脂肪栄養性の糖尿病、及びβ細胞毒素により誘発される糖尿病が挙げられるが、これらに限定されない。糖尿病合併症を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な糖尿病又はその合併症の例には、糖尿病性白内障、緑内障、網膜症、腎症(たとえば、ミクロアルミ尿症及び進行性糖尿病性腎症)、多発ニューロパシー、下肢の壊疽、アテローム性硬化症冠動脈疾患、末梢動脈疾患、非ケトン性高血糖高浸透圧性昏睡、単発ニューロパシー、自律神経ニューロパシー、下肢潰瘍、関節障害、及び皮膚又は粘膜の合併症(たとえば、感染、脛の染み、カンジダ感染又は壊死症、脂肪性糖尿病性肥満)、高脂血症、高血圧、インスリン耐性の症候群、冠動脈疾患、網膜症、糖尿病性ニューロパシー、多発ニューロパシー、単発ニューロパシー、自己免疫性ニューロパシー、下肢潰瘍、関節障害、真菌感染、細菌感染及び心筋症が挙げられるが、これらに限定されない。

20

30

(5 . 2 . 9 . パーキンソン病の治療及び予防)

パーキンソン病を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。

(5 . 2 . 1 0 . 癌の治療及び予防)

癌を治療する又は予防するのにイソキノリン誘導体を使用することができる。イソキノリン誘導体を用いて治療可能な又は予防可能な癌の例には、下記の表に記載した癌及びその転移が挙げられるが、これらに限定されない。

(表 7)

40

固形腫瘍には：

線維肉腫
粘液肉腫
脂肪肉腫
軟骨肉腫
骨原性肉腫
脊索腫
血管肉腫
内皮肉腫
リンパ管肉腫

50

(63)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

リンパ管内皮肉腫

滑膜腫

中皮腫

ユーイング肉腫

平滑筋肉腫

横紋筋肉腫

結腸癌

結腸直腸癌

腎臓癌

膵臓癌

10

骨癌

乳癌

卵巣癌

前立腺癌

食道癌

胃癌

口腔癌

鼻癌

咽喉癌

扁平上皮癌、

20

基底細胞癌

腺癌

汗腺癌

脂腺癌

乳頭状癌

乳頭腺癌

嚢胞腺癌

髄様癌

気管支原性癌

腎細胞癌

30

肝臓癌

胆管癌

絨毛癌

精上皮腫

胎児性癌

ウィルム肉腫

子宮頸癌

子宮癌

睾丸癌

小細胞肺癌

40

膀胱癌

肺癌

上皮癌

皮膚癌

黒色腫

神経芽細胞腫

網膜芽細胞腫

が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 1 1 】

血液に由来する癌には：

50

(64)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

急性リンパ芽球性白血病（「ALL」）
 急性リンパ芽球性B細胞白血病
 急性リンパ芽球性T細胞白血病
 急性骨髄芽球性白血病（「AML」）
 急性前骨髄芽球性白血病（「APL」）
 急性単芽球性白血病
 急性赤白血病性白血病
 急性巨核芽球性白血病
 急性骨髄単球性白血病
 急性非リンパ性白血病
 急性未分化性白血病
 慢性骨髄性白血病（「CML」）
 慢性リンパ性白血病（「CLL」）
 ヘアリー細胞白血病
 多発性骨髄腫

10

が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 1 2 】

急性及び慢性の白血病：

リンパ芽球性
 骨髄性
 リンパ性
 骨髄性白血病

20

リンパ腫

ホジキン病
 非ホジキンリンパ腫
 多発性骨髄腫
 ワルデンシュトレーム型マクログロブリン血症
 重鎖疾患
 真性多血症

C N S 及び脳の癌腫

30

神経膠腫
 毛様細胞性星状細胞腫
 星状細胞腫
 未分化星状細胞腫
 多形性膠芽腫
 髄芽細胞腫
 頭蓋咽頭腫
 上衣細胞腫
 松果体腫
 血管芽細胞腫
 聴神経腫
 乏突起膠腫
 髄膜腫
 前庭神経鞘腫
 アデノーマ
 転移性脳腫瘍
 髄膜腫
 脊髄腫瘍
 髄芽細胞腫

40

実施態様の１つでは、癌は、肺癌、乳癌、結腸直腸癌、前立腺癌、白血病、リンパ腫、

50

(65)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

非ホジキンリンパ腫、皮膚癌、脳癌、中枢神経系の癌、卵巣癌、子宮癌、胃癌、膵臓癌、食道癌、腎臓癌、肝臓癌、又は頭頸部の癌である。

【0113】

別の実施態様では、癌は転移癌である。

さらに別の実施態様では、動物はあらかじめ又は現在、癌の治療を受けている。そのような以前の治療には、化学療法、放射線療法、外科手術、たとえば、癌ワクチンのような免疫療法が挙げられるが、これらに限定されない。

【0114】

イソキノリン誘導体は、ウイルスが原因で生じる癌の治療又は予防にも有用である。そのようなウイルスには、子宮頸癌のきっかけとなりうるヒトパピローマウイルス（たとえば、エルナンデス（Hernandez）- アビラ（Avila）等、*Achieves of Medical Research* 第28巻、265～271ページ（1997年）を参照のこと）、リンパ腫のきっかけとなりうるエプステイン・バーウイルス（EBV）（たとえば、ヘルマン（Herrmann）等、*J. Pathol* 第199巻（2）、140～145ページ（2003年）を参照のこと）、肝癌のきっかけとなりうるB型又はC型の肝炎ウイルス（たとえば、エル-セラグ（El-Serag）、*J. Clin. Gastroenterol* 第35巻（5 Suppl. 2）、S72～8（2002年）を参照のこと）、T細胞白血病のきっかけとなりうるヒトT細胞白血病ウイルス（HTLV）- 1（たとえば、モルトロー（Mortreux）等、*Leukemia* 第17巻（1）：26～38ページ（2003年）を参照のこと）、カポジ肉腫のきっかけとなりうるヒトヘルペスウイルス- 8の感染（たとえば、カドー（Kadow）等、*Curr. Opin. Investig. Drugs* 第3巻（11）、1574～1579ページ（2002年）を参照のこと）、及び免疫不全の結果としての癌のきっかけとなりうるヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染（たとえば、ダル マーソ（Dal Maso）等、*Lancet Oncol.* 第4巻（2）、110～119ページ（2003年）を参照のこと）が挙げられる。

【0115】

イソキノリン誘導体を投与して、表7に列記される癌を含むが、これらに限定されない癌の進行を防ぐことができる。そのような予防的使用には、過形成、化生又は最も特には異形成から成る非新生細胞の増殖が起きているもの含まれる。

【0116】

或いは、又は過形成、化生又は異形成として特徴付けられる異常細胞の増殖に加えて、インビボで示される又は動物からの小試料によってインビトロで示される形質転換された表現型又は悪性の表現型の1以上の特徴の存在は、イソキノリン誘導体の予防的/治療的投与の望ましさを示すことができる。形質転換された表現型のそのような特徴には、形態的变化、ゆるい基層接着、接触阻害の喪失、足場依存性の喪失、プロテアーゼの放出、糖輸送の増加、血清要求性の低下、胎児性抗原の発現、250,000ダルトンの細胞表面タンパク質の消失が挙げられる（形質転換された又は悪性の表現型に関連する特徴については、上記84～90ページを参照のこと）。

【0117】

特定の実施態様では、白板斑症、上皮の良性に見える過形成若しくは異形成の病変、又はボーエン病、上皮内癌腫は、本方法に従って治療可能又は予防可能である。

別の実施態様では、繊維嚢胞性の疾患（嚢胞性過形成、乳腺異形成、特に腺疾患（良性の上皮過形成）は、本方法に従って治療可能又は予防可能である。

【0118】

そのほかの実施態様では、悪性について以下の素因の1以上を呈する動物に、癌を治療する又は予防するのに有効である量のイソキノリン誘導体を投与することができる：悪性に関連した染色体の転座（たとえば、慢性骨髄性白血病についてのフィラデルフィア染色体、濾胞性リンパ腫についてのt（14；18））；家族性ポリープ症又はガードナー症候群；良性の単クローン性免疫グロブリン異常症；メンデル遺伝方式を示す癌又は前癌疾患を有するヒトとの第1度の近親関係（たとえば、結腸の家族性ポリープ症、ガードナー症候群、遺伝性外骨腫症、多発内分泌腺腫症、アミロイド産生を伴う甲状腺髄質癌及び褐

10

20

30

40

50

(66)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

色細胞腫、ポイツ・ジェガース症候群、フォン・レックリングハウゼンの神経線維腫、網膜芽細胞腫、頸動脈球腫瘍、皮膚メラノカルシノーマ、眼内メラノカルシノーマ、色素性乾皮症、毛細血管拡張性運動失調症、セディアク・ヒガシ症候群、先天性白色症、ファンconi再生不良性貧血、及びブルーム症候群、並びに発癌物質への暴露（たとえば、喫煙、副流煙への暴露、及び特定の化学物質の吸入又は接触）。

（5.2.10.1.癌治療のための併用化学療法）

実施態様の1つでは、癌を治療する又は癌を予防する本方法はさらに別の抗癌剤を投与することを含む。

【0119】

実施態様の1つでは、本発明は、対象において癌を治療する又は予防する方法を提供し、該方法は、有効量の（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤の投与を含む。

10

実施態様の1つでは、そのような作用剤が癌の治療のために単独療法として使用される場合一般に採用される用量で、（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤が投与される。

【0120】

別の実施態様では、（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤は、相乗的に作用し、そのような作用剤が癌の治療のために単独療法として使用される場合一般に採用される用量よりも少ない用量で投与される。

【0121】

投与される（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤の投与量並びに投与計画は、治療される癌、患者の身体全体の健康、及び投与する内科医の決断を含むが、これらに限定されない種々のパラメータに依存することができる。

20

【0122】

他の抗癌剤の投与の前（たとえば、5分、15分、30分、45分、1時間、2時間、4時間、6時間、12時間、24時間、48時間、72時間、96時間、1週間、2週間、3週間、4週間、5週間、6週間、8週間、又は12週間前）、それと同時に、又はそれに続いて（たとえば、5分、15分、30分、45分、1時間、2時間、4時間、6時間、12時間、24時間、48時間、72時間、96時間、1週間、2週間、3週間、4週間、5週間、6週間、8週間、又は12週間後）、その必要性に応じて対象にイソキノリン誘導体を投与することができる。種々の実施態様では、（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤は、1分離して、10分離して、30分離して、1時間未満離して、1時間～2時間離して、2時間～3時間離して、3時間～4時間離して、4時間～5時間離して、5時間～6時間離して、6時間～7時間離して、7時間～8時間離して、8時間～9時間離して、9時間～10時間離して、10時間～11時間離して、11時間～12時間離して、24時間以下離して、又は48時間以下離して投与される。実施態様の1つでは、（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤は、3時間で投与される。別の実施態様では、（i）イソキノリン誘導体及び（ii）別の抗癌剤は、1分～24時間離して投与される。

30

【0123】

実施態様の1つでは、有効量のイソキノリン誘導体及び有効量の別の抗癌剤が同一の組成物中に存在する。実施態様の1つでは、この組成物は経口投与に有用である。別の実施態様では、この組成物は静脈内投与に有用である。

40

【0124】

イソキノリン誘導体及び別の抗癌剤を投与することによって治療する又は予防することができる癌には、表7で述べられた癌のリストが挙げられるが、これらに限定されない。

実施態様の1つでは、癌は脳腫瘍である。

【0125】

特定の実施態様では、脳腫瘍は、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化星状細胞腫、多形性膠芽腫又は転移性脳腫瘍である。

特定の実施態様では、癌は黒色腫である。

50

(67)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【0126】

実施態様の1つでは、癌は転移性黒色腫である。

イソキノリン誘導体及びそのほかの抗癌剤は相加的又は相乗的に作用することができる。イソキノリン誘導体と別の抗癌剤の相乗的併用によって、これら作用剤の一方又は双方の少ない投与量を使用することができ、及び／又はイソキノリン誘導体及びそのほかの抗癌剤の一方又は双方の少ない投与回数を使用することができ、及び／又は少ない回数で作用剤を投与するということは、癌の治療における作用剤の有効性を減らすことなく、対象への作用剤の投与に関連するいかなる毒性も軽減することができる可能性がある。さらに、相乗効果は、癌の治療におけるこれら作用剤の有効性の改善及び／又はいずれかの作用剤単独の使用に関連する有害な又は望ましくない影響の軽減を結果として生じる可能性がある。

10

【0127】

実施態様の1つでは、そのような作用剤が癌の治療に対して単独療法として使用される際通常採用される用量で投与される場合、イソキノリン誘導体と別の抗癌剤は相乗的に作用する。別の実施態様では、そのような作用剤が癌の治療に対して単独療法として使用される際通常採用される用量よりも少ない用量で投与される場合、イソキノリン誘導体と別の抗癌剤は相乗的に作用する。

【0128】

実施態様の1つでは、有効量のイソキノリン誘導体と有効量の別の抗癌剤の投与は、そのほかの抗癌剤への癌の耐性を阻害する。実施態様の1つでは、癌は腫瘍である。

20

本発明の方法及び組成物で有用な、好適なそのほかの抗癌剤には、テモゾロミド、トボイソメラーゼI阻害剤、プロカバジン、ダカルバジン、ゲムシタビン、カペシタビン、メソトレキセート、タキソール、タキソテレ、メルカプトプリン、チオグアニン、ヒドロキシウレア、シタラビン、シクロホスファミド、イフォスファミド、ニトロソウレア、シスプラチン、カルボプラチン、マイトマイシン、ダカルバジン、プロカルビジン、エトボシド、テニボシド、カンパテシン、ブレオマイシン、ドキシソルピシン、イダルピシン、ダウノルピシン、ダクチノマイシン、プリカマイシン、ミトキサトロン、L-アスパラギナーゼ、ドキシソルピシン、エピルピシン、5-フルオロウラシル、ドセタキセル及びバクリタキセルのようなタキサン類、リユーコボリン、レバミソール、イリノテカン、エストラムスチン、エトボシド、ナイトロジェンマスタード、BCNU、カルムスチン及びロムスチンのようなニトロソウレア類、ビンブラスチン、ビンクリスチン及びビノレレルピンのようなピンカアルカロイド類、シスプラチン、カルボプラチン及びオキサリプラチンのような白金錯体、イマチニブメシレート、ヘキサメチルメラミン、トボテカン、チロシンキナーゼ阻害剤、チルホスチンハービマイシンA、ゲニステイン、エルブスタチン及びラベンドスチンAが挙げられるが、これらに限定されない。

30

【0129】

実施態様の1つでは、本発明の方法及び組成物で有用なそのほかの抗癌剤には、表8に列記される薬剤及び薬学上許容可能なその塩が挙げられるが、これらに限定されない。

(表8)

(アルキル化剤)

40

ナイトロジェンマスタード

シクロホスファミド

イフォスファミド

トロフォスファミド

クロラムブシル

ニトロソウレア

カルムスチン (BCNU)

ロムスチン (CCNU)

アルキルスルホネート

ブスルファン

トレオスルファン

トリアゼン

デカルバジン

プロカルバジン

50

(68)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

白金含有錯体	テモゾロミド シスプラチン カルボプラチン アロプラチン オキサリプラチン	
(植物アルカロイド) ビンカアルカロイド	ピンクリスチン ビンブラスチン ビンデシン ビノレルビン	10
タキソイド	パクリタキセル ドセタキセル	
(D N A トポイソメラーゼ阻害剤) エポボドフィリン	エトボシド テニボシド トボテカン イリノテカン 9 - アミノカンプトテシン カンプトテシン クリスナトール マイトマイシン C 代謝拮抗剤	20
(抗葉酸剤) D H F R 阻害剤	メソトレキセート トリメトレキセート	
I M P 脱水素酵素阻害剤	ミコフェノール酸 チアゾフリン リバビリン E I C A R	
リボヌクレアーゼ還元酵素阻害剤	ヒドロキシウレア デフェロキサミン	30
(ピリミジン類縁体) ウラシル類縁体	5 - フルオロウラシル フルオクスウリジン ドキシフルウリジン ラリトレキセド	
シトシン類縁体	シタラビン (アラ C) シトシンアラビノシド フルダラビン ゲムシタビン カベシタビン	40
プリン類縁体	メルカプトプリン チオグアニン O - 6 - ベンジルグアニン 3 - H P 2' - デオキシ - 5 - フルオロウリジン 5 - H P アルファ - T G D R アフジコリングリシネート アラ - C	50

(69)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

	5 - アザ - 2' - デオキシシチジン	
	ベータ - T G D R	
	シクロシチジン	
	グアナゾール	
	イノシングリコジアルデヒド	
	マセベシン I I	
	ピラゾロイミダゾール	
(ホルモン療法)		
受容体拮抗剤		
抗エストロゲン	タモキシフェン	10
	ラロキシフェン	
	メゲストロール	
L H R H 作動薬	ゴスクルクリン	
	酢酸ロイプロリド	
抗アンドロゲン	フルタミド	
	ビカルタミド	
(レチノイド類 / デルトイド類)		
ビタミン A 誘導体	シス - レチノイン酸	
ビタミン D 類縁体	全トランス - レチノイン酸 (A T R A - I V)	
	E B 1 0 8 9	20
	C B 1 0 9 3	
	K H 1 0 6 0	
(光線力学療法)	ベルトポルフィン (B P D - M A)	
	フタロシアニン	
	光線感作物質 P c 4	
	デメトキシ - ヒボクレリン A	
	(2 B A - 2 - D M H A)	
(サイトカイン類)	インターフェロン - α	
	インターフェロン - β	
	インターフェロン - γ	30
	腫瘍壊死因子	
	インターロイキン - 2	
(血管形成阻害剤)	アンギオスタチン (プラスミノゲン断片)	
	血管形成性抗トロンビン I I I	
	アンギオザイム	
	A B T - 6 2 7	
	ベイ 1 2 - 9 5 6 6	
	ベネフィン	
	ベバシズマブ	
	B M S - 2 7 5 2 9 1	40
	軟骨由来阻害剤 (C D I)	
	C A I	
	C D 5 9 補体断片	
	C E P - 7 0 5 5	
	C o l 3	
	コンプレタスタチン A - 4	
	エンドスタチン (コラーゲン X V I I I I 断片)	
	フィブロンекチン断片	
	G r o - ベータ	
	ハロフギノン	50

(70)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ヘパリナーゼ	
ヘパリン六糖断片	
H M V 8 3 3	
ヒト絨毛性ゴナドトロピン (h C G)	
I M - 8 6 2	
インターフェロン- α / β / γ	
インターフェロン誘導性タンパク質 (I P - 1 0)	
インターロイキン- 1 2	
クリングル5 (プラスミノージェン断片)	
マリマスタット	10
メタロプロテイナーゼ阻害剤	
(T I M P s)	
2 - メトキシエストラジオール	
M M I 2 7 0 (C G S 2 7 0 2 3 A)	
M o A b I M C - 1 C 1 1	
ネオバスタット	
N M - 3	
パンゼム	
P I - 8 8	
胎盤リボヌクレアーゼ阻害剤	20
プラスミノージェンアクチベータ阻害剤	
血小板因子- 4 (P F - 4)	
プリノマスタット	
プロラクチン16 k D 断片	
プッロリフェシン関連タンパク質 (P R P)	
P T K 7 8 7 / Z K 2 2 2 5 9 4	
レチノイド類	
ソリマスタット	
スクアルアミン	
S S 3 3 0 4	30
S U 5 4 1 6	
S U 6 6 6 8	
S U 1 1 2 4 8	
テトラヒドロコルチゾール- S	
テトラチオモリブデート	
タリドミド	
トロンボスポンジン- 1 (T S P - 1)	
T N P - 4 7 0	
形質転換成長因子- β (T G F - β)	
バスキュロスタチン	40
バゾスタチン (カルレチキュリン断片)	
Z D 6 1 2 6	
Z D 6 4 7 4	
ファルネシルトランスフェラーゼ阻害剤 (F T I)	
ビスホスホネート	
(細胞分裂阻害剤)	
アロコルヒチン	
ハリコンドリン B	
コルヒチン	
コルヒチン誘導体	
ドルスタチン 1 0	50

(71)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

	マイタンシン	
	リゾキシ	
	チオコルヒチン	
	トリチルシステイン	
(その他)		
イソプレニル化阻害剤		
ドーパミン作用性神経毒素	1-メチル-4-フェニルピリジニウムイオン	
細胞周期阻害剤	スタウロスボリン	
アクチノマイシン類	アクチノマイシン D	
	ダクチノマイシン	10
ブレオマイシン類	ブレオマイシン A 2	
	ブレオマイシン B 2	
	ペプロマイシン	
アントラサイクリン類	ダウノルビシン	
	ドキソルブシン	
	イダルビシン	
	エピルビシン	
	ピラルビシン	
	ゾルビシン	
	ミトキサントロン	20
M D R 阻害剤	ベラパミル	
Ca^{2+} + A T P アーゼ阻害剤	タブシガルギン	
本発明の組成物及び方法で使用する事ができるそのほかの抗癌剤には、アシビシン、		
アクラルビシン、塩酸アコダゾール、アクロニン、アドゼレシン、アルデスリューキン、		
アルトレタミン、アンボマイシン、酢酸アメタントロン、アミノグルテチミド、アムサク		
リン、アナストロゾール、アントラマイシン、アスパラギナーゼ、アスペルリン、アザシ		
チジン、アゼテバ、アゾトマイシン、バチマスタット、ベンゾデバ、ビカルタミド、塩酸		
ピサントレン、ビスナフィドジメシレート、ビゼレシン、硫酸ブレオマイシン、ブレクイ		
ナールナトリウム、プロピリミン、ブスルファン、カクチノマイシン、カルステロン、カ		
ラセミド、カルベチマー、カルボプラチン、カルムスチン、塩酸カルビシン、カルゼレシ		30
ン、セデフィンゴール、クロラムブシル、シロレマイシン、シスプラチン、クラデリビン		
、メシル酸クリスナトール、シクロホスファミド、シタラビン、ダカルバジン、ダクチノ		
マイシン、塩酸ダウノルビシン、デシタビン、ドキソルマプラチン、デザグアニン、メシ		
ル酸デザグアニン、ジアジコン、ドセタキセル、ドキソルビシン、塩酸ドキソルビシン、		
ドロロキシフェン、クエン酸ドロロキシフェン、プロピオン酸ドロモスタノロン、チュア		
ゾマイシン、エダトレキセート、塩酸エフロルニチン、エルサミトルシン、エンロプラチ		
ン、エンプロメート、エピプロビジン、塩酸エピルビシン、エルプロゾール、塩酸エソル		
ビシン、エストラムスチン、エストラムスチンリン酸ナトリウム、エタニダゾール、エト		
ボシド、リン酸エトボシド、エトプリン、塩酸ファドロゾール、ファザラビン、フェンレ		
チニド、フロクスリジン、リン酸フルダラビン、フルオロウラシル、フルオロシタビン、		40
フォスキドン、フォストリエシンナトリウム、塩酸ゲンシタビン、ヒドロキシウレア、塩		
酸イダルビシン、イフォスファミド、イルモフォシン、インターロイキン-2 (組換えイ		
ンターロイキン-2 又は r I L-2 を含む)、インターフェロン-アルファ-2 α 、イン		
ターフェロン-アルファ-2 β 、インターフェロン-アルファ-n 1、インターフェロン-		
アルファ-n 3、インターフェロン-ベータ-I α 、インターフェロン-ガンマ-I β		
、イプロプラチン、塩酸イリノテカン、酢酸ランレオチド、レトロゾール、酢酸リ्यूブ		
ロリド、塩酸リアロゾール、ロメトレキソールナトリウム、ロムスチン、塩酸ロソキサ		
ントロン、マソプロコール、マイタンシン、塩酸メクロレタミン、酢酸メゲストロール、酢		
酸メレンゲストール、メルファラン、メノガリル、メルカプトプリン、メソトレキセート		
、メソトレキセートナトリウム、メトプリン、メツレデバ、ミチンドミド、マイトカルシ		50

(72)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ン、マイトクロミン、マイトギリン、マイトマルシン、マイトマイシン、マイトスパー、マイトタン、塩酸マイトキサントロン、ミオフェノール酸、ノコダゾール、ノガラマイシン、オルマブラチン、オキシスラン、パクリタキセル、ペガスバルガーゼ、ペリオマイシン、ペンタムスチン、硫酸ペロマイシン、ベルホスファミド、ピボプロマン、ピボスルファン、塩酸ピボキサントロン、プリカマイシン、プロメスタン、ボルフィマーナトリウム、ボルフィロマイシン、プレドニムスチン、塩酸プロカルバジン、プロマイシン、塩酸プロマイシン、ピラゾフリン、リボプリン、ログレチミド、サフィンゴール、塩酸サフィンゴール、セムスチン、シムトラゼン、スパルフォセートナトリウム、スパルソマイシン、塩酸スピロゲルマニウム、スピロムスチン、スピロブラチン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、スルホフェヌール、タリソマイシン、テコガランナトリウム、テガフル

10

ン、塩酸テロキサントロン、テモボルフィン、テニボシド、テロキシロン、テストラクトン、チアミプリン、チオグアニン、チオテパ、チアゾフリン、チアバザミン、クエン酸トレミフェン、酢酸トレストロン、リン酸トリシリピン、トリメトレキセート、グルクロン酸トリメトレキセート、トリプトレリン、塩酸ツプロゾール、ウラシルマスタード、ウレデパ、バブレオチド、ベルテボルフィン、硫酸ビンブラスチン、硫酸ピンクリスチン、ビンデシン、硫酸ビンデシン、硫酸ビンビジン、硫酸ピングリシネート、硫酸ビンリユーロシン、酒石酸ビノレルピン、硫酸ビンロシジン、硫酸ビンゾリジン、ボロゾール、ゼニブラチン、ジノスタチン、塩酸ゾルピシンが挙げられるが、これらに限定されない。

【0130】

本発明の方法及び組成物で使用するすることができるさらなる抗癌剤には、20-エビー1, 25-ジヒドロビタミンD3; 5-エチニルウラシル; アビラテロン; アクラルピシン; アシルフルベン; アデシベノール; アドレゼレシン; アルデスロイキン; ALL-TK拮抗剤; アルトレタミン; アンバムスチン; アミドックス; アミフォスチン; アミノレプリン酸; アムルピシン; アムサクリン; アナグレリド; アナストロゾール; アンドログラフィリド; 血管形成阻害剤; 拮抗剤D; 拮抗剤G; アンタレリックス; 抗背面化形態形成タンパク質-1; 抗アンドロゲン、前立腺癌; 抗エストロゲン; 抗ネオプラストン; アンチセンスオリゴヌクレオチド; グリシン酸アフィジコリン; アポトーシス遺伝子モジュレーター; アポトーシス調節因子; アプリン酸; アラ-CDP-DL-PTBA; アルギニンデアミナーゼ; アスラクリン; アタメスタン; アトリムスチン; アキシナスタチン1; アキシナスタチン2; アキシナスタチン3; アザセトロン; アザトキシン; アザチロシン;

30

バカチンIII誘導体; バラノール; バチマスタット; BCR/ABL拮抗剤; ベンゾクロリン; ベンゾイルスタウロスポリン; ベータラクタム誘導体; ベータ-アレチン; ベタクラマイシンB; ベツリン酸; bFGF阻害剤; ビカルタミド; ビサントレン; ビスアジリジニルスペルミン; ビスナフィド; ビストラテンA; ビゼレシン; プレフレート; プロピリミン; プドチタン; プチオニン; スルホキシミン; カルシポトリオール; カルホスチンC; カンプトテシン誘導体; カナリア痘IL-2; カルボキシアミド-アミノ-トリアゾール; カルボキシアミドトリアゾール; CarcestM3; CARN700; 軟骨由来の阻害剤; カルゼレシン; カゼインキナーゼ阻害剤(ICOS); カスタロスベルミン; セロピンB; セトロレリックス; クロルン; クロロキノキサリンスルホアミド; シカプロスト; シス-ボルフィリン; クラドリピン; クロミフェン類縁体; クロトリマゾール; コリスマイシンA; コリスマイシンB; コンブレタスタチンA4; コンブレタスタチン類縁体; コナゲニン; クラムベスジジン816; クリスナトール; クリプトフィシン8; クリプトフィシンA誘導体; クラシンA; シクロペンタアントラキノン; シクロプラタム; シベミシン; シタラピンオクフォスフェート; 細胞溶解因子; シトスタチン; ダクリキシマブ; デシタピン; デヒドロジデムニンB; デスロレリン; デキサメタゾン; デキシホスファミド; デクスラゾキサン; デクスベラパミル; ジアジコン; ジデムニンB; ジドックス; ジエチルノルスペルミン; ジヒドロ-5-アシチジン; ジヒドロタキソール; ジオキサマイシン; ジフェニルスピロムスチン; ドセタキセル; ドコサノール; ドラセトロン; ドキシフルリジン; ドロロキシフェン; ドロナビノール; デュオカルマイシンSA; エブセレン; エコムスチン; エデルホシン; エドレコロマブ; エフロニチン; エレメン; エミテ

40

50

(73)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

フール；エビルピシン；エプリステリド；エストラムスチン類縁体；エストロゲン作動薬
 ；エストロゲン拮抗剤；エタニダゾール；リン酸エトボシド；エクセメスタン；ファドロ
 ザール；ファザラビン；フェネチニド；フィルグラスチム；フィナステリド；フラボピリ
 ドール；フレゼラスチン；フルアステロン；フルダラビン；塩酸フルオロダウノルニシン
 ；フォルフェニメックス；フォルメスタン；フォストリエシン；フォテムスチン；ガドリ
 ニウムテキサフィリン；硝酸ガリウム；ガロシタビン；ガニレリックス；ゼラチナーゼ阻
 害剤；ゲムシタビン；グルタチオン阻害剤；ヘプスルファン；ヘレグリン；ヘキサメチレ
 ンビスアセトアミド；ヒペリシン；イバンドロン酸；イダルピシン；イドキシフェン；イ
 ドラマントン；イルモフォシン；イロマスタット；イミダゾアクリドン；イミキモッド；
 免疫賦活剤ペプチド；インスリン様増殖因子-1受容体阻害剤；インターフェロン作動薬
 ；インターフェロン類；インターロイキン類；イオベングアン；インドドキシソルピシン；
 イボメアノール4；イロプラクト；イルソグラジン；イソベンガゾール；イソホモハリコ
 ンドリンB；イタセトロン；ジャスプラキノリド；カハラリドF；ラメラリン-N三酢酸
 ；ランレオチド；レイナマイシン；レノグラスチム；硫酸レンチナン；レプトルスタチン
 ；レトロゾール；白血病阻害因子；白血球アルファインターフェロン；リユープロリド+
 エストロゲン+プロゲステロン；リユープロレリン；レバミソール；リアロゾール；直鎖
 ポリアミン類縁体；親油性二糖ペプチド；親油性白金錯体；リソクリンアミド7；ロバブ
 ラチン；ロムブリシン；ロメトレキソール；ロニダミン；ロソキサントロン；ロバスタチ
 ン；ロキシリブリン；ルルトテカン；ルテチウムテキサフィリン；リソフィリン；溶解性
 ペプチド；マイタンシン；マンノスタチンA；マリマスタット；マソプロコール；マスビ
 ン；マトリリシン阻害剤；マトリクスメタロプロテイナーゼ阻害剤；メノガリル；メルバ
 ロン；メテレリン；メチオニナーゼ；メトクロブラミド；MIF阻害剤；ミフェプリスト
 ン；ミルテフォシン；ミリモスチム；ミスマッチ二本鎖RNA；マイトグアゾン；マイト
 ラクトール；マイトマイシン類縁体；マイトナフィド；マイトトキシン線維芽細胞増殖因
 子-サボリン；マイトキサントロン；モファロテン；モルグラモスチム；モノクローナル
 抗体；ヒト絨毛性ゴナドトロピン；モノホスホリル脂質A+ミオバクテリウム細胞壁sk
 ；モビダモール；多剤耐性遺伝子阻害剤；多重腫瘍抑制因子1に基づく療法；マスタード抗
 癌剤；ミカベルオキシドB；ミオバクテリウム細胞壁抽出物；ミリアボロン；N-アセチ
 ルジナリン；N-置換ベンザミド；ナファレリン；ナグレスチップ；ナロキソン+ペンタ
 ゾシン；ナパビン；ナフテルビン；ナルトグラスチム；ネダブラチン；ネモルピシン；ネ
 リドロン酸；中性エンドペプチダーゼ；ニルタミド；ニサマイシン；一酸化窒素モジュレ
 ータ；ニトロキシド抗酸化剤；ニツルリン；O6-ベンジルグアニン；オクトレオチド；
 オキセノン；オリゴヌクレオチド；オナプリストン；オندانセトロン；オラシン；経口
 サイトカイン誘導因子；オルマブラチン；オサテロン；オキサリプラチン；オキサウノマ
 イシン；パクリタキセル；パクリタキセル類縁体；パクリタキセル誘導体；パラウアミン
 ；パルミトイルリゾキシシン；パミドロン酸；パナキシトリオール；パノミフェン；パラバ
 クチン；パゼリブチン；ペガスバルガーゼ；ペルデシン；ペントサンポリ硫酸ナトリウム
 ；ペントスタチン；ペントロゾール；ペルフルブロン；ペルフォスファミド；ペリルアル
 コール；フェナジノマイシン；フェニルアセテート；ホスファターゼ阻害剤；ピシバニル
 ；塩酸ピロカルピン；ピラルピシン；ピリトレキシム；プラセチンA；プラセチンB；プ
 ラスミノゲンアクチベータ阻害剤；白金錯体；白金錯体類；白金トリアミン錯体；ボル
 フィマーナトリウム；ボルフィロマイシン；ブレドニゾン；プロビルビスアクリドン；プ
 ロスタグランジンJ2；プロテアソーム阻害剤；プロテインAに基づく免疫モジュレータ；
 タンパク質キナーゼC阻害剤；タンパク質キナーゼC阻害剤類；ミクロアルガル；タンパ
 ク質チロシンホスファターゼ阻害剤；プリンヌクレオシドホスホリラーゼ阻害剤；ブルブ
 リン；ピラゾロアクリジン；ピリドキシル化ヘモグロビンポリオキシエチレン抱合体；r
 a f拮抗剤；ラルチトレキセド；ラモセトロン；r a sファルネシルタンパク質トランス
 フェラーゼ阻害剤；r a s阻害剤；r a s-GAP阻害剤；脱メチル化レチリブチン；レ
 ニウムRe186エチドロネート；リゾキシシン；リボザイム；RIIレチンアミド；ログ
 レチミド；ロヒツキン；ロムルチド；ロキニメックス；ルビギノンB1；ルボキシシル；サ

10

20

30

40

50

(74)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

フィンゴール；サイントピン；S a r C N U；サクロフィトールA；サルガモスチム；S d i 1 模倣体；セムスチン；老化誘導阻害剤1；センスオリゴヌクレオチド；シグナル伝達阻害剤；シグナル伝達モジュレータ；単鎖抗原結合タンパク質；シゾフィラン；ソブゾキサシ；ボロカプテートナトリウム；フェニル酢酸ナトリウム；ソルベロール；ソマトメジン結合タンパク質；ソネルミン；スパルホス酸；スピカマイシンD；スピロムスチン；スプレノベンチン；スポンギスタチン1；スクアラミン；幹細胞阻害剤；幹細胞分割阻害剤；スチピアミド；ストロメリシン阻害剤；スルフィノシン；超活性血管活性腸管ペプチド拮抗剤；スラジスタ；スラミン；スウィンソニン；合成グリコサミノグリカン；タリムスチン；タモキシフェンメチオジド；タウロムスチン；タザロテン；テコガランナトリウム；テガファー；テルラピリリウム；テロメラゼ阻害剤；テモボルフィン；テモゾロミド；テニポシド；テトラクロロデカオキシド；テトラゾミン；タリプラスチン；チオコラリン；トロンプボイエチン；ロンボボイエチン模倣体；サイマルファシン；サイモボイエチン受容体作動薬；サイモトリナン；甲状腺刺激ホルモン；スズエチルエチオプルブリン；チラバザミン；チタノセンビクロリド；トブセンチン；トレミフェン；トチポテント幹細胞因子；翻訳阻害剤；トレチノイン；トリアセチルウリジン；トリシリピン；トリメトレキセート；トリプトレリン；トロピセトロン；ツロステリド；チロシンキナーゼ阻害剤；チルホスチン；U B C 阻害剤；ウベニメックス；尿生殖洞由来増殖阻害因子；ウロキナーゼ受容体拮抗剤；パブレオチド；バリオリンB；ベクター系、赤血球遺伝子治療；ベラレゾール；ベラミン；ベルジン；ベルテボルフィン；ビノレルピン；ピンキサルチン；ピタキシシ；ボロゾール；ザノテロン；ゼニプラチン；ジラスコルブ；及びジノスタチンスチマラマーが挙げられるが、これらに限定されない。

10

20

【0131】

別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はインターフェロンαである。

別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はインターロイキン2である。

実施態様の1つでは、そのほかの抗癌剤はアルキル化剤、たとえば、ナイトロジェンマスタートード、ニトロソウレア、アルキルスルホネート、トリアゼン、又は白金含有剤である。

【0132】

別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はトリアゼンアルキル化剤である。

特定の実施態様では、そのほかの抗癌剤はテモゾロミドである。

テモゾロミドは、約 $60 \text{ mg} / \text{m}^2$ （対象の体表面積）～約 $250 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、及び約 $100 \text{ mg} / \text{m}^2$ ～約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ の範囲にある投与量で対象に投与することができる。特定の実施態様では、テモゾロミドの投与量は、約 $10 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $1 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $5 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $10 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $20 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $30 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $40 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $50 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $60 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $70 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $80 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $90 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $100 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $110 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $120 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $130 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $140 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $150 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $160 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $170 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $180 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $190 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $210 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $220 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $230 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、約 $240 \text{ mg} / \text{m}^2$ 、又は約 $250 \text{ mg} / \text{m}^2$ である。

30

40

【0133】

特別の実施態様では、テモゾロミドは経口で投与される。

実施態様の1つでは、テモゾロミドは約 $150 \text{ mg} / \text{m}^2$ ～約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ の範囲にある用量で対象に経口で投与される。

【0134】

別の実施態様では、テモゾロミドは約 $150 \text{ mg} / \text{m}^2$ ～約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、対象に経口で投与される。

特定の実施態様では、テモゾロミドは約 $150 \text{ mg} / \text{m}^2$ ～約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、1～5日目まで、対象に経口で投与され、次いで、約 $150 \text{ mg} / \text{m}^2$ ～約 $200 \text{ mg} / \text{m}^2$ の範囲にある用量で1日1回、連続して5

50

(75)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

日間、28～32日目まで再び経口で投与され、次いで、約150mg/m²～約200mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、55～59日目まで再び経口で投与される。

【0135】

特定の実施態様では、そのほかの抗癌剤はプロカルバジンである。

プロカルバジンは、約50mg/m²（対象の体表面積）～約100mg/m²、及び約60mg/m²～約100mg/m²の範囲にある投与量で対象に投与することができる。特定の実施態様では、プロカルバジンの投与量は、約10mg/m²、約1mg/m²、約5mg/m²、約10mg/m²、約20mg/m²、約30mg/m²、約40mg/m²、約50mg/m²、約60mg/m²、約70mg/m²、約80mg/m²、約90mg/m²、約100mg/m²、約110mg/m²、約120mg/m²、約130mg/m²、約140mg/m²、約150mg/m²、約160mg/m²、約170mg/m²、約180mg/m²、約190mg/m²、約200mg/m²、約210mg/m²、約220mg/m²、約230mg/m²、約240mg/m²、約250mg/m²、約260mg/m²、約270mg/m²、約280mg/m²、約290mg/m²、約300mg/m²、約310mg/m²、約320mg/m²、約330mg/m²、約340mg/m²、約350mg/m²、約360mg/m²、約370mg/m²、約380mg/m²、約390mg/m²、約400mg/m²、約410mg/m²、約420mg/m²、約430mg/m²、約440mg/m²、約450mg/m²、約460mg/m²、約470mg/m²、約480mg/m²、約490mg/m²、又は約500mg/m²である。

10

20

【0136】

特別の実施態様では、プロカルバジンは静脈内に投与される。

実施態様の1つでは、プロカルバジンは約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

【0137】

別の実施態様では、プロカルバジンは1日1回連続して5日間、約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

特定の実施態様では、プロカルバジンは約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、1～5日目まで、対象に静脈内で投与され、次いで、約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、28～32日目まで再び静脈内に投与され、次いで、約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、55～59日目まで再び静脈内に投与される。

30

【0138】

別の実施態様では、プロカルバジンは約50mg/m²～約100mg/m²の範囲にある用量で1回、対象に静脈内で投与される。

特定の実施態様では、そのほかの抗癌剤はダカルバジンである。

【0139】

ダカルバジンは、約60mg/m²（対象の体表面積）～約250mg/m²、及び約150mg/m²～約250mg/m²の範囲にある投与量で対象に投与することができる。特定の実施態様では、ダカルバジンの投与量は、約10mg/m²、約1mg/m²、約5mg/m²、約10mg/m²、約20mg/m²、約30mg/m²、約40mg/m²、約50mg/m²、約60mg/m²、約70mg/m²、約80mg/m²、約90mg/m²、約100mg/m²、約110mg/m²、約120mg/m²、約130mg/m²、約140mg/m²、約150mg/m²、約160mg/m²、約170mg/m²、約180mg/m²、約190mg/m²、約200mg/m²、約210mg/m²、約220mg/m²、約230mg/m²、約240mg/m²、約250mg/m²、約260mg/m²、約270mg/m²、約280mg/m²、約290mg/m²、約300mg/m²、約310mg/m²、約320mg/m²、

40

50

(76)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

約 3 3 0 m g / m²、約 3 4 0 m g / m²、約 3 5 0 m g / m²、約 3 6 0 m g / m²、
約 3 7 0 m g / m²、約 3 8 0 m g / m²、約 3 9 0 m g / m²、約 4 0 0 m g / m²、
約 4 1 0 m g / m²、約 4 2 0 m g / m²、約 4 3 0 m g / m²、約 4 4 0 m g / m²、
約 4 5 0 m g / m²、約 4 6 0 m g / m²、約 4 7 0 m g / m²、約 4 8 0 m g / m²、
約 4 9 0 m g / m² 又は約 5 0 0 m g / m² である。

【 0 1 4 0 】

特別の実施態様では、ダカルバジンは静脈内に投与される。

実施態様の 1 つでは、ダカルバジンは約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

【 0 1 4 1 】

別の実施態様では、ダカルバジンは 1 日 1 回連続して 5 日間、約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

特定の実施態様では、ダカルバジンは約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で 1 日 1 回、連続して 5 日間、1 ~ 5 日目まで、対象に静脈内で投与され、次いで、約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で 1 日 1 回、連続して 5 日間、2 8 ~ 3 2 日目まで再び静脈内に投与され、次いで、約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で 1 日 1 回、連続して 5 日間、5 5 ~ 5 9 日目まで再び静脈内に投与される。

【 0 1 4 2 】

実施態様の 1 つでは、ダカルバジンは約 1 5 0 m g / m² ~ 約 2 5 0 m g / m² の範囲にある用量で 1 回、対象に静脈内で投与される。

実施態様の 1 つでは、そのほかの抗癌剤は、トポイソメラーゼ I 阻害剤、たとえば、エトポシド、テニポシド、トポテカン、イリノテカン、9-アミノカンプトテシン、カンプトテシン又はクリスナートルである。

【 0 1 4 3 】

特定の実施態様では、そのほかの抗癌剤はイリノテカンである。

イリノテカンは、約 5 0 m g / m² (対象の体表面積) ~ 約 1 5 0 m g / m²、及び約 7 5 m g / m² ~ 約 1 5 0 m g / m² の範囲にある投与量で対象に投与することができる。特定の実施態様では、イリノテカンの投与量は、約 1 0 m g / m²、約 1 m g / m²、約 5 m g / m²、約 1 0 m g / m²、約 2 0 m g / m²、約 3 0 m g / m²、約 4 0 m g / m²、約 5 0 m g / m²、約 6 0 m g / m²、約 7 0 m g / m²、約 8 0 m g / m²、約 9 0 m g / m²、約 1 0 0 m g / m²、約 1 1 0 m g / m²、約 1 2 0 m g / m²、約 1 3 0 m g / m²、約 1 4 0 m g / m²、約 1 5 0 m g / m²、約 1 6 0 m g / m²、約 1 7 0 m g / m²、約 1 8 0 m g / m²、約 1 9 0 m g / m²、約 2 0 0 m g / m²、約 2 1 0 m g / m²、約 2 2 0 m g / m²、約 2 3 0 m g / m²、約 2 4 0 m g / m²、約 2 5 0 m g / m²、約 2 6 0 m g / m²、約 2 7 0 m g / m²、約 2 8 0 m g / m²、約 2 9 0 m g / m²、約 3 0 0 m g / m²、約 3 1 0 m g / m²、約 3 2 0 m g / m²、約 3 3 0 m g / m²、約 3 4 0 m g / m²、約 3 5 0 m g / m²、約 3 6 0 m g / m²、約 3 7 0 m g / m²、約 3 8 0 m g / m²、約 3 9 0 m g / m²、約 4 0 0 m g / m²、約 4 1 0 m g / m²、約 4 2 0 m g / m²、約 4 3 0 m g / m²、約 4 4 0 m g / m²、約 4 5 0 m g / m²、約 4 6 0 m g / m²、約 4 7 0 m g / m²、約 4 8 0 m g / m²、約 4 9 0 m g / m² 又は約 5 0 0 m g / m² である。

【 0 1 4 4 】

特別の実施態様では、イリノテカンは静脈内に投与される。

実施態様の 1 つでは、イリノテカンは約 5 0 m g / m² ~ 約 1 5 0 m g / m² の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

【 0 1 4 5 】

別の実施態様では、イリノテカンは 1 日 1 回連続して 5 日間、約 5 0 m g / m² ~ 約 1 5 0 m g / m² の範囲にある用量で対象に静脈内で投与される。

特定の実施態様では、イリノテカンは約 5 0 m g / m² ~ 約 1 5 0 m g / m² の範囲に

10

20

30

40

50

(77)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ある用量で1日1回、連続して5日間、1～5日目まで、対象に静脈内に投与され、次いで、約50mg/m²～約150mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、28～32日目まで再び静脈内に投与され、次いで、約50mg/m²～約150mg/m²の範囲にある用量で1日1回、連続して5日間、55～59日目まで再び静脈内に投与される。

【0146】

実施態様の1つでは、本発明は、有効量の(i)イソキノリン誘導体、(ii)1以上のそのほかの抗癌剤の投与を提供する。

実施態様の1つでは、そのような作用剤が癌の治療のために単独療法で使用される場合、一般に採用される用量で、(i)イソキノリン誘導体及び(ii)1以上のそのほかの抗癌剤が投与される。

10

【0147】

別の実施態様では、(i)イソキノリン誘導体及び(ii)1以上のそのほかの抗癌剤は相乗的に作用し、そのような作用剤が癌の治療のために単独療法で使用される場合、一般に採用される用量よりも少ない用量で投与される。

【0148】

投与される(i)イソキノリン誘導体及び(ii)1以上のそのほかの抗癌剤の投与量及び投与計画は、治療される癌、患者の身体全体の健康、及び投与する内科医の決断を含むが、これらに限定されない種々のパラメータに依存することができる。

【0149】

20

実施態様の1つでは、そのほかの抗癌剤はO-6-ベンジルグアニンである。

別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はO-6-ベンジルグアニン及びテモゾロミドである。

【0150】

別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はO-6-ベンジルグアニン及びプロカルバジンである。

さらに別の実施態様では、そのほかの抗癌剤はO-6-ベンジルグアニン及びダカルバジンである。

(5.2.10.2.癌の多重療法)

外科手術、放射線療法、癌ワクチンのような免疫療法を含むが、これらに限定されない1以上の追加的な抗癌療法を受けた又は現在受けている動物にイソキノリン誘導体を投与することができる。

30

【0151】

実施態様の1つでは、本発明は、癌を治療する又は予防するのに有効な量の(a)イソキノリン誘導体をその必要に応じて動物に投与すること及び外科手術、放射線療法、癌ワクチンのような免疫療法を含むが、これらに限定されない(b)別の抗癌療法を含む、癌を治療する又は予防する方法を提供する。

【0152】

別の実施態様では、そのほかの抗癌療法は放射線療法である。

別の実施態様では、そのほかの抗癌療法は外科手術である。

40

さらに別の実施態様では、そのほかの抗癌療法は免疫療法である。

【0153】

特定の実施態様では、癌を治療する又は予防する本方法は、イソキノリン誘導体を投与すること及び放射線療法を含む。放射線療法は、イソキノリン誘導体の投与と同時に、又はその前に、又はそれに続いて施行することができ、実施態様の1つでは、イソキノリン誘導体投与の少なくとも1時間、5時間、12時間、1週間、1ヵ月。別の実施態様では、数ヵ月(たとえば、3ヵ月まで)前、又は後で施行することができる。

【0154】

そのほかの抗癌療法が放射線療法である場合、治療されるべき癌の種類によって、いかなる放射線療法のプロトコールも用いることができる。たとえば、限定の目的ではなく、

50

(78)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

X線照射を施行することができ；特に、深部腫瘍に対しては、高エネルギーメガボルト（1 MeVより大きいエネルギーの照射）を使用することができ、皮膚癌には、電子ビーム及び常用電圧のX線照射を使用することができる。ラジウム、コバルト及びその他の元素の放射活性のある同位元素のようなガンマ線を放出する放射性同位元素も投与することができる。

【0155】

さらに、実施態様の1つでは、本発明は、化学療法又は放射線療法が、治療されている対象で結果として負の副作用を生じている場合、化学療法又は放射線療法の代替法としてイソキノリン誘導体を用いて癌を治療する方法を提供する。治療されている対象は適宜、たとえば、外科手術、放射線療法又は免疫療法のような別の抗癌療法で治療することができる。

10

【0156】

白血病及びリンパ腫を含むが、これらに限定されない特定の癌の治療のように、インビトロ又はエクスピボでイソキノリン誘導体を使用することができ、そのような治療には、自家幹細胞移植が関与する。これには、対象の自己造血幹細胞を回収し、癌細胞をすべてきれいに除去し、次いで対象の残りの骨髄細胞集団をイソキノリン誘導体の投与及び/又は放射線照射を介して全滅させ、得られた幹細胞を対象に点滴で戻す過程が関与する。続いて、骨髄機能が回復し、対象が回復する間、支持療法を提供することができる。

(5.3. 治療的な/予防的な投与)

本発明はまた、症状を治療する又は予防するのに有用な医薬組成物を提供する。組成物は内科的使用に好適であり、有効量のイソキノリン誘導体及び生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクルを含む。

20

【0157】

動物における症状を治療する又は予防するのに有効である量でイソキノリン誘導体を投与することができる。

イソキノリン誘導体の投与は、治療剤のためのいかなる方式の投与によっても達成することができる。これらの方式には、全身性の投与、又は経口の、鼻内の、非経口の、経皮の、皮下の、腔内の、頬内の、直腸内の若しくは局所の投与方式のような局所投与が挙げられる。場合によっては、投与は結果としてイソキノリン誘導体の血流への放出を生じる。

30

【0158】

実施態様の1つでは、イソキノリン誘導体は経口で投与される。

投与の意図される方式によって、組成物は、固形の、半固形の又は液体の投与形態、たとえば、注射、錠剤、座薬、丸薬、徐放性カプセル、エリキシル剤、チンキ剤、エマルジョン、シロップ、粉末、液体、懸濁液などであることができ、好ましくは、単位投与形態であることができ、従来の薬務に矛盾しない。同様に、それらは、すべて薬剤技術の当業者に周知の形態を用いて、静脈内（ボラス及び点滴の双方）の、腹腔内の、皮下の、又は筋肉内の形態で投与することもできる。

【0159】

例示となる医薬組成物は、イソキノリン誘導体及び生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクルを含む錠剤及びゼラチンカプセルである。例示となるキャリア又はビヒクルには、(a) 希釈剤、たとえば、ラクトース、デキストロース、スクロース、マンニトール、ソルビトール、セルロース、ナトリウム、サッカリン、グルコース及び/又はグリシン、(b) 潤滑剤、たとえば、シリカ、滑石粉、ステアリン酸、そのマグネシウム塩又はカルシウム塩、オレイン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウム及び/又はポリエチレングリコール；錠剤については、また(c) 結合剤、たとえば、ケイ酸マグネシウムアルミニウム、デンプンペースト、ゼラチン、トラガカント、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、炭酸マグネシウム、グルコース又はベータラクトースのような天然糖、コーン甘味料、アカシア、トラガカント又はアルギン酸ナトリウムのような天然の及

40

50

(79)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

び合成のゴム、ワックス及び／又はポリビニルピロリドン、所望であれば、(d) 崩壊剤、たとえば、デンプン、寒天、メチルセルロース、ペントナイト、キサンタンゴム、アルギン酸若しくはそのナトリウム塩、又は発泡性の混合物及び／又は(e) 吸収剤、着色剤、風味剤及び甘味剤が挙げられる。

【 0 1 6 0 】

液体組成物、特に注射用組成物は、たとえば、溶解、懸濁などによって調製することができる。たとえば、イソキノリン誘導体を、たとえば、水、生理食塩水、水性デキストロース、グリセロール、エタノールなどのような薬学上許容可能な溶媒に溶解して、又はそれと混合して、それによって注射用の等張の溶液又は懸濁液を形成する。

【 0 1 6 1 】

たとえば、プロピレングリコールのようなポリアルキレングリコールをキャリアとして用いて、脂質のエマルジョン又は懸濁液から調製することができる座薬として、イソキノリン誘導体を製剤化することもできる。

【 0 1 6 2 】

たとえば、小型の単層の小胞、大型の単層の小胞及び多層の小胞としてのようなリボソーム送達システムの形態でイソキノリン誘導体を投与することもできる。リボソームは、コレステロール、ステアリルアミン又はホスファチジルコリンを含有する種々のリン脂質から形成することができる。一部の実施態様では、特許文献 1 4 に記載されるように、脂質成分の薄膜が薬剤の水性溶液によって水和され薬剤を内包する脂質層を形成する。

【 0 1 6 3 】

イソキノリン誘導体分子がカップリングされる個々のキャリアとしてのモノクローナル抗体の使用によってイソキノリン誘導体を送達することもできる。標的可能な薬剤キャリアとしての可溶性ポリマーにイソキノリン誘導体をカップリングすることもできる。そのようなポリマーには、ポリビニルピロリドン、ピランコポリマー、ポリヒドロキシプロピルメタクリルアミド、フェノール、ポリヒドロキシエチルアスパナミドフェノール、又はパルミトイル残基で置換されたポリエチレンオキシドポリリジンを挙げることができる。さらに、薬剤の制御放出を達成するのに有用な生分解性ポリマー、たとえば、ポリ乳酸、ポリイブシロンカプロラクトン、ポリヒドロキシ酪酸、ポリオルソエステル、ポリアセタール、ポリジヒドロピラン、ポリシアノアクリレート及びヒドロゲルの架橋又は両親媒性のブロックコポリマーの部類にイソキノリン誘導体をカップリングすることもできる。

【 0 1 6 4 】

非経口の注射可能物質の投与は、皮下注射、筋肉内注射又は静脈内注射及び点滴に使用することができる。注射可能物質は、従来の形態、液体溶液若しくは懸濁液、又は注射の前に液体に溶解するのに好適な固形形態のいずれかで調製することができる。

【 0 1 6 5 】

実施態様の 1 つでは、非経口の投与は、参照によって本明細書に組み入れられる特許文献 1 5 に係る徐放性又は持続放出のシステムの埋め込みを採用する。

組成物を滅菌することができ、又はそれは、非毒性量の、たとえば、保存剤、安定剤、湿潤剤又は乳化剤、溶解促進剤、浸透圧を調製するための塩、pH 緩衝剤、及び酢酸ナトリウム又はオレイン酸トリエタノールアミンを含むが、これらに限定されないその他の物質のような補助剤を含有することができる。また、組成物は治療上有用な物質を含有することもできる。

【 0 1 6 6 】

組成物は、従来の混合方法、顆粒化方法又は被覆方法のそれぞれに従って調製することができ、本医薬組成物は、重量で又は容量で、約 0 . 1 % ~ 約 9 9 % の、好ましくは約 1 % ~ 約 7 0 % のイソキノリン誘導体を含有することができる。

【 0 1 6 7 】

イソキノリン誘導体を利用する投薬計画は、動物の種類、種、年齢、体重、性別及び医学症状を含む種々の因子；治療される症状の重症度；投与経路；動物の腎機能又は肝機能；並びに採用される特定のイソキノリン誘導体に従って選択することができる。当業者は

10

20

30

40

50

(80)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

、症状を治療する又は予防するのに有用な薬剤の有効量を容易に決定し、処方することができる。

【0168】

動物に投与する場合、イソキノリン誘導体の有効投与量は、1日当たり約0.05～約1000mgのイソキノリン誘導体の範囲である。インピボ又はインピトロでの使用のための組成物は、約0.5、1.0、2.5、5.0、10.0、15.0、25.0、50.0、100.0、250.0、500.0又は1000.0mgのイソキノリン誘導体を含有することができる。実施態様の1つでは、組成物は記録することができる錠剤の形態である。イソキノリン誘導体の有効な血漿レベルは、1日当たり体重kg当たり約0.002mg～50mgの範囲でありうる。症状の治療又は予防に有効であるイソキノリン誘導体の量は、当業者に既知である臨床的技法によって決定することができる。さらに、インピトロ及びインピボのアッセイを適宜採用し、最適な投与量範囲を確認するのを助けることができる。採用されるべき正確な用量は、投与経路及び治療される症状の深刻さにも依存することができる。主治医の判断及び、たとえば、公表された臨床試験に鑑みた各患者の状況に従って決定することができる。しかしながら、好適な有効投与量は、通常、4時間毎に約500mg以下であるが、約4時間毎に約10マイクログラム～約5グラムの範囲であることができる。実施態様の1つでは、有効な投与量は、4時間毎に約0.01mg、0.5mg、約1mg、約50mg、約100mg、約200mg、約300mg、約400mg、約500mg、約600mg、約700mg、約800mg、約900mg、約1g、約1.2g、約1.4g、約1.6g、約1.8g、約2.0g、約2.2g、約2.4g、約2.6g、約2.8g、約3.0g、約3.2g、約3.4g、約3.6g、約3.8g、約4.0g、約4.2g、約4.4g、約4.6g、約4.8g、及び約5.0gである。約2時間毎、約6時間毎、約8時間毎、約12時間毎、約24時間毎、約36時間毎、約48時間毎、約72時間毎、約1週間毎、約2週間毎、約3週間毎、約毎月、及び約2ヵ月毎を含むが、これらに限定されない種々の時間にわたって同等の投与量を投与することができる。本明細書に記載される有効な投与量は、投与される全量を言い、すなわち、1を超えるイソキノリン誘導体を投与するならば、有効な投与量は投与される全量に相当する。

10

20

【0169】

イソキノリン誘導体を利用する投薬計画は、対象の種類、種、年齢、体重、性別及び医学症状を含む種々の因子；治療される症状の重症度；投与経路；対象の腎機能又は肝機能；並びに採用される特定のイソキノリン誘導体に従って選択することができる。当業者は、症状の進行を防ぐ、対抗する又は阻むのに必要とされる薬剤の有効量を容易に決定し、処方することができる。

30

【0170】

単一1日用量でイソキノリン誘導体を投与することができ、又は1日の全用量を1日当たり2回、3回又は4回に分けて投与することができる。さらに、イソキノリン誘導体は、好適な鼻内ビヒクルの局所使用を介した鼻内形態で、又は、当業者に周知の経皮皮膚貼付剤の形態を用いた経皮経路を介して投与することができる。経皮送達システムの形態で投与されるには、調剤投与は、調剤投薬計画を通して間欠的ではなく連続的であることができる。そのほかの例示となる局所製剤には、クリーム、軟膏、ローション、エアゾール噴霧及びジェルが挙げられ、その際、イソキノリン誘導体の濃度はw/w又はw/vで約0.1%～約15%の範囲である。

40

【0171】

実施態様の1つでは、組成物は、一緒になって癌を治療する又は予防するのに有効である各量のイソキノリン誘導体及び別の抗癌剤を含む。別の実施態様では、イソキノリン誘導体及び別の抗癌剤の量は、組成物の組み合わせた併用化学療剤の少なくとも約0.01重量%である。経口投与が意図される場合、この量は、組成物の約0.1～約80重量%で変化することができる。一部の経口組成物は、約4%～約50%のイソキノリン誘導体及び別の抗癌剤を含むことができる。本発明のそのほかの組成物は、非経口の投与量単位

50

(81)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

が組成物の約0.01重量%～約2重量%を含有するように調製される。

【0172】

ヒトでの使用の前に、所望の治療活性又は予防活性についてインビトロ又はインビボでイソキノリン誘導体をアッセイすることができる。動物モデル系を用いて安全性及び有効性を実証することができる。

【0173】

その必要に応じて動物における症状を治療する又は予防する本方法は、さらに、イソキノリン誘導体を投与される対象に別の予防剤又は治療剤を投与することを含む。実施態様の1つでは、他の予防剤又は治療剤が有効量で投与される。他の予防剤又は治療剤には、抗炎症剤、腎不全防止剤、糖尿病防止剤及び循環器病防止剤、抗嘔吐剤、造血コロニー刺激因子、抗不安薬及び鎮痛剤が挙げられるが、これらに限定されない。

10

【0174】

実施態様の1つでは、抗炎症剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

【0175】

別の実施態様では、腎不全防止剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

【0176】

さらに別の実施態様では、糖尿病防止剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

20

【0177】

その上別の実施態様では、循環器病防止剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

【0178】

さらなる実施態様では、抗嘔吐剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

30

【0179】

別の実施態様では、造血コロニー刺激因子の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、72時間以内、1週間以内、2週間以内、3週間以内、又は4週間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

【0180】

さらに別の実施態様では、オピオイド系鎮痛剤又は非オピオイド系鎮痛剤の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

40

【0181】

その上別の実施態様では、抗不安薬の前、同時に、又は後に、又は同一日、又は互いに、1時間以内、2時間以内、12時間以内、24時間以内、48時間以内、又は72時間以内にイソキノリン誘導体を投与することができる。

【0182】

そのほかの治療剤の有効量は当業者に周知である。しかしながら、そのほかの作用剤の最適な有効量の範囲を決定することは技量のある熟練者の権限の範囲内で十分である。本発明の実施態様の1つでは、別の治療剤が対象に投与される場合、イソキノリン誘導体の有効量は、別の治療剤が投与されない場合のその有効量よりも少ない。この場合、理論に

50

(82)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

束縛されることなく、イソキノリン誘導体及び別の治療剤は、症状を治療する又は予防するのに相乗的に作用すると考えられる。

【 0 1 8 3 】

本発明の方法で有用な抗炎症剤には、コルチゾール、コルチゾン、フルドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、6 α -メチルプレドニゾロン、トリアムシノロン、ベタメタゾン、及びデキサメタゾンのような副腎皮質ステロイド、並びに、アスピリン、アセタミノフェン、インドメタシン、スリンドック、トルメチン、ジクロフェナック、ケトロラック、イブプロフェン、ナプロキセン、フルルビプロフェン、ケトプロフェン、フェノプロフェン、オキサプロジン、メフェナム酸、メクロフェナム酸、ピロキシカム、メロキシカム、ナブメトン、ロフェコキシブ、セレコキシブ、エトドラック及びニメスリドのような非ステロイド系抗炎症剤 (N S A I D) が挙げられるが、これらに限定されない。

10

【 0 1 8 4 】

本発明の方法で有用な腎不全防止剤には、カプトプリル、エナラプリラット、リシノプリル、ベザゼプリル、フォシノプリル、トランドラプリル、キナプリル及びラミプリルのようなACE (アンギオテンシン変換酵素) 阻害剤、マンニトール、グリセリン、フルセミド、トレセミド、トリパミド、クロロチアジド、メチクロチアジド、インダパミド、アミロリド及びスピロノラクトンのような利尿剤、並びにクロフィブレート、ゲムフィブロジル、フェノフィブレート、シプロフィブレート及びベザフィブレートのようなフィブリン酸剤が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 8 5 】

20

本発明の方法で有用な糖尿病防止剤には、グルカゴン；ソマトスタチン；たとえば、トルブタミド、アセトヘキサミド、トラザミド、クロロプロパミド、グリベנקラミド、グリピジド、グリシアジド及びグリメピリドのようなスルホニルウレア類；レパグリニド及びナテグリニドのようなインスリン分泌促進薬；メトフォルミン及びフェンフォルミンのようなビグアニド類；ピオグリタゾン、ロシグリタゾン及びトログリタゾンのようなチアゾリジンジオン類、並びにアカルボース及びミグリトールのような α -グルコシダーゼ阻害剤が挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 8 6 】

本発明の方法で有用な循環器病防止剤には、カルニチン；チアミン；並びに、たとえば、アトロピン、スコボラミン、ホマトリピン、トロピカミド、ピレンジピン、イブラトロピウム、チオトロピウム及びトルテロジンのようなムスカリン性受容体拮抗剤が挙げられるが、これらに限定されない。

30

【 0 1 8 7 】

本発明の方法で有用な抗嘔吐剤には、メトクロプロミド、ドンペリドン、プロクロルペラジン、プロメタジン、クロルプロマジン、トリメトベンザミド、オングダンセトロン、グラニセトロン、ヒドロキシジン、アセチルロイシンモノエタノールアミン、アリザブリド、アザセトロン、ペンズキアナミド、ピエタナウチン、プロモプリド、ブクリジン、クレボプリド、シクリジン、ジメンヒドリネート、ジフェニドール、ドラセトロン、メクリジン、メタラタール、メトピマジン、ナピロン、オキシペルンジル、ピパマジン、スコボラミン、スルピリド、テトラヒドロカンナビノール、チエチルペラジン、チオプロペラジン、トロピセトロン及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。

40

【 0 1 8 8 】

本発明の方法で有用な造血コロニー刺激因子には、フィルグラスチム、サルグラモスチム、モルグラモスチム及びエポエチンアルファが挙げられるが、これらに限定されない。

本発明の方法で有用なオピオイド系鎮痛剤には、モルフィン、ヘロイン、ヒドロモルフォン、オキシモルフォン、オキシコドン、メトボン、アボモルフィン、ノルモルフィン、エトルフィン、ブプレノルフィン、メペリジン、ロベルミド、アニレリジン、エトヘプタジン、ピミニジン、ベタプロジン、ジフェノキシレート、フェンタニル、スフェンタニル、アルフェンタニル、レミフェンタニル、レボルファノール、デキストロメトルファン、フェナゾシン、ペンタゾシン、シクラゾシン、メタドン、イソメタドン及びプロボキシフ

50

(83)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

エンが挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 8 9 】

本発明の方法で有用な非オピオイド系鎮痛剤には、アスピリン、セレコキシブ、ロフェコキシブ、ジクロフィナック、ジフルシナル、エトドラック、フェノプロフェン、フルルビプロフェン、イブプロフェン、ケトプロフェン、インドメタシン、ケトロラック、メクロフェナメート、メフェナム酸、ナブメトン、ナプロキセン、ピロキシカム及びスリンドックが挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 1 9 0 】

本発明の方法で有用な抗不安薬には、ブスピロン、並びに、たとえば、ジアゼパム、ロラゼパム、オキサザパム、クロラゼパート、クロナゼパム、クロルジアゼボキシド及びアルプラゾラムのようなベンゾジアゼピン系薬が挙げられるが、これらに限定されない。

10

(5 . 4 . キット)

本発明は、イソキノリン誘導体の対象への投与を簡略化することができるキットを包含する。

【 0 1 9 1 】

本発明の典型的なキットは、単位投与量形態のイソキノリン誘導体を含む。実施態様の1つでは、単位投与量形態は、有効量のイソキノリン誘導体及び生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクルを含有する、無菌であることができる容器である。キットはさらに、症状を治療する又は予防するためのイソキノリン誘導体の使用を指導するラベル又は印刷された指示書を含むことができる。キットはさらに、単位投与量形態の別の予防剤又は治療剤、たとえば、有効量のそのほかの予防剤又は治療剤を含有する容器を含むこともできる。実施態様の1つでは、キットは、有効量のイソキノリン誘導体及び有効量の予防剤又は治療剤を含有する容器を含む。そのほかの治療剤の例には上記で列記されたものが挙げられるが、これらに限定されない。

20

【 0 1 9 2 】

本発明のキットはさらに、単位投与量形態を投与するのに有用である装置を含む。そのような装置の例には、注射筒、点滴バッグ、貼付剤、吸入器及び浣腸バッグが挙げられるが、これらに限定されない。

(5 . 5 . イソキノリン誘導体の作製方法)

イソキノリン誘導体を作製するのに有用な合成経路の例を以下の実施形態で述べ、スキーム1～10で一般化する。

30

【 0 1 9 3 】

Xが $-CH_2-$ 及び R_5 がOである式(I)のイソキノリン誘導体を作製するのに有用な方法をスキーム1において以下で説明する


【 0 1 9 4 】

(84)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 化 1 6 】

スキーム1



【 0 1 9 5 】


スキーム中、化合物 8 a ~ 8 a f は以下の通りである：

【 0 1 9 6 】

(85)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 化 1 7 】



8a-af

- | | |
|--|--|
| a. R=4-Methyl-piperazine-1-yl | q. R=N(CH ₂ CH ₂ NMe ₂) ₂ |
| b. R=4-CH ₂ CO ₂ Me-piperazine-1-yl | r. R=N(CH ₂ CH ₂ OH) ₂ |
| c. R=4-(CH ₂ CH ₂ OH)-piperazine-1-yl | s. R=NHCH ₂ CH ₂ CN |
| d. R=imidazole-1-yl | t. R=NHC(NH)NH ₂ |
| e. R=L-prolinol | u. R=NH[4-(1,2,4-triazole)] |
| f. R=morpholine-4-yl | v. R=NH[4-(morpholin-4-yl)phenyl] |
| g. R=NHCH ₂ CH ₂ NMe ₂ | w. R=NHCH ₂ CH ₂ (4-N-benzylpiperidine) |
| h. R=NHCH ₂ CH ₂ -piperidine-1-yl | x. R=NHCH ₂ CH ₂ (2-thienyl) |
| i. R=NHCH ₂ CH ₂ N-(pyridine-2-yl) | y. R=NH[1-(4-azabenzimidazole)] |
| j. R=NHCH ₂ CH ₂ -morpholine-4-yl | z. R=NH[1-(4-(2'-pyridyl)piperazine)] |
| k. R=NHCH ₂ CH ₂ -(2-N-Me-tetrahydropyrrolidine-1-yl) | aa. R=NHCH ₂ CH ₂ N[CH ₂ CH ₂ OH] ₂ |
| l. R=NHCH ₂ CH ₂ CH ₂ -morpholine-4-yl | ab. R=NH[1-(4-benzylpiperazine)] |
| m. R=NHCH ₂ CH ₂ CH ₂ -(tetrahydropyrrolidine-1-yl) | ac. R=NH ₂ |
| n. R=NHCH ₂ CH ₂ CH ₂ -imidazole-1-yl | ad. R=NHCH ₂ CH ₂ Ph |
| o. R=NHCH ₂ CH ₂ CH ₂ -(4-methylpiperazine-1-yl) | ae. R=NHCH ₂ CH ₂ [4-OMe(phenyl)] |
| p. R=N(CH ₂ CH ₂ NEt ₂) ₂ | af. R=NHC(O)(morpholin-4-yl) |

【 0 1 9 7 】

5, 6-ジヒドロ-5, 11-ジケト-11H-イソキノリン(2)は、化合物1(ウ
イスコンシン州、ミルウォーキーのアルドリッチケミカル)をメタノール中でアンモニア
と反応させることによって調製した。

【 0 1 9 8 】

(±)11-ヒドロキシ-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-
-c]イソキノリン(3a)は、エタノール中で2をNaBH₄と反応させることによっ
て調製した。

【 0 1 9 9 】

(±)11-ヒドロキシ-11-メチル-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-イ
ソキノリン(3b)は、2をMeMgIと反応させることによって調製した。

(±)11-ヒドロキシ-11-(m-メトキシフェニル)-5, 6-ジヒドロ-5-
オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(3c)は、m-MeO-C₆H
₄MgIを用いて2から調製した。

【 0 2 0 0 】

(±)11-N, N-ジメチルアミノ-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-イン
デノ[1, 2-c]イソキノリン(5a)は、クロロアセチルクロリドを用い、次いでジ
メチルアミンと反応させることによって3aから調製した。同様に調製するのは、(±)
11-N, N-ジエチルアミノ-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1
, 2-c]イソキノリン(5b)、(±)11-N-(ピペリジノ-1-イル)-5, 6
-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(5d)、(±)
11-N-(4-メチルピペラジノ-1-イル)-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ11

(86)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(5c)、(±)11-N-(モルフォリノ-4-イル)-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-イソキノリン(5e)である。(+)11-N-(モルフォリノ-4-イル)-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(5e)は、(±)11-プロモ-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(4b)からも調製した。

【0201】

5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(6)は、CF₃COOH/トリエチルシランを用いて、5, 6-ジヒドロ-5, 11-ジケト-11H-イソキノリン(2)又は(±)11-ヒドロキシ-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-イソキノリン(3a)を還元することによって調製される。9-クロロスルホニル-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(7)は、5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(6)のクロロスルホン化によって調製した。9-[N-(4-メチルピペラジン-イル)スルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8a)は、9-クロロスルホニル-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(7)及びN-メチルピペラジンから調製した。同様に調製されるのは、9-[N-(4-カルボメトキシメチレンピペラジノ-イル)スルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8b)、9-[N-4-(2-ヒドロキシエチルピペラジノ-1-イル)スルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8c)、9-[N-(イミダゾロ-1-イル)スルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-イソキノリン(8d)、9-[N-(2-ヒドロキシプロリニル)スルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8e)、9-[N-モルフォリンスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8f)、9-[N-(2[N, N-ジメチルアミノ]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8g)、9-[N-(2[ピペリジノ-1-イル]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8h)、9-[N-(2[ピペリジノ-2-イル]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8i)、9-[N-(2[モルフォリノ-4-イル]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8j)、9-[N-(2[N-メチルテトラヒドロピロイジノ-1-イル]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8k)、9-[N-(3[モルフォリノ-4-イル]プロピル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8l)、9-[N-(3[テトラヒドロピロロジノ-1-イル]プロピル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8m)、9-[N-(3[イミダゾロ-1-イル]プロピル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8n)、9-[N-(3[4-メチルピペラジノ-1-イル]プロピル)-アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8o)、9-[N, N-ジ-(2-[N, N-ジエチルアミノ]エチル)-アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8p)、9-[N, N-ジ-(2-[N, N-ジメチルアミノ]エチル)-アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(8q)及び9-[N, N-ジ(2-[N, N-ジヒドロキシエチルアミノ]エチル)アミノスルホニル]-5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ-[1, 2-c]イソキノリン(8r)である。

10

20

30

40

50

(87)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 0 2 0 2 】

化合物 8 s ~ 8 a f は、適当なアミン中間体を用いて、化合物 8 a ~ 8 r を作製する上記方法を用いて調製することができる。


スキーム 2 は、式 8 a g ~ 8 a o の末端カルボン酸化合物を作製するのに有用な方法を説明する。本方法は、トリエチルアミンのような塩基の存在下、塩化スルホニル 7 をアミノ酸のアルキルエステルと反応させて中間体、末端カルボン酸アルキルエステルを提供し、次いで、水酸化ナトリウムのような塩基を用いてそれを加水分解し、相当する末端カルボン酸を提供することを含む。

【 0 2 0 3 】

【 化 1 8 】

10

スキーム2



7

8ag-ao

ag. R=NHCH₂COOH
ah. R=NH(CH₂)₂COOH
ai. R=NH(CH₂)₃COOH
aj. R=NH(CH₂)₄COOH
ak. R=NH(CH₂)₅COOH
al. R=NHCH(CH₂COOH)COOH
am. R=NHCH((CH₂)₂COOH)COOH
an. R=NHCH((CH₂)₄NH₂)COOH
ao. R=NHCH(CH₂OH)COOH

20

30

【 0 2 0 4 】

スキーム中、

R' は、アミノ置換の C₁ ~ C₆ のアルキル又はヒドロキシ置換の C₁ ~ C₅ のアルキルであり、

R'' は、C₁ ~ C₅ のアルキルであり、及び

n は、1 ~ 6 の範囲の整数である。

9 - スルホアミドカルボン酸誘導体を作製するための一般的方法

< 9 - スルホアミドカルボン酸エステルの調製 >

0.5 M の式 41 又は 42 のエステルの CH₂Cl₂ 溶液に化合物 7 (1.0 当量) を加え、得られた混合物を 5 分間攪拌する。次いで、トリエチルアミン (約 5 当量) を加え、得られた反応物を室温で攪拌し、反応が完了するまで TLC 又は HPLC を用いてモニターする。反応混合物をろ過し、MeOH を用いて固形物を洗浄し、中間体、9 - スルホアミドカルボン酸エステルを得るが、それはさらに精製することなく使用することができる。

40

< エステルの加水分解 >

およそ 0.5 M の 9 - スルホアミドカルボン酸エステルのエタノール溶液に、約 3.0 N の水酸化ナトリウム水溶液 (約 5.0 当量) を加え、得られた反応物を必要に応じて還流し、反応の完了まで TLC 又は HPLC を用いてモニターする。約 1.0 N の HCl を

50

(88)

J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

用いて反応混合物を約 pH 7 . 0 に中和し、E t O A c を用いて中和した反応混合物を 2 回抽出する。合わせた E t O A c 層を、水及び飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄し、次いで硫酸ナトリウム上で乾燥し、減圧下で濃縮して、粗残渣を得、それをフラッシュコラムクロマトグラフィで精製して所望の 9 - スルホンアミドカルボン酸化合物を得る。

【 0 2 0 5 】

スルホンアミドが t - ブチルエステル基を有する場合、原液の T F A による酸加水分解が有用でありうる。


スキーム 3 で以下に説明する別の実施態様では、一般式 1 3 のイソキノリン誘導体は、塩基の存在下、式 1 3 の化合物を作製するのに十分な温度にて式 1 1 の化合物と式 1 2 の化合物をしばらく接触させることを含む方法によって作製することができる。

10

【 0 2 0 6 】

【 化 1 9 】

スキーム3



20

【 0 2 0 7 】

スキーム中、

$R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式 (I) に関して上記と同義であり、

R_b は、 $-Cl$ 、 $-Br$ 、 $-I$ 、 $-OMs$ 、 $-OTs$ 又は $-Ot f$ である。

【 0 2 0 8 】

実施態様の 1 つでは、 R_b は $-Br$ である。

30

別の実施態様では、 R_b 及び R_d は双方とも $-Br$ である。

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 0 . 1 ~ 約 1 0 当量の式 1 2 の化合物が使用される。

【 0 2 0 9 】

別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 0 . 5 ~ 約 5 当量の式 1 2 の化合物が使用される。

さらに別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 1 ~ 約 2 当量の式 1 2 の化合物が使用される。

【 0 2 1 0 】

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 1 ~ 約 1 0 当量の塩基が使用される。

40

別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 3 ~ 約 7 当量の塩基が使用される。

【 0 2 1 1 】

その上別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 5 ~ 約 6 当量の塩基が使用される。

スキーム 3 の方法の使用に好適な塩基は、たとえば、トリエチルアミン、リチウム N - ジイソプロピルアミド、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、ルチジン及びイミダゾールのような有機塩基、並びに、たとえば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム及び炭酸セシウムを含むアルカリ金属炭酸塩のような無機塩基である。

50

(89)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 0 2 1 2 】

実施態様の 1 つでは、塩基はトリエチルアミンである。

別の実施態様では、塩基は炭酸カリウムである。

スキーム 3 の方法は、たとえば、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、T H F、D M F、D M S O、酢酸エチル、アセトン、ベンゼン、ジエチルエーテル、水又はこれらの混合物のような溶媒の存在下で行うことができる。

【 0 2 1 3 】

実施態様の 1 つでは、溶媒はアセトニトリルである。

別の実施態様では、溶媒は D M F である。

さらに別の実施態様では、溶媒が水でない場合、溶媒は実質的に無水であり、すなわち 10
、約 1 % 未満の水を含む。

【 0 2 1 4 】

実施態様の 1 つでは、スキーム 3 の方法は約 0 . 5 時間 ~ 約 4 8 時間の時間で実施される。

別の実施態様では、スキーム 3 の方法は約 3 時間 ~ 約 3 6 時間の時間で実施される。

【 0 2 1 5 】

さらに別の実施態様では、スキーム 3 の方法は約 8 時間 ~ 約 2 4 時間の時間で実施される。

その上別の実施態様では、スキーム 3 の方法は約 1 5 時間 ~ 約 2 0 時間の時間で実施される。 20

【 0 2 1 6 】

さらなる実施態様では、スキーム 3 の方法は約 0 °C ~ 約 2 0 0 °C の温度にて実施される。

別の実施態様では、スキーム 3 の方法は約 2 5 °C ~ 約 1 5 0 °C の温度にて実施される。

【 0 2 1 7 】

さらに別の実施態様では、スキーム 3 の方法は約 5 0 °C ~ 約 1 0 0 °C の温度にて実施される。

式 1 3 の化合物を調製するための一般的手順

アセトニトリルのような好適な溶媒中の式 1 1 (約 1 ~ 約 2 当量) の無水ホモフタル酸の溶液に、式 1 2 の化合物 (約 1 ~ 約 2 当量) を加え、続いてトリエチルアミンのような好適な塩基 (約 1 ~ 約 5 当量) を加える。得られた反応物を約 1 時間攪拌し、その時間に 30
、着色された沈殿物が出現する。次いで、反応物を約 2 0 時間、加熱還流し、室温に冷却して過する。アセトニトリルを用いて、着色した固形物を洗浄し、減圧下で乾燥して式 1 3 の化合物を得る。


【 0 2 1 8 】

(90)

J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

【 化 2 0 】

スキーム4



10

20

【 0 2 1 9 】

アミド誘導体、2-ジメチルアミノ-N-(5-オキソ-5,11-ジヒドロ-6H-インデノ[1,2-c]-イソキノリン-2-イル)-アセトアミド(17)は、5-クロロ-11H-インデノ[1,2-c]-イソキノリン(14)から調製した。化合物14をニトロ化に供し、ニトロ化合物15を得、ギ酸アンモニウムを用いそれを還元してアミン16を得、それをアセトアミド17に誘導体化し、次いで、クロロアセトアミド中間体をアミノ化した。2-ブromo-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]-イソキノリン(18)は、化合物14のプロモ化によって調製した。

30

【 0 2 2 0 】

スキーム5は、R₅及びXが酸素である、式(I)の酸素置換イソキノリン誘導体を作製するのに有用な方法を説明する。

【 0 2 2 1 】


40

(91)



J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

【 化 2 1 】


スキーム5



10



20



30

【 0 2 2 2 】

スキーム中、

 $R_1 \sim R_5$ は、式 (I) に関して上記と同義であり； R_a の各存在は、独立して $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり； R_b は、 $-Cl$ 、 $-Br$ 、 $-I$ 、 $-OMs$ 、 $-OTs$ 又は $-OTf$ であり； R' は、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、アルカノール又はアルキルカルボキシであり； R'' は、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、アリール、複素環、アルカノール又はアルキルカルボキシである。

【 0 2 2 3 】

実施態様の 1 つでは、 R_a はメチルである。

40

別の実施態様では、 R_b は $-Br$ である。

スキーム 5 にて上で説明される別の実施態様では、式 22 のイソキノリン化合物は、塩基の存在下、式 22 の化合物を作製するのに十分な温度にて式 20 の化合物と式 21 の化合物をしばらく接触させることを含む方法によって作製することができる。

【 0 2 2 4 】

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 21 の化合物当たり、約 0.1 ~ 約 10 当量の式 20 の化合物が使用される。

別の実施態様では、約 1 当量の式 21 の化合物当たり、約 0.5 ~ 約 5 当量の式 20 の化合物が使用される。

【 0 2 2 5 】

50

(92)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

さらに別の実施態様では、約 1 当量の式 2 1 の化合物当たり、約 1 ~ 約 2 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 2 1 の化合物当たり、約 1 ~ 約 1 0 当量の塩基が使用される。

【 0 2 2 6 】

別の実施態様では、約 1 当量の式 2 1 の化合物当たり、約 3 ~ 約 7 当量の塩基が使用される。

その上別の実施態様では、約 1 当量の式 2 1 の化合物当たり、約 5 ~ 約 6 当量の塩基が使用される。

【 0 2 2 7 】

方法での使用に好適な塩基は、たとえば、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、ルチジン及びイミダゾールのような有機塩基、並びに、たとえば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム及び炭酸セシウムのようなアルカリ金属炭酸塩のような無機塩基である。

【 0 2 2 8 】

実施態様の 1 つでは、塩基は炭酸カリウムである。

別の実施態様では、塩基はトリエチルアミンである。

方法は、たとえば、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、T H F、D M F、D M S O、酢酸エチル、アセトン、ベンゼン、ジエチルエーテル、水又はこれらの混合物のような溶媒の存在下で行うことができる。

【 0 2 2 9 】

実施態様の 1 つでは、溶媒は D M F である。

別の実施態様では、溶媒は、アセトニトリルである。

さらに別の実施態様では、溶媒は実質的に無水であり、すなわち、約 1 % 未満の水を含む。

【 0 2 3 0 】

実施態様の 1 つでは、方法は約 1 時間 ~ 約 9 6 時間の時間で実施される。

別の実施態様では、方法は約 1 8 時間 ~ 約 7 2 時間の時間で実施される。

さらに別の実施態様では、方法は約 2 4 時間 ~ 約 4 8 時間の時間で実施される。

【 0 2 3 1 】

実施態様の 1 つでは、方法は約 2 5 °C ~ 約 2 0 0 °C の温度にて実施される。

別の実施態様では、方法は約 5 0 °C ~ 約 1 5 0 °C の温度にて実施される。

さらに別の実施態様では、方法は約 7 5 °C ~ 約 1 2 5 °C の温度にて実施される。

【 0 2 3 2 】

スキーム 6 は、本発明の窒素置換のイソキノリン誘導体を作製するのに有用な方法を説明する。

【 0 2 3 3 】

10

20


30

(93)

J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

【 化 2 2 】

スキーム6



10

20

30

40

【 0 2 3 4 】

スキーム7にて以下で説明する代替の実施態様では、一般式37の窒素置換イソキノリン誘導体は、塩基の存在下、式37の化合物を作製するのに十分な温度にて式36の化合物と式11又は式20の化合物をしばらく接触させることを含む方法によって作製することができる。


【 0 2 3 5 】

(94)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【 化 2 3 】

スキーム7



20


20a: $R_1-R_4 = H$
 $R_a = CH_3$
 $R_b = Br$



36



37



11

【 0 2 3 6 】

スキーム中、

 $R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式 (I) に関して上記と同義であり ; R_a の各存在は、独立して $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり ; R_b は、 $-Cl$ 、 $-Br$ 、 $-I$ 、 $-OMs$ 、 $-OTs$ 又は $-OTf$ であり ; R_c は、 $C_1 \sim C_5$ のアルキルである。

【 0 2 3 7 】

実施態様の 1 つでは、 R_a はメチルである。別の実施態様では、 R_b は $-Br$ である。さらなる実施態様では、 R_a はメチルであり、且つ R_b は $-Br$ である。

【 0 2 3 8 】

さらに別の実施態様では、 R_c はメチルである。

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 36 の化合物当たり、約 0.1 ~ 約 10 当量の式 11 の化合物が使用される。

【 0 2 3 9 】

別の実施態様では、約 1 当量の式 36 の化合物当たり、約 0.5 ~ 約 5 当量の式 11 の化合物が使用される。

(95)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

さらに別の実施態様では、約 1 当量の式 3 6 の化合物当たり、約 1 ~ 約 2 当量の式 1 1 の化合物が使用される。

【 0 2 4 0 】

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 3 6 の化合物当たり、約 0 . 1 ~ 約 1 0 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

別の実施態様では、約 1 当量の式 3 6 の化合物当たり、約 0 . 5 ~ 約 5 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

【 0 2 4 1 】

さらに別の実施態様では、約 1 当量の式 3 6 の化合物当たり、約 1 ~ 約 2 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

10

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 3 6 の化合物当たり、約 1 ~ 約 1 0 当量の塩基が使用される。

【 0 2 4 2 】

別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 3 ~ 約 7 当量の塩基が使用される。

その上別の実施態様では、約 1 当量の式 1 1 の化合物当たり、約 5 ~ 約 6 当量の塩基が使用される。

【 0 2 4 3 】

スキーム 7 の方法の使用に好適な塩基は、たとえば、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、ルチジン及びイミダゾールのような有機塩基、並びに、たとえば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム及び炭酸セシウムのようなアルカリ金属炭酸塩のような無機塩基である。

20

【 0 2 4 4 】

実施態様の 1 つでは、塩基は炭酸カリウムである。

別の実施態様では、塩基はトリエチルアミンである。

スキーム 7 の方法は、たとえば、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、T H F、D M F、D M S O、酢酸エチル、アセトン、ベンゼン、ジエチルエーテル、水又はこれらの混合物のような溶媒の存在下で行うことができる。

【 0 2 4 5 】

実施態様の 1 つでは、溶媒は D M F である。

30

別の実施態様では、溶媒は、アセトニトリルである。

さらに別の実施態様では、溶媒は実質的に無水であり、すなわち、約 1 % 未満の水を含む。

【 0 2 4 6 】

実施態様の 1 つでは、スキーム 7 の方法は約 1 時間 ~ 約 9 6 時間の時間で実施される。

別の実施態様では、スキーム 7 の方法は約 1 8 時間 ~ 約 7 2 時間の時間で実施される。

さらに別の実施態様では、スキーム 7 の方法は約 2 4 時間 ~ 約 4 8 時間の時間で実施される。

【 0 2 4 7 】

実施態様の 1 つでは、スキーム 7 の方法は約 2 5 °C ~ 約 2 0 0 °C の温度にて実施される

40

。別の実施態様では、スキーム 7 の方法は約 5 0 °C ~ 約 1 5 0 °C の温度にて実施される。

【 0 2 4 8 】

さらに別の実施態様では、スキーム 7 の方法は約 7 5 °C ~ 約 1 2 5 °C の温度にて実施される。

式 3 7 の化合物を調製するための一般的手順

< ホモフタレートから >

不活性の雰囲気下、D M F のような溶媒中の式 2 0 のホモフタレート (約 1 当量) と式 3 6 の N - アシルアントラニロニトリル (約 1 ~ 約 2 当量) の溶液に、炭酸カリウムのような塩基 (約 5 当量) を加え、約 1 0 0 °C にて約 4 8 時間、反応物を攪拌し、次いで室温

50

(96)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

に冷却する。次いで反応混合物を約 1 N の水酸化ナトリウムに注ぎ、得られた溶液を E t O A c で抽出する。E t O A c 層を 1 N の H C l と飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥し、ろ過し減圧下で濃縮する。トルエンで温めることを用いて、得られた残渣を溶解し、得られた溶液を室温に冷却し、ヘキサンを用いて沈殿させる。固形沈殿物をろ過し、ヘキサンを用いて洗浄し、50℃の減圧オーブンで72時間乾燥し、式36の化合物を得る。

【0249】


スキーム7における有用な中間体であるフェニルアミド36の合成は、スキーム8にて以下で記載される。この手順では、酸の存在下、塩化アシル又は無水物を用いて、式38のシアノアニリン化合物のアミン基がアシル化される。

10



【0250】

【化24】

スキーム8



38



36

36a: R₇-R₁₀=-H
R_c = CH₃

20

【0251】

スキーム中、

R₇ ~ R は、式 (I) に関して上記と同義であり；

R_c は、C₁ ~ C₅ のアルキルである。

30

【0252】

スキーム8の方法での使用に好適な酸には、硫酸及びリン酸が挙げられるが、これらに限定されない。

実施態様の1つでは、酸は硫酸である。

【0253】

別の実施態様では、R_c はメチルである。

スキーム8の方法は、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、T H F、D M F、D M S O、酢酸エチル、アセトン、ベンゼン、ジエチルエーテル又はこれらの混合物を含むが、これらに限定されない溶媒の存在下で行うことができる。

40

式36の化合物を作製するための一般的手順

90℃にて、無水酢酸(約6当量)中の式38の化合物(約1当量)の溶液に、硫酸(触媒的)を一滴加え、得られた反応物を約90℃にて約2時間攪拌し、次いで、室温にて約12時間静置する。得られた反応混合物を氷上に注ぎ、得られた溶液を約2時間攪拌し、その後、1Nの水酸化ナトリウムを用いて、溶液を約pH7.0に中和する。得られた沈殿物をろ過し、水で洗浄し(約4回)減圧下で約72時間乾燥して式36の化合物を得る。

【0254】

スキーム9にて以下で説明される別の実施態様では、式40のイオウ置換のイソキノリ

50

(97)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

ン誘導体は、塩基の存在下、式40の化合物を作製するのに十分な温度にて式39の化合物と式11a又は式20の化合物をしばらく接触させることを含む方法によって作製することができる。

【0255】

【化25】

スキーム9



【0256】

$R_1 \sim R_4$ 及び $R_7 \sim R_{10}$ は式(I)に関して上記と同義であり；

R_a の各存在は、独立して $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_b は、 $-Cl$ 、 $-Br$ 、 $-I$ 、 $-OMs$ 、 $-OTs$ 又は $-OTf$ であり；

R_d は、 $-H$ 又は $-Br$ である。

【0257】

実施態様の1つでは、 R_a はメチルである。

別の実施態様では、 R_b は $-Br$ である。

さらに別の実施態様では、 R_a はメチルであり、且つ R_b は $-Br$ である。

【0258】

その上別の実施態様では、 R_d は $-H$ である。

さらなる実施態様では、 R_d は $-Br$ である。

実施態様の1つでは、約1当量の式39の化合物当たり、約0.1～約10当量の式11aの化合物が使用される。

【0259】

別の実施態様では、約1当量の式39の化合物当たり、約0.5～約5当量の式11aの化合物が使用される。

さらに別の実施態様では、約1当量の式39の化合物当たり、約1～約2当量の式11

10

20

30

40

50

(98)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

a の化合物が使用される。

【 0 2 6 0 】

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 0 . 1 ~ 約 1 0 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

別の実施態様では、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 0 . 5 ~ 約 5 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

【 0 2 6 1 】

さらに別の実施態様では、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 1 ~ 約 2 当量の式 2 0 の化合物が使用される。

実施態様の 1 つでは、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 1 ~ 約 1 0 当量の塩基が使用される。 10

【 0 2 6 2 】

別の実施態様では、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 3 ~ 約 7 当量の塩基が使用される。

その上別の実施態様では、約 1 当量の式 3 9 の化合物当たり、約 5 ~ 約 6 当量の塩基が使用される。

【 0 2 6 3 】

スキーム 9 の方法での使用に好適な塩基は、たとえば、トリエチルアミン、リチウム N - ジイソプロピルアミド、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、ルチジン及びイミダゾールのような有機塩基、並びに、たとえば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム及び炭酸セシウムを含むアルカリ金属炭酸塩のような無機塩基である。 20

【 0 2 6 4 】

実施態様の 1 つでは、塩基は炭酸カリウムである。

別の実施態様では、塩基はトリエチルアミンである。

スキーム 9 の方法は、たとえば、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、T H F、D M F、D M S O、酢酸エチル、アセトン、ベンゼン、ジエチルエーテル、水又はこれらの混合物のような溶媒の存在下で行うことができる。

【 0 2 6 5 】

実施態様の 1 つでは、溶媒は D M F である。

別の実施態様では、溶媒はアセトニトリルである。 30

実施態様の 1 つでは、スキーム 9 の方法は約 1 時間 ~ 約 1 2 0 時間の時間で実施される。

【 0 2 6 6 】

別の実施態様では、スキーム 9 の方法は約 2 4 時間 ~ 約 9 6 時間の時間で実施される。

さらに別の実施態様では、スキーム 9 の方法は約 6 0 時間 ~ 約 8 0 時間の時間で実施される。

【 0 2 6 7 】

実施態様の 1 つでは、スキーム 9 の方法は約 0 °C ~ 約 2 0 0 °C の温度にて実施される。

別の実施態様では、スキーム 9 の方法は約 2 5 °C ~ 約 1 5 0 °C の温度にて実施される。

さらに別の実施態様では、スキーム 9 の方法は約 5 0 °C ~ 約 1 0 0 °C の温度にて実施される。 40

式 4 0 の化合物を調製するための一般的手順

< 無水ホモフタル酸から >

不活性の雰囲気下で、アセトニトリルのような好適な溶媒中の式 3 9 のメルカプトベンゾニトリル (約 1 . 0 当量) と式 1 1 a の無水ホモフタル酸 (約 2 . 0 当量) の溶液を反応物質がすべて溶液になるまで攪拌しながら温める。トリエチルアミンのような好適な塩基 (約 1 ~ 約 5 当量) を加え、約 9 0 °C にて約 7 2 時間、反応物を攪拌し、次いで、室温に冷却する。反応混合物をろ過し、メタノールを用いて、回収した固形物を洗浄し、次いで約 5 0 °C の減圧オープンにて乾燥して式 4 0 の化合物を得る。

< ホモフタレートから >

50

(99)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

不活性の雰囲気下、アセトニトリルのような好適な溶媒中の式39のメルカプトベンゾニトリル（約1.0当量）と式20のホモフタレート（約2.0当量）の溶液を反応物質がすべて溶液になるまで攪拌しながら温める。トリエチルアミンのような好適な塩基（約1～約5当量）を加え、約90℃にて約72時間、反応物を攪拌し、次いで、室温に冷却する。反応混合物をろ過し、メタノールを用いて、回収した固形物を洗浄し、次いで約50℃の減圧オープンにて乾燥して式40の化合物を得る。

【0268】


式(IV)のイソキノリン誘導体を作製する方法をスキーム10にて以下で説明する。

【0269】

【化26】

10

スキーム10



20

30

40

【0270】

スキーム中、n、Z₁ 及び Z₂ は式(IV)に関して上記と同義であり；

X は、臭化物又は塩化物のような脱離基であり；

R_b は、-Cl、-Br、-I、-OMs、-OTs 又は -OTf であり；

R_e の一方は -H であり、R_e の他方は -NO₂ であり；

50

(100)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

R_f の一方は $-H$ であり、 R_f の他方は $-NH_2$ であり；
 R_g の一方は $-H$ であり、 R_g の他方は $-NHCO(O)-(CH_2)_n-X$ であり；
 R_h の一方は $-H$ であり、 R_h の他方は $-NHCO(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ である。

【0271】

実施態様の1つでは、 R_b は $-Br$ である。

式56の化合物を調製するための一般的手順

アセトニトリルのような好適な溶媒中の無水ホモフタル酸(11b)(約1.0当量)に、式51の化合物(約1～約2当量)を加え、次いで、トリエチルアミン(約1～約5当量)のような好適な塩基を加える。得られた反応混合物を約1時間攪拌し、その時点で沈殿物が出現する。次いで、反応混合物を約20時間加熱還流し、室温に冷却し、ろ過する。回収した固形物をアセトニトリルで洗浄し、減圧下で乾燥して式53の化合物を得る。

10

【0272】

2段階で無水ホモフタル酸(11b)と無水安息香酸から化合物52を調製する。 HCl のような酸の存在下、ピリジンのような好適な溶媒中で無水ホモフタル酸と無水安息香酸を反応させ；続いて、ピリジン中で無水酢酸と反応させ、加熱還流し、次いで $MeOH$ 中の NH_3 のようなアミンの存在下、還流して式52の化合物を得る。

【0273】

DMF のような好適な溶媒中の式52又は53の化合物の溶液に、炭素上のパラジウムの存在下、ギ酸アンモニウムのような還元剤を加える。反応混合物を $90 \sim 100^\circ C$ に加熱し、室温に冷却し、ろ過して式54の化合物を得る。

20

【0274】

式55のアミドを形成するのに有効な条件下で、式54の化合物は、 $X-(CH_2)_n-COCl$ と反応することができる。

エタノール又は DMF のような溶媒の存在下、式55の化合物は、式 $NH-Z_1Z_2$ のアミンと反応することができ、加熱還流によって式56の化合物を形成する。

【0275】

本発明は、以下の実施形態においてさらに説明されるが、それらは請求項に記載される本発明の範囲を限定するものではない。以下の実施形態は例示的なイソキノリン誘導体の合成を説明し、症状を治療すること又は予防することに対する有用性を明らかにしている。

30

(実施例1) 例示となるイソキノリン誘導体の調製

(a) 一般的方法

$Varian 300 MHz$ 分光光度計を用いてプロトン NMR のスペクトルを得たが、化学的シフト値(δ)を百万分の1(ppm)単位で記録する。シリカゲル60F-254で事前に被覆したTLC板を用いてTLCを行い、事前に被覆したワットマン60ATLC板を用いて調製用TLCを行った。中間体及び生成物の性状分析はすべて、 ^1H-NMR 及び/又はMSデータに基づいて行った。

(b) 5,6-ジヒドロ-5,11-ジケト-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(2)の調製


40

【0276】

(101)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 7】

**2**

10

【 0 2 7 7】

NH_3 / MeOH (7.0 N、700 mL) 中の **1** (55 g、0.22 モル) (スキーム 1) の攪拌された懸濁液を 24 時間還流した。次いで、反応混合物を室温に冷却し、ろ過し、 MeOH で洗浄して、収率 84% にて 46 g の橙色の前出標記の生成物を得た。

^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$): δ 7.48–7.61 (m, 4H), 7.80–7.88 (m, 1H), 7.86 (d, $J = 8.7 \text{ Hz}$, 1H), 8.22 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1H), 8.44 (d, $J = 7.5 \text{ Hz}$, 1H), 13.05 (s, 1H); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-D_6$):

δ 106.33, 121.63, 122.94, 123.27, 124.80, 128.45, 132.17, 133.60, 134.03, 134.68, 134.68, 134.81, 137.09, 156.41, 163.76, 190.57; MS (ES^-): m/z 246.2 ($\text{M}-1$); Anal. Calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_9\text{NO}_2$: C, 77.72; H, 3.67; N, 5.67; Found: C, 77.54; H, 3.69, N, 5.69.


20

(c) (±) 11-ヒドロキシ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン (3a) の調製

【 0 2 7 8】

30

【化 2 8】

**3a**

40

【 0 2 7 9】

EtOH (25 mL) 中の **2** (2.5 g、0.01 モル) の攪拌された懸濁液に、室温にて NaBH_4 (3.75 g、0.1 モル) を少しずつ 30 分かけて加えた。反応混合物をさらに 2 時間攪拌し、次いで 0℃ に冷却した。次いで 10% の HCl (10% 溶液) で粉砕した。沈殿して得られた固形物をろ過し、水及び MeOH で洗浄して **3a** (2.32 g、92%) を得た。

^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$): δ 5.58 (d, $J = 8.1 \text{ Hz}$, 1H), 5.78 (d, $J = 8.7 \text{ Hz}$, 1H), 7.33–7.89 (m, 6H), 7.95 (d, $J = 7.8 \text{ Hz}$, 1H), 8.

50

(102)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

^2H (d, $J = 7.8 \text{ Hz}$, 1H), ^1H 12.29 (s, 1H); ^{13}C NMR (DMSO- d_6): δ 77.44, 118.81, 120.15, 124.28, 125.04, 125.67, 126.34, 128.46, 128.64, 128.95, 133.27, 135.62, 136.12, 139.93, 148.55, 163.69; MS (ES $^+$): m/z 250.1 (M+1); Anal. Calcd for $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_2$: C, 77.10; H, 4.45; N, 5.62. Found: C, 77.01; H, 4.57; N, 5.59.


【0280】

同様に、2をそれぞれ、MeMgI及びm-MeO-C₆H₄MgBrと反応させることによって化合物、(±)11-ヒドロキシ-11-メチル-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(3b)及び(±)11-ヒドロキシ-11-(3-メトキシフェニル)-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(3c)を調製した。


(d)(±)11-置換-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5a~e)の調製

【0281】

【化29】



4a



5a-e

5a: R = NMe₂5b: R = NEt₂

5c: R = -N-methyl-piperazin-4-yl

5d: R = -piperidine-1-yl

5e: R = -morpholin-1-yl

【0282】

ピリジン(10mL)中の3a(0.5g、2ミリモル)の攪拌された懸濁液に0℃にて塩化クロロアセチル(0.81g、0.006モル)を加えた。反応混合物を室温に温め、24時間攪拌した。次いで反応混合物を氷上に注ぎ、EtOAcで抽出した。有機層を分離し、乾燥し、濃縮して粗精製化合物4aを得、それをさらにジメチルアミンで処理し、室温にて24時間攪拌した。反応混合物を氷上に注ぎ、10% HClで処理した。次いで飽和NaHCO₃水溶液で反応混合物を塩基性化し、得られた固形物をろ過して所望の生成物5aを得た。 ^1H NMR (DMSO- D_6): δ 2.31 (s, 6H), 5.00 (s, 1H), 7.28-7.45 (m, 3H), 7.68-7.73 (m, 2H), 7.95 (d, $J = 6.9 \text{ Hz}$, 1H), 8.10 (d, $J = 7.8 \text{ Hz}$, 1H), 8.21 (d, $J = 8.1 \text{ Hz}$, 1H), 12.26 (s, 1H); ^{13}C NMR (DMSO- D_6): δ

(103)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

68.09, 116.28, 120.52, 124.58, 125.74, 126.27, 126.34, 127.68, 128.64, 133.02, 136.27, 144.45, 163.80; MS (ES⁺): m/z 277.2 (M+1)。

【0283】


上記のような4aをそれぞれ、ジエチルアミン、ピペリジン、N-メチルピペラジン及びモルフォリンと反応させることによって、以下の化合物、(±)11-ジエチルアミノ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5b)、(±)11-(N-メチルピペラジン)-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5c)、(±)11-(ピペリジン)-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5d)及び(±)11-モルフォリノ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5e)も調製した。

10


(e)(±)11-モルフォリノ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(5e)の調製

【0284】

【化30】



4b



5e

20

30

【0285】

トリフルオロ酢酸(5mL)中の3a(0.6g、2.4ミリモル)の攪拌された懸濁液に、室温にて三臭化リン(CH₂Cl₂ 3mL中0.1M溶液)を加え、反応混合物を8時間攪拌した。反応混合物を氷上に注ぎ、得られた固形物をろ過してプロモ化合物4b(0.61g、76%)を得た。¹H NMR (DMSO-d₆): δ 7.35-7.50 (m, 3H), 7.61 (d, J=6.6Hz, 1H), 7.73-7.82 (m, 2H), 7.94 (d, J=6.6Hz, 1H), 8.23 (d, J=7.8Hz, 1H), 12.41 (s, 1H); ¹³C NMR (DMSO-d₆): δ 52.06, 79.35, 114.43, 120.56, 123.58, 125.27, 125.50, 126.68, 128.55, 128.86, 129.66, 133.73, 135.91, 136.61, 141.39, 143.95, 163.74。

40

【0286】

化合物4b(0.5g)をMeOH(10mL)に懸濁し、室温にて過剰のモルフォリン(約5.0当量)で処理し、60℃にて3時間攪拌した。反応混合物を氷上に注ぎ、酢酸エチル(40mL)で希釈した。有機層を分離し、希HCl(10%溶液)で抽出し、次いで水性層を飽和NaHCO₃水溶液で塩基性化し、沈殿して得られた固形物をろ過し、乾燥して化合物5e(0.46g、90%)を得た。¹H NMR (DMSO-d₆): δ 2.56 (m, 4H), 3.49 (m, 4H), 5.04 (s

50

(104)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


, 1 H), 7.31-7.45 (m, 3 H), 7.65-7.76 (m, 2 H), 7.96 (d, J = 7.2 Hz, 1 H), 8.20-8.24 (m, 2 H), 12.29 (s, 1 H), ^{13}C NMR (DMSO- D_6): δ 49.36, 67.62, 68.11, 115.20, 120.60, 124.47, 125.84, 126.34, 126.41, 127.76, 128.30, 128.72, 133.09, 136.30, 138.96, 140.35, 144.44, 163.67.

(f) 5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(6)の調製

【0287】

10

【化31】



6

20

【0288】

方法I: トリフルオロ酢酸(10 mL)中のアルコール3a(0.35 g、1.4ミリモル)の攪拌された溶液に、室温にてトリエチルシラン(0.812 g、7ミリモル)を加え、反応混合物を24時間攪拌した。減圧下、トリフルオロ酢酸を蒸発させ、得られた粗生成物にEtOAcを加えた。得られた固形物をろ過し、 H_2O 及びEtOAcで洗浄して前出標記の化合物6(0.285 g、87%)を得た。 ^1H NMR (DMSO- D_6): δ 3.89 (s, 2 H), 7.30-7.47 (m, 3 H), 7.59 (d, J = 6.9 Hz, 1 H), 7.72-7.74 (m, 2 H), 7.98 (d, J = 7.8 Hz, 1 H), 8.23 (d, J = 8.4 Hz, 1 H), 12.31 (s, 1 H); ^{13}C NMR (DMSO- D_6): δ 33.51, 116.50, 120.19, 124.01, 125.51, 125.55, 126.42, 127.50, 127.68, 128.56, 133.45, 136.39, 137.53, 140.18, 143.80, 163.46; MS (ES): m/z 232.1 (M-1); Anal. Calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{NO}$: C, 82.38; H, 4.75; N, 6.00. Found: C, 81.79; H, 4.45, N, 5.99.

30

【0289】

40

方法II: トリフルオロ酢酸(2.5 L)中の2(40 g、0.16モル)の攪拌された懸濁液に、室温にてトリエチルシラン(94 g、0.8モル)を少しずつ加え、反応混合物を96時間攪拌し、その間、反応の進行をTLC(溶離剤-5% MeOH/ CH_2Cl_2)を用いてモニターした。反応混合物をゆっくり氷上に注ぎ、ろ過し大量の H_2O とMeOHで洗浄し、減圧下で乾燥して、前出標記の化合物6(33.1 g、88%)を得たが、そのスペクトルデータは、方法Iを用いて得られた化合物6の試料と同一であった。

(g) 9-クロロスルホニル-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリン(7)の調製


【0290】

50

(105)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 2】



7

10

【0291】

0℃にて、化合物6(40g、0.17mol)を少しずつクロロスルホン酸(112mL、1.71mol)に加え、反応混合物を室温に温め、2時間撹拌した。反応混合物をゆっくり氷上に注ぎ、得られた黄色の固形物をろ過し、水とEtOAcで十分に洗浄し、減圧下で乾燥して、前出標記の生成物7(52g、92%)を得た。¹H NMR (DM SO-d₆): δ 3.91 (s, 2H), 7.43-7.48 (m, 1H), 7.60 (d, J=7.2Hz, 1H), 7.74-7.76 (m, 2H), 7.79 (s, 1H), 7.90 (d, J=7.5Hz, 1H), 8.23 (d, J=7.8Hz, 1H), Anal. Calcd. for C₁₆H₁₂ClNO₄S: C, 54.94; H, 3.46; N, 4.00. Found: C, 55.28; H, 3.43, N, 3.68, Karl-Fisher, 2.95.

20


(h) 5,6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1,2-c]イソキノリンの9-スルホンアミド誘導体(8a~af)の調製

【0292】

(106)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 3】



8a-af

- a. R=4-Methyl-piperazine-1-yl
 b. R=4-CH₂CO₂Me-piperazine-1-yl
 c. R=4-CH₂CH₂OH-piperazine-1-yl
 d. R=imidazole-1-yl
 e. R=L-prolinol
 f. R=morpholine-4-yl
 g. R=NHCH₂CH₂NMe₂
 h. R=NHCH₂CH₂-piperidine-1-yl
 i. R=NHCH₂CH₂N-(pyridine-2-yl)
 j. R=NHCH₂CH₂-morpholine-4-yl
 k. R=NHCH₂CH₂-(2-N-Me-tetrahydropyrrolidine-1-yl)
 l. R=NHCH₂CH₂CH₂-morpholine-4-yl
 m. R=NHCH₂CH₂CH₂-(tetrahydropyrrolidine-1-yl)
 n. R=NHCH₂CH₂CH₂-imidazole-1-yl
 o. R=NHCH₂CH₂CH₂-(4-methylpiperazine-1-yl)
 p. R=N(CH₂CH₂NEt₂)₂

- q. R=N(CH₂CH₂NMe₂)₂
 r. R=N(CH₂CH₂OH)₂
 s. R=NHCH₂CH₂CN
 t. R=NHC(NH)NH₂
 u. R=NH[4-(1,2,4-triazole)]
 v. R=NH[4-(N-morpholine)phenyl]
 w. R=NHCH₂CH₂-(4-N-benzylpiperidine)
 x. R=NHCH₂CH₂-(2-thienyl)
 y. R=NH[1-(4-azabenzimidazole)]
 z. R=NH[1-(4-(2'-pyridyl)piperazine)]
 aa. R=NHCH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
 ab. R=NH[1-(4-benzpiperazine)]
 ac. R=NH₂
 ad. R=NHCH₂CH₂Ph
 ae. R=NHCH₂CH₂[4-OMe(phenyl)]
 af. R=NHC(O)(N-morpholine)

【0 2 9 3】

方法 I : EtOAc 中の 3-(4-モルフォリノ)-1-プロピルアミン (17.28 g、0.12 モル) の攪拌された懸濁液に、飽和 NaHCO₃ 水溶液 (300 mL) を加え、混合物を 15 分間攪拌した。次いで室温にて、化合物 7 (4.0 g、0.012 モル) を少しずつ導入した。反応混合物を 24 時間攪拌し、ろ過し、H₂O、EtOAc 及び MeOH で洗浄し、MeOH 中で 30 分間還流し、まだ温かい間にろ過し、MeOH で洗浄して遊離の塩基として化合物 81 (2.33 g、44%) を得た。¹H NMR (DMSO-d₆) : δ 1.47-1.52 (m, 2H), 2.16-2.21 (m, 4H), 2.47-2.48 (m, 2H), 3.44-3.48 (m, 2H), 3.23 (m, 4H), 4.02 (s, 2H), 7.49-7.58 (m, 1H), 7.78-7.82 (m, 3H), 7.97 (s, 1H), 8.14 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.26 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 9.59 (s, 1H), 12.42 (s, 1H)

【0 2 9 4】

方法 I によって、しかし、3-(4-モルフォリノ)-1-プロピルアミンをそれぞれ、イミダゾール、2-ジメチルアミノ-エチルアミン、2-(N-ペペリジニル)-エチルアミン、2-(N-モルフォリニル)-エチルアミン、3-(N-テトラヒドロピロリジニル)-プロピルアミン、3-(N-イミダゾリル)-プロピルアミン、3-(N-(4-メチルピペラジニル)-プロピルアミン、ジ-(2-(ジエチルアミノ)-エチル)アミン、ジ-(2-(ジメチルアミノ)-エチル)アミン及びジ-(2-ヒドロキシエチル)アミンで置換することによって 8 d、8 g、8 h、8 j、8 m ~ 8 r の遊離の塩基も調製した。

(107)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【0295】

方法II: CH_2Cl_2 (100 mL) 中の3-(4-モルフォリノ)-1-プロピルアミン (4.250 g) の攪拌された懸濁液に、7 (1.950 g、5.89ミリモル) を加え、得られた混合物を5分間攪拌した。続いて、トリエチルアミン (3 mL) を加え、反応混合物を室温にて24時間攪拌した。この後、沈殿物を回収し、 MeOH (100 mL で2回) で洗浄し、粗精製した固形生成物を丸底フラスコに移した。この物質を MeOH (200 mL) で希釈し、30分間加熱還流し、まだ温かい間ろ過した。得られたろ過物を MeOH (200 mL) で洗浄して8 l の遊離の塩基 (1.460 g、56%) として所望の生成物を得た。

【0296】

方法IIを用いて、しかし、3-(4-モルフォリノ)-1-プロピルアミンをそれぞれ、ほぼ等量のイミダゾール、2-ジメチルアミノ-エチルアミン、2-(N-ピペリジニル)-エチルアミン、2-(N-モルフォリニル)-エチルアミン、3-(N-テトラヒドロピロリジニル)-プロピルアミン、3-(N-イミダゾリル)-プロピルアミン、3(N-(4-メチルピペラジニル)-プロピルアミン、ジ-(2-ジエチルアミノ)-エチルアミン、ジ-(2(ジメチルアミノ)-エチル)アミン及びジ-(2-ヒドロキシエチル)アミンで置換することによって8 d、8 g、8 h、8 j、8 m、8 n、8 o、8 p、8 q 及び8 r の遊離の塩基を調製した。

(k) 8 l のメシル酸塩の調製

0 °C にて、遊離の塩基 8 l (1.0 g) をメタンスルホン酸 (10 mL) に加え、得られた混合物を室温に温め、2時間攪拌した。次いで、反応混合物を冷却 MeOH (100 mL、-10 °C ~ 0 °C の間) に注ぎ、沈殿した固形物をろ過し、 MeOH (100 mL) で洗浄し、減圧下で乾燥した。次いで、乾燥した固形物を水 (100 mL) に溶解し、ろ過し、凍結乾燥してメタンスルホン酸一水和物塩 8 l (1.020 g、84%) を得た。

^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$): δ 1.75-1.85 (m, 2H), 2.35 (s, 3H), 2.78-2.84 (m, 2H), 2.96-3.12 (m, 4H), 3.36 (d, $J=12.3\text{ Hz}$, 2H), 3.61 (t, $J=11.4\text{ Hz}$, 2H), 3.94 (d, $J=12.9\text{ Hz}$, 2H), 4.03 (s, 2H), 7.49-7.55 (m, 1H), 7.76-7.84 (m, 3H), 7.99 (d, $J=0.9\text{ Hz}$, 1H), 8.15 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 8.25 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 9.59 (s, 1H), 12.42 (s, 1H); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$): δ 24.27, 33.86, 51.89, 54.51, 64.02, 119.70, 120.39, 123.53, 126.09, 126.45, 128.63, 133.66, 135.80, 138.71, 141.21, 144.57, 163.29; Anal. Calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_4\text{S}_2$: C, 52.06; H, 5.46; N, 7.59, Karl-Fisher, 3.36. Found: C, 51.85; H, 5.35, N, 7.30, Karl-Fisher, 4.32.

【0297】

同様に、メタンスルホン酸をそれぞれ、ほぼ等量の HCl 、 H_2SO_4 及び CH_3COOH で置換することによって8 l の HCl 、 H_2SO_4 、 CH_3COOH 及びコハク酸の塩を調製した。


(l) 5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-11H-インデノ[1, 2-c]イソキノリン (6) の調製

【0298】

(108)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 4】



6

10

【0299】

アセトニトリル (15 mL) 中の無水ホモフタル酸 (324 mg、2.0 ミリモル) の溶液に、2-シアノベンジルブロミド (431 mg、2.0 ミリモル、1.0 当量) 及びトリエチルアミン (5 mL) を加えた。室温にて不活性の雰囲気下、反応物を30分間攪拌し、その後、黄色の沈殿物が出現した。次いで、反応混合物を18時間加熱還流し、得られた白色の沈殿物をろ過し、アセトニトリル (8 mL で3回) を用いて洗浄し、減圧下乾燥して白色結晶の固形物として化合物6を得た。収量 = 150 mg (32%)

20

(m) α-プロモジメチルホモフタレート (20a) の調製

ジメチルホモフタレート (83.1 g) をジクロロメタン (2 L) に溶解し、N-プロモスクシンイミド (121 g、1.7 当量) を加えた。500ワットの石英ハロゲン灯によって、得られた懸濁液を18時間照射し、反応混合物を還流した。次いで、重炭酸ナトリウムの飽和水溶液 (4 L)、重亜硫酸ナトリウムの飽和水溶液 (2 L) 及び塩化ナトリウムの飽和水溶液 (2 L) で順次、反応混合物を洗浄した。硫酸ナトリウムを用いて有機層を乾燥し、少量のシリカを加えて極性の不純物を除いた。有機層をろ過し、減圧下で濃縮して暗橙色の油状物として化合物20aを得た。収量 = 120.3 g (100%)

30

(n) 8-メトキシ-6H-11-オキサ-6-アザ-ベンゾ[α]フルオレン-5-オン (22a) の調製

α-プロモジメチルホモフタレート (20a) (1.16 g) 及び2-ヒドロキシ-5-メトキシベンゾニトリル (0.6 g、4 ミリモル、1 当量) を温めることによって、アセトニトリル (6 mL) に溶解した。次いで、トリエチルアミン (5.6 mL、10 当量) を加え、不活性の雰囲気下、反応物を48時間加熱還流し、次いで、室温に冷却した。反応混合物を飽和重炭酸ナトリウム (40 mL) で希釈し、得られた懸濁液を2時間攪拌し、次いでろ過した。ろ過物を、1 N の HCl (50 mL で2回)、アセトニトリル (50 mL で2回) 及びジクロロメタン (50 mL) で順次洗浄し、次いで50℃の減圧オーブンで3日間乾燥して白色固形物として化合物22aを得た。収量 = 0.81 g (76%)

40

(o) 8-ヒドロキシ-6H-11-オキサ-6-アザ-ベンゾ[α]フルオレン-5-オン (23a) の調製

氷槽を用いて8-メトキシ-6H-11-オキサ-6-アザ-ベンゾ[α]フルオレン-5-オン (22a) (5.0 g) を冷却し、窒素のもと、一定の蒸気の中で三臭化ホウ素 (塩化メチレン中1 M、95 mL、95 ミリモル、5 当量) を加えた。不活性の雰囲気下、反応物を2時間加熱還流し、次いで室温に冷却し、水 (150 mL) に注いだ。得られた懸濁液を1時間攪拌し、ろ過し、固形物を水 (200 mL、2回) で洗浄した。次いで、加熱を用いて、固形物を5 N の水酸化ナトリウム (600 mL) で希釈した。氷槽を用いて得られた溶液を0℃に冷却し、濃 HCl を用いて pH 1 に溶液を酸性化した。得ら

50

(109)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

れた沈殿物を減圧濾過し、固形物を水（300 mL、3回）及びジエチルエーテル（300 mL）で順次洗浄し、50℃の減圧オーブンで一晩乾燥して灰色固形物として化合物（23a）を得た。収量 = 4.74 g（100%）

（p）3-ニトロソ-2-フェニインドール（28）の調製

酢酸（250 mL）中の2-フェニインドール（27）（25 g、0.129 mol）の溶液を18℃に冷却し、反応の温度を約20℃に保持しながら、亜硝酸ナトリウム（8 g、0.115 mol）の水溶液（10 mL）を一滴ずつ加えた。得られた反応物を室温にて30分間攪拌し、次いで氷水（250 mL）で希釈した。反応混合物をろ過し、固形物を水で洗浄し、次いでメタノールを用いて再結晶して化合物28を得た。収量 = 27.5 g（96.4%）。ES-MS: 223.22 ($M^+ + 1$) ; NMR (DMSO- d_6): δ 7.0 (m, 1H), 7.1 (m, 1H), 7.22 (m, 1H), 7.32 (m, 2H), 7.40 (m, 1H), 7.48 (m, 2H), 7.60 (m, 1H)。

10

（q）3-アミノ-2-フェニインドール（29）の調製

エタノール（450 mL）中の3-ニトロソ-2-フェニインドール（28）（25 g、0.129 mol）の溶液に、2Nの水酸化ナトリウム（300 mL、5.0当量）を加え、続いて亜ジチオン酸ナトリウム（38 g）を加えた。反応物を5時間加熱還流し、次いでろ過した。固形物を水で洗浄し、減圧下で乾燥して黄色固形物として化合物29を得た。収量 = 15 g（72.1%）。ES-MS: 209.25 ($M^+ + 1$) ; NMR (DMSO- d_6): δ 7.0 (m, 1H), 7.1 (m, 1H), 7.22 (m, 1H), 7.32 (m, 2H), 7.40 (m, 1H), 7.48 (m, 2H), 7.60 (m, 1H)。

20

（r）2-フェニインドール-3-エチルカルバメート（30）の調製

ジクロロメタン（150 mL）中の3-アミノ-2-フェニインドール（29）（1.7 g、8.17ミリモル）の0℃の溶液に、トリエチルアミン（5 mL、4.5当量）を加え、続いてクロロギ酸エチル（1 mL）を加えた。反応物を15時間攪拌し、その後、反応混合物を水で希釈し、分離用漏斗に移した。水（50 mLで2回）、ブライン（50 mL）で洗浄し、ジクロロメタン（50 mL）を硫酸ナトリウム上で乾燥した。溶媒を除き、減圧下で乾燥して、黒色固形物（1.6 g、72.7%）として化合物30を得た。ES-MS: 281.25 ($M^+ + 1$) ; NMR (DMSO- d_6): δ 1.30 (t, 3H), 4.12 (t, 2H), 7.0 (m, 1H), 7.1 (m, 1H), 7.22 (m, 2H), 7.32 (m, 2H), 7.40 (m, 1H), 7.48 (m, 2H), 7.60 (m, 1H)。

30

（s）6H, 11H-インドロ[3, 2-c]イソキノリン-5-オン（31）の調製

ジフェニルエーテル（10 mL）中の2-フェニインドール-3-アミノエチルカルバメート（30）（1.4 g、5ミリモル）の溶液を4時間加熱還流し、次いで室温に冷却した。反応混合物をろ過し、固形物を温めたヘキサン及び温めたジクロロメタンを用いて順次洗浄し、減圧下で乾燥して灰色固形物として化合物31を得た。収量 = 1.6 g（72.7%）。ES-MS: 235.25 ($M^+ + 1$)。

40

（t）6H, 11H-インドロ[3, 2-c]イソキノリン-5-オン-9, 11-ジアセテート（32）の調製

ジクロロメタン（10 mL）中の6H, 11H-インドロ[3, 2-c]イソキノリン-5-オン（31）の0℃の溶液に、トリエチルアミン（2 mL、3.0当量）を加え、続いて無水酢酸（1.8 mL、3.5当量）を加えた。反応物を室温にて48時間攪拌し、次いで、氷上に注ぎ、ジクロロメタン（100 mL）で抽出した。ジクロロメタン層を、水（20 mLで2回）及びブライン（25 mL）で順次洗浄し、硫酸ナトリウムを用いて乾燥し、減圧下で濃縮した。得られた固形残留物を減圧下で乾燥して、褐色固形物として化合物32を得た。収量 = 180 mg, 83.7%。ES-MS: 430.57 ($M^+ + 1$)。

50

(110)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

(u) 6H, 11H-インドロ[3,2-c]イソキノリン-5-オン-9,11-ジスルホニルクロリド(33)の調製

化合物31(117mg、0.5ミリモル)をクロロスルホン酸(2mL、60当量)に加え、得られた反応混合物を室温で4時間攪拌し、その後、反応混合物を氷上に注いだ。得られた沈殿物をろ過し、水及び酢酸エチルで順次洗浄し、減圧下乾燥して明黄色の固形物として化合物33を得た。収量=180mg(83.7%)。ES-MS: 430.57($M^+ + 1$)。


(v) 6H, 11H-インドロ[3,2-c]イソキノリン-5-オン-9,11-ジスルホンアミド(35a)の調製

0℃にて、メタノール中(10mL)の33(215mg、0.5ミリモル)の溶液に、メタノール中アンモニアの20%溶液を加えた。室温にて反応混合物を15時間攪拌し、次いでろ過した。得られた固形物をメタノールで洗浄し、減圧下で乾燥して黄色の固形物として化合物35aを得た。収量=140mg(71.4%)。ES-MS: 392.81($M^+ + 1$)。

(w) N-アセチルアントラニロニトリル(36a)の調製

【0300】

【化35】



36a


【0301】

90℃にて、無水酢酸(18mL、5.5当量)中のアントラニロニトリル(4.0g、32ミリモル)の溶液に、硫酸を一滴加え、得られた反応物を90℃にて2時間攪拌し、次いで室温で12時間静置した。反応混合物を氷上(約200mL)に注ぎ、得られた溶液を2時間攪拌し、その後、5Nの水酸化ナトリウムを用いて溶液をpH7.0に中和した。得られた沈殿物をろ過し、水(50mLで4回)で洗浄し、減圧下で72時間乾燥して、白色結晶の固形物として化合物36aを得た。収量=1.07g(16%)。

(x) 6H, 11H-インドロ[3,2-c]イソキノリン-5-オン(31)の調製

【0302】

【化36】



31

(111)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【 0 3 0 3 】


< α - プロモジメチルホモフタレートから >

不活性の雰囲気下、 α - プロモジメチルホモフタレート (20a) (603 mg、2.1 ミリモル) 及び N - アセチルアントラニロニトリル (36a) (370 mg、1.1 当量) を DMF (5 mL) に溶解した。炭酸カリウム (1.45 g、5.0 当量) を加え、反応物を 100 °C にて 48 時間攪拌し、次いで室温に冷却した。反応混合物を 1 N の水酸化ナトリウムに注ぎ、得られた混合物を EtOAc (50 mL) で抽出した。EtOAc 層を、1 N の HCl (50 mL)、塩化ナトリウム飽和水溶液 (50 mL) で順次洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥し、ろ過し、減圧下で濃縮した。得られた残留物を温めることによってトルエン (70 mL) に溶解し、溶液を室温に冷却し、ヘキサン (200 mL) の添加の際、固形沈殿物が出現した。固形沈殿物をろ過し、ヘキサン (50 mL) で洗浄し、50 °C の減圧オープンで 72 時間乾燥して黄色の粉末として化合物 31 を得た。収量 = 33 mg (6.7%)。

(y) 6 H, 11 H - チア - 6 - アザ - ベンゾ [a] フルオレン - 5 - オン (40a) の調製

【 0 3 0 4 】

【 化 3 7 】



40a

【 0 3 0 5 】

< 無水ホモフタル酸から >

不活性の雰囲気下、アセトニトリル (150 mL) 中の 2 - メルカプトベンゾニトリル (39a、すなわち、 $R_7 \sim R_{10}$ が水素であるスキーム 9 の化合物 39) (1.35 g、1.0 ミリモル) 及び無水ホモフタル酸 (11b) (1.6 g、10.0 ミリモル、1.0 当量) を、反応物質がすべて溶液になるまで攪拌しながら温めた。トリエチルアミン (6.9 mL、5.0 ミリモル、5.0 当量) を加え、反応物を 72 時間加熱還流し、次いで室温に冷却した。冷却後、反応混合物をろ過し、メタノール (50 mL で 3 回) を用いて、回収した固形物を洗浄し、次いで 50 °C の減圧オープンで乾燥して、白色の固形物として化合物 40a を得た。収量 = 225 mg (9%)。

< α - プロモジメチルホモフタレートから >

不活性の雰囲気下、アセトニトリル (150 mL) 中の 2 - メルカプトベンゾニトリル (39a) (1.35 g、1.0 ミリモル) 及び α - プロモジメチルホモフタレート (20a) (2.87 g、10.0 ミリモル、1.0 当量) を、反応物質がすべて溶液になるまで攪拌しながら温めた。トリエチルアミン (6.9 mL、5.0 ミリモル、5.0 当量) を加え、反応物を 72 時間加熱還流し、次いで室温に冷却した。冷却後、反応混合物をろ過し、メタノール (50 mL で 3 回) を用いて、回収した固形物を洗浄し、次いで 50 °C の減圧オープンで乾燥して、白色の固形物として化合物 40a を得た。収量 = 250 mg (1.0%)。


(112)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

(z) 5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-9-ニトロ-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(53a)の調製

【0306】

【化38】



53a

10

【0307】

CCl₄ (300 mL) 中の 2-メチル-4-ニトロ-ベンゾニトリル (32.4 g、0.2 モル) 及び NBS (44.470 g、0.25 モル) の還流混合物に、AIBN (0.325 g) を加え、得られた反応混合物を 4 時間還流した。反応混合物を AIBN (0.325 g、31 ミリモル) で処理し、さらに 4 時間還流した。反応混合物をろ過し、ろ過したスクシンイミドを CCl₄ で洗浄した。ろ液を減圧下、濃縮し、プロモ化合物 (46 g) を得た。プロモ化合物を MeCN (200 mL) に溶解し、室温にて不活性の雰囲気下、反応混合物に無水ホモフタル酸 (30.780 g、0.19 モル) を加えた。次いで、アセトニトリル (100 mL) 中のトリエチルアミン (84 mL、0.6 モル) の溶液で反応混合物を処理した。反応混合物を 8 時間還流した。形成された沈殿物をろ過により取り出し、MeCN (100 mL) で洗浄した。洗浄した沈殿物を DMF (300 mL) に懸濁し、130 °C に加熱し、次いで冷却し、ろ過した。得られた固形物を DMF (100 mL) で洗浄し、減圧下、乾燥して、淡黄色の固形物 (18.310 g、33%) として化合物 53a を得た。¹H-NMR (DMSO-d₆): δ, 4.09 (s, 2H), 7.56 (m, 1H), 7.81-7.82 (m, 2H), 8.17 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.26-8.34 (m, 2H), 8.44 (s, 1H), 12.47 (s, 1H)。


20

30

(aa) 5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-9-アミノ-インデノ[1, 2-c]イソキノリン(54a)の調製

【0308】

【化39】



54a

40

【0309】

50

(113)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


80℃にて、DMF(100mL)中の化合物53a(5.3g、0.019mol)及びギ酸アンモニウム(5.985g、0.095mol)の懸濁液にPd-C(5%、100mg)を加えた。反応混合物を100℃にて1時間撹拌した。反応混合物が透明になった後、セライトのパッドを介してそれをろ過した。セライトをDMFで洗浄した。次いで、ろ液を氷で希釈し、得られた固形物をろ過し、水で洗浄し、減圧下、80℃で乾燥して化合物54a(3.2g、68%)を得た。¹H-NMR(DMSO-d₆): δ, 3.89(s, 2H), 7.18(d, J=8.4Hz, 1H), 7.40-7.45(m, 2H), 7.66-7.72(m, 2H), 7.94(d, J=8.1Hz, 1H), 8.21(d, J=8.1Hz, 1H), 12.28(s, 1H)。

10

(bb) N-[5,6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1,2-c]イソキノリン-9-イル]-4-ブロム-ブチルアミド(55a)の調製

【0310】

【化40】



55a

20

【0311】

飽和NaHCO₃(150mL)中の化合物54a(1.5g、0.006mol)及び酢酸エチル(100mL)の懸濁液に4-ブロムブチルクロリド(5当量)を加えた。室温にて1時間、反応混合物を撹拌した。ろ過により得られた固形物を単離し、水及び酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して化合物55a(1.625g、68%)を得た。¹H-NMR(DMSO-d₆): δ, 2.09-2.13(m, 2H), 2.47-2.52(m, 2H), 3.58(t, J=6.6Hz, 2H), 3.85(s, 2H), 7.40(t, J=6.3Hz, 1H), 7.50(d, J=8.4Hz, 1H), 7.66-7.71(m, 2H), 7.86(d, J=8.4Hz, 1H), 7.92(s, 1H), 8.20(d, J=8.1Hz, 1H), 10.10(s, 1H), 12.24(s, 1H)。

30

(cc) N-[5,6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1,2-c]イソキノリン-9-イル]-4-クロロ-ブチルアミド(55b)の調製


【0312】

40

(114)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 4 1】



10

【 0 3 1 3】


化合物 55a について上記で述べたように、 NaHCO_3 の水溶液及び酢酸エチルの存在下、クロロブチリルクロリドを用いてアミノ化合物 54a から化合物 55b (N-[5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1, 2-c]イソキノリン-9-イル]-4-クロロ-ブチルアミド) を調製した。 $^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$): δ , 1.99-2.08 (m, 2H), 2.47-2.52 (m, 2H), 3.70 (t, $J=6.6\text{ Hz}$, 2H), 3.86 (s, 2H), 7.38-7.44 (m, 1H), 7.50 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 7.66-7.71 (m, 2H), 7.86 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 7.95 (s, 1H), 8.21 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 10.09 (s, 1H), 12.24 (s, 1H)。(dd) N-[5, 6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1, 2-c]イソキノリン-9-イル]-2-クロロ-アセトアミド (55c) の調製

20

【 0 3 1 4】

【化 4 2】

30



40

【 0 3 1 5】

飽和 NaHCO_3 (250 mL) 中の化合物 54a (1.5 g、0.006 mol) 及び酢酸エチル (250 mL) の懸濁液にクロロアセチルクロリド (5 当量) を加えた。室温にて 1 時間、反応混合物を撹拌した。ろ過により得られた固形物を単離し、酢酸エチル、水及びメタノールで順次洗浄し、減圧下乾燥して化合物 55c (1.6 g、82%) を得た。 $^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$): δ , 3.89 (s, 2H), 4.2

50

(115)


JP 2007-527872 A 2007.10.4

7 (s, 2H), 7.40-7.45 (dd, J = 6.3 及び 8.1 Hz, 1H), 7.52 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.67-7.75 (m, 2H), 7.90 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.94 (s, 1H), 8.21 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 10.43 9s, 1H), 12.28 (s, 1H)。

(ee) N-[5,6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1,2-c]イソキノリン-9-イル]-4-モルフォリノ-ブチルアミド(73)の調製

【0316】

【化43】



73

【0317】

DMF(25mL)中の化合物55a(1.625g、0.004mol)の懸濁液に、トリエチルアミン(5mL)を加え、続いてモルフォリン(5mL)を加えた。反応混合物を140~155℃に1時間加熱し、室温に冷却して一晩攪拌した。得られた固形沈殿物をろ過し、DMF、水及びメタノールで順次洗浄し、減圧下乾燥して化合物73の遊離の塩(1.380g、85%)を得た。¹H-NMR(DMSO-d₆): δ, 1.72-1.76(dd, J = 6.9 及び 7.2 Hz, 2H), 2.26-2.37(m, 8H), 3.51-3.54(t, J = 4.2 Hz, 4H), 3.86(s, 2H), 7.39-7.43(dd, J = 6.3 及び 6.6 Hz, 1H), 7.51(d, J = 6.6 Hz, 1H), 7.66-7.74(m, 2H), 7.86(d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.96(s, 1H), 8.20(d, J = 8.1 Hz, 1H), 10.0(s, 1H), 12.25(s, 1H)。

(ff) 73のカンファースルホン酸塩の調製

MeOH(20mL)中の化合物73(遊離の塩基)(0.403g、0.001mol)の懸濁液にカンファースルホン酸(255mg、0.0011mol)を加えた。室温にて反応混合物を2時間攪拌した。次いで、反応混合物を減圧下濃縮し、得られた残留物を蒸留脱イオン水(40mL)に溶解し、脱色チャコール(0.5g)で処理し、90~100℃にて30分間攪拌した。セライトのパッドを介して得られた溶液をろ過し、セライトを水で洗浄した。ろ液を凍結乾燥して73のカンファースルホン酸塩(0.450g、71%)を得た。¹H-NMR(DMSO-d₆): δ, 0.72(s, 3H), 1.02(s, 3H), 1.20-1.30(m, 2H), 1.76(d, J = 18 Hz, 1H), 1.82-1.86(m, 1H), 1.89-1.97(m, 3H), 1.99-2.25(m, 1H), 2.35(d, J = 14.7 Hz, 1H), 2.43-2.48(m, 2H), 2.64-2.71(dd, J = 11.7 及び 14.7 Hz, 1H), 2.85(d, J = 14.7 Hz, 1H), 3.05-3.13(m, 4H), 3.46(d, J = 11.7 Hz, 2H), 3.64(t, J = 12 Hz, 2H), 3.86(s, 2H), 3.97(d, J = 12.3 Hz, 2H)

(116)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

, 7.39-7.44 (dd, $J = 7.8$ 及び 8.1 Hz, 1H), 7.52 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.67-7.75 (m, 2H), 7.87 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.96 (s, 1H), 8.21 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 9.57 (s, 1H), 10.15 (s, 1H), 12.25 (s, 1H)。

(gg) 2-ジメチルアミノ-N-(5,6-ジヒドロ-5-オキソ-インデノ[1,2-c]イソキノリン-9-イル)-アセトアミド(43)の調製

【0318】

【化44】



43

【0319】

エタノール(2N、200mL)中の化合物55c(1.6g、0.0049モル)及びジメチルアミンの懸濁液を24時間還流した。エタノール(2N、200mL)中のジメチルアミンの追加の溶液を加えた。反応混合物をさらに24時間還流し、室温に冷却した。得られた固形物をろ過し、エタノールで洗浄し、減圧下乾燥して化合物43(1.510g、92%)を得た。 $^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6): δ , 2.27 (s, 6H), 3.07 (s, 2H), 3.85 (s, 2H), 7.38-7.43 (m, 1H), 7.58 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.6-7.73 (m, 2H), 7.87 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 8.02 (s, 1H), 8.20 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 9.82 (s, 1H), 12.21 (s, 1H); MS (ES^+): m/z 334.01 ($\text{M}^+ + 1$)。

(hh) 43のカンファースルホン酸塩の調製

MeOH(200mL)中の化合物43(遊離の塩基)(0.1250g、0.0037モル)の懸濁液にカンファースルホン酸(0.915g、0.0039モル)を加えた。室温にて反応混合物を1時間攪拌し、減圧下濃縮した。得られた残留物を蒸留脱イオン水(300mL)に溶解し、ろ過し脱色チャコール(1g)で処理し、100~105℃にて30分間攪拌した。セライトのパッドを介して得られた溶液をろ過し、セライトを水で洗浄した。ろ液を凍結乾燥して化合物43のカンファースルホン酸塩(1.660g、75%)を得た。 $^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6): δ , 0.72 (s, 3H), 1.02-1.09 (s, 3H), 1.20-1.30 (m, 2H), 1.74-1.92 (m, 3H), 2.17-2.25 (m, 1H), 2.35 (d, $J = 14.7$ Hz, 1H), 2.64 (t, $J = 9.9$ Hz, 1H), 2.80 (d, $J = 14.7$ Hz, 1H), 3.90 (s, 2H), 4.16 (s, 2H), 7.41-7.46 (dd, $J = 6.3$ 及び 8.1 Hz, 1H), 7.53 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.68-7.73 (m, 2H), 7.92-7.94 (m, 2H), 8.22 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 9.77 (s, 1H), 10.68 (s, 1H),

(117)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

12.29 (s, 1H)。

(実施例2) 全細胞に基づいたアッセイ及び精製酵素アッセイを用いた、培養マクロファージにおけるPARS活性に対する例示となるイソキノリン誘導体の影響

PARSを阻害し、ペルオキシ亜硝酸が誘発する細胞傷害性を防ぐ例示となるイソキノリン誘導体の能力の実証は、ヴィラグ(Virag)等、Br. J. Pharmacol, 第126巻(3)、769~777ページ(1999年)及びヴィラグ(Virag)等、Immunology, 第94巻(3); 345~355ページ(1998年)に記載された方法を用いて示した。高グルコース入りで10%のウシ胎児血清を補完したDMEM培地を用いてマウスの未処理のマクロファージを培養した。12穴プレートにて80%の集密度で細胞を用いた。種々の濃度(100nM~1gM)のイソキノリン誘導体で細胞を10分間予備処理した。原型的な酸化剤である、DNAの一本鎖破壊を誘導するペルオキシ亜硝酸を用いてPARS活性を誘導した。リン酸緩衝化生理食塩水(PBS)(pH7.4)でペルオキシ亜硝酸を希釈し、50μLで一気に細胞に加えた。次いで細胞を20分間インキュベートした。pH7.4で30分間インキュベートすることによってペルオキシ亜硝酸を分解し、対照として用い、それは試験のパラメータに影響を与えることができなかった。20分間のインキュベートの後、細胞を遠心し、培地を吸引し、細胞を0.5mLのアッセイ緩衝液(56mMのHEPES、pH7.5、28mMのKCl、28mMのNaCl、2mMのMgCl₂、0.01%w/vのジギトニン及び0.125μMのNAD⁺及び0.5μCi/mLの³H-NAD⁺)に再浮遊した。アッセイ緩衝液中のインキュベート(37℃にて10分間)に続いて、PARS活性を以下のように測定した: 200μLの氷冷50%w/vのTCAを加え、4℃にて試料を4時間インキュベートした。次いで、試料を遠心(10,000gにて10分間)し、氷冷5%w/vのTCAでペレットを2回洗浄し、250μLの2%w/vSDS/0.1NのNaOH中で37℃にて一晚可溶化した。試験管の中身を6.5mLのシンチセーフプラス(ScintiSafe Plus)シンチレーション液(フィッシャーサイエンティフィック社(Fisher Scientific))に加え、液体シンチレーションカウンタ(ワラック社(Wallac)) [米国メリーランド州ゲーザーズバーグ(Gaithersburg)所在]を用いて放射活性を測定した。表9(「マウス培養マクロファージにおけるPARS活性に対する種々の新規の置換イソキノリンの阻害効果」)に示す結果は、マクロファージアッセイにおいて例示となるイソキノリン誘導体が、PARSの活性化を有意に且つ用量依存性に阻害することを明らかにしている。

【0320】

10

20

30

(118)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【表 9】

化合物No.	1 μ MでのPARS 阻害効果(%)	300nMでのPARS 阻害効果(%)	100nMでのPARS 阻害効果(%)
2	60	NT	16
3a	67	NT	8
3b	25	0	NT
3c	21	9	NT
4b	88	NT	51
5a	55	NT	10
5b	33	NT	0
5c	24	NT	0
5d	48	NT	0
5e	21	NT	0

10

20

(119)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

化合物No.	1 μ MでのPARS 阻害効果(%)	300nMでのPARS 阻害効果(%)	100nMでのPARS 阻害効果(%)
6	65	NT	30
7	50	NT	0
8a	NT	47	NT
8c	NT	27	NT
8d	NT	82	77
8e	NT	68	NT
8g	NT	55	34
8h	NT	76	56
8j	NT	76	34
8k	NT	38	24
8l	NT	84	34
8m	NT	50	NT
8n	NT	82	74
8o	NT	55	48
8p	NT	45	27
8q	NT	28	20
8r	NT	28	20
8s	54	NT	30
8t	29	NT	17
8u	NT	NT	59
8w	NT	NT	69
8x	NT	NT	54
8y	NT	NT	59
8z	NT	NT	67

10

20

30

40

(120)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

化合物No.	1 μ MでのPARS 阻害効果(%)	300nMでのPARS 阻害効果(%)	100nMでのPARS 阻害効果(%)
8aa	NT	NT	64
8ab	NT	NT	49
8ag	59	NT	35
8ah	63	NT	67
8ai	90	NT	69
8ak	NT	22*	8*
8al	84	NT	49
8am	NT	NT	65*
8an	40*	NT	40*
8ao	60	NT	40
10a	NT	59	55
10b	NT	17	17
22a	81	NT	51
22b	NT	20*	12*
22c	83	66	62
22d	13*	NT	NT
22e	53	56	38
22f	27	23	NT
22g	27	23	NT
23a	84	79	34
23b	58	57	53
23c	63	66	63
25a	51	57	53
25b	40	29	25

10

20

30

40

(121)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

化合物No.	1 μ MでのPARS 阻害効果(%)	300nMでのPARS 阻害効果(%)	100nMでのPARS 阻害効果(%)
25c	58	34	23
25d	67	66	53
25e	58	63	40
26a	90	74	51
26b	51*	29*	21*
31	67	57	18
34	NT	33*	14*
35a	75	55	14
35b	42	51	25

10

20

【 0 3 2 1 】

N T - 試験せず

* 精製酵素アッセイにおける試験

続いて、選択したイソキノリン誘導体について、精製したPARS酵素における阻害の潜在力を測定し、その潜在力を原型的基準のPARS阻害剤である3-アミノベンザミドと比較した。市販のPARS阻害アッセイキット（トレビゲン社（Trevigen）[米国メリーランド州ゲーサーズバーグ（Gaithersburg）所在]）に提供された指示書に従って、96穴ELISAプレートでアッセイを行った。手短に言えば、4℃にて1mg/mLのヒストン（50 μ L/ウエル）で一晩、ウエルを被覆した。次いでプレートをPBSで4回洗浄し、次いで、50 μ Lのストレプト希釈剤（キットと共に供給される）を加えることによってブロックした。インキュベート（室温、1時間）の後、プレートをPBSで4回洗浄した。適当に希釈したPARS阻害剤を、50 μ Lの容量で、2xのPARSカクテル（50mMのTRIS、pH8.0、25mMのMgCl₂中の1.95mMのNAD⁺、50 μ Lのピオチン化NAD⁺）及び比活性の高いPARS酵素（双方ともキットと共に供給される）と混ぜ合わせた。室温にて反応を30分間進行させた。PBSで4回洗浄した後、ペルオキシダーゼ結合のストレプトアビジン（1：500希釈）及びTACSサフィアー基質によって取り込まれたピオチンを検出した。アッセイによって、マクロファージに基くPARSアッセイの結果が裏づけられた。たとえば、PARS阻害剤81（メシル酸塩）は、このアッセイで3nMにて50%のPARS活性の阻害を発揮したので、参照化合物、3-アミノベンザミドよりもおよそ50,000倍強力だった。

30

40

（実施例3）細胞保護アッセイを用いた、例示となるイソキノリン誘導体のPARS活性に対する効果

ジャグタップ（Jagtap）等、Bioorg. & Med. Chem. Letters, 第14巻、81～85ページ、（2004年）に記載された方法を用いた細胞保護アッセイにおいて、PARSを阻害し、ペルオキシ亜硝酸が誘発する細胞傷害性を防ぐ例示となるイソキノリン誘導体の能力を測定した。手短に言えば、マウスの未処理のマクロファージを培養し、次いで10nM～10 μ Mの範囲にある種々の濃度の例示となるイソキノリン誘導体で約15分間処理した。次いで、処理したマクロファージにペルオキシ亜硝酸（750 μ M）を加え

50

(122)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

、15分間インキュベートして、PARSの活性化を誘導した。培地を除き、0.01%のジギトニン及び³H-NAD(0.5μCi/mL、緩衝液におけるNAD⁺の最終濃度は20nM/L)を含有する0.5mLのHEPES(pH7.5)と置き換え、得られた混合物を20分間静置した。次いで、細胞をウェルから剥ぎ取り、50%(w/v)の氷冷TCA(200μL)を含有するエッペンドルフチューブに入れた。チューブを4時間4℃で維持し、1800gにて10分間遠心分離し、上清を除いた。得られたペレットを5%(w/v)のTCA(200μLで2回)で洗浄し、次いで、2%w/vSDS/0.1NのNaOH(250μL)中で37℃にて一晩可溶化した。試験管の中身をシンチセーフプラスシンチレーション液(6.5mL、フィッシャーサイエンティフィック)に加え、液体シンチレーションカウンタ(ワラック社(Wallac)[米国メリーランド州ゲーサースバーグ(Gaithersburg)所在])を用いて放射活性を測定した。表10に示す結果は、例示となるイソキノリン誘導体が、PARSの活性化を用量依存性に阻害することを明らかにしている。

細胞保護に対する例示となるイソキノリン誘導体の阻害効果

【0322】

【表10】

化合物No.	EC ₅₀ (μM)
43	0.020
73	0.010
99	0.225
100	0.180
102	0.095
104	0.065
105	0.080
107	0.010
108	0.3
109	0.4
110	0.625

【0323】

(実施例4)種々の疾患モデルにおける例示となるイソキノリン誘導体の影響

(a)インビトロの細胞疾患モデルに対する例示となるイソキノリン誘導体の影響

単離された胸腺細胞における追加のインビトロ試験では、細胞をペルオキシ亜硝酸又は過酸化水素(毒性酸化剤の種)に暴露して細胞傷害を誘導した。この系では、少なくとも部分的には、毒性は核内酵素PARSの活性化に関係している。この酸化剤刺激の胸腺細胞アッセイ(ヴィラーグ(Virag)等、Immunology, 第94巻(3);345~355ページ(1998年)に記載される)では、調べた化合物は、酸化剤が誘導する細胞の生存率の抑制を防ぎ、低いナノモルの濃度範囲でそのようにした。この反応の例(化合物81、メシル酸塩)は表10に示す。このアッセイは、虚血臓器の再灌流の間に起きるような酸化促進性の種への暴露により、死にゆく細胞のインビトロモデルを表す。

【0324】

イソキノリン誘導体81(メシル酸塩)の30nM~3μMによるペルオキシ亜硝酸誘導の細胞傷害の軽減

(123)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【0325】

【表11】

	Control	+8l 30 nM	+8l 100 nM	+8l 300 nM	+8l 1 μ M	+8l 3 μ M
Cytotoxicity	98 %	74 %	39 %	2 %	0 %	0 %

【0326】

10

(b) 炎症性疾患のインビボモデルに対する例示となるイソキノリン誘導体の影響

炎症性疾患における化合物の薬効を立証するために、動物において再還流傷害及び敗血症性ショックのような炎症性疾患及び全身性の炎症反応症候群に關与することが報告されている(パリロ(Parrillo)、N. Engl. J. Med. 第328巻、1471-1478ページ(1993年)及びランピン(Lamping)、J. Clin. Invest. 第101巻、2065-2071ページ(1998年)を参照のこと)細菌のリポ多糖類(LPS)によって誘導される全身性の炎症モデルで、例示となるイソキノリン誘導体の効果を明らかにした。一連の実験において、0.1及び1 mg/kgの化合物8l(メシル酸塩)、8p及び8jの腹腔内注射によってマウスを事前処理し、10 mg/kgのLPSを腹腔内注射し、90分で血漿中においてTNF- α を測定した。表12に示すように、化合物がすべて実質的にTNFの産生を減らしたということは、化合物の抗炎症活性を示している。

20

【0327】

マウスにおけるPARS阻害剤化合物、8l(メシル酸塩)、8p及び8jの0.1~1 mg/kgの腹腔内注射によるインビボでのLPS誘導のTNF産生の低減

【0328】

【表12】

	8j (0.1 mg/kg)	8j (1.0 mg/kg)	8p (0.1 mg/kg)	8p (1.0 mg/kg)	8l (0.1 mg/kg)	8l (1.0 mg/kg)	Vehicle
TNF (ng/ml)	3831.6 $\pm$ 385.2	5038.8 $\pm$ 377.1	4470.0 $\pm$ 184.4	5090.8 $\pm$ 203.7	3714.6 $\pm$ 300.9	3509.8 $\pm$ 311.5	6994.0 $\pm$ 904.4

30

【0329】

対照と比較すると、化合物はすべて、LPS誘導のTNF産生を顕著に抑制した。

高い用量では、LPSは敗血症性ショックに似た多臓器不全を起こし、最終的には死に至る(部分的には、TNF- α の早期放出のため)。同様に、盲腸結紮穿刺(CLP)によって引き起こされるモデルでは、腸内細菌叢に由来する生きた細菌が全身性の炎症やショックを誘導する。このモデルで炎症性メディエータの産生、PARSの活性化及び細胞死を阻害する作用剤は、LPS又はCLPによって誘導される死亡を予防する。Ba1b/cマウスによる実験では、100 mg/kgのLPSの腹腔内注射は、24時間で動物の50%の死亡を誘導するが、3 mg/kg/日の化合物8l(メシル酸塩)による動物の処理は、同一実験条件下でエンドトキシン誘導の死亡率を10%に低減した。CLP誘導のショックに反応して、化合物8l(メシル酸塩)(3 mg/kg/日)は、死亡率において24時間で100%の死亡から60%の死亡に低減した。

40

【0330】

炎症性モデルに供された動物において例示となるイソキノリン誘導体によるTNF産生の低減を実証するデータは、TNF産生が種々の炎症性疾患(たとえば、大腸炎、関節炎

50

(124)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

、神経性炎症及びショック)における炎症の重要な引き金であるという事実と併せて、イソキノリン誘導体が、炎症性疾患の成分と再還流傷害の成分の双方を必然的に伴う臓器移植の拒絶を含む、種々の全身性及び局所の炎症性疾患に治療効果を有し、従って炎症性疾患又は再還流傷害を治療する又は予防するのに有用であるということを示している。

(c) 再還流傷害のインビボモデルに対する例示となるイソキノリン誘導体の効果

虚血-再還流の状態におけるイソキノリン誘導体の薬効を立証するために、虚血及び再還流の腸のマウスモデルにおける例示となるイソキノリン誘導体の効果を調べた。上腸間膜動脈を45分間閉塞させ、その後、1時間再還流させた。再還流の終了に続いて、平らにした腸管で、FD4法によって腸の透過性を測定した(リオードット(Liaudet)等、S h o c k 第14巻(2)、134~141ページ、(2000年))。虚血-再還流は、腸の透過性を 11 ± 4 から $21.6 \pm 2.7 \text{ mL / 分 / cm}^2$ に高め、再灌流した腸の重度の損傷を示した。化合物81(メシル酸塩)(3 mg / kg 、i.v.再灌流の開始10分前に注射)による処理は、腸の透過性の上昇をおよそ73%低減し、腸機能の顕著な維持を示した。腸における虚血-再灌流の試験は、12時間で80%の死亡率に関係していたが、81(メシル酸塩)で処理した動物では15%にすぎない死亡率が記録された。

【0331】

別の設定の実験では、アブデルカリム(Abdelkarim)等、Int. J. Mbl. Med. 第7巻(3)、255~260ページ(2001年)に記載されているように、中大脳動脈の閉塞/再灌流のラットモデルにおける化合物81(メシル酸塩)の効果をアッセイした。閉塞を2時間続け、続いて再灌流を24時間行った。テトラゾリウム染色によって梗塞サイズを定量した。化合物81(メシル酸塩)は、3つに分けた腹腔内注射用量で 3 mg / kg / 日で投与し、最初の用量は再灌流開始の10分前に投与した。ビヒクル処理の対照と比べると、81(メシル酸塩)を投与された動物では、皮質壊死及び神経死の程度でおよそ80%の低減があった。この保護はまた、PARS阻害剤処理群における神経的改善のような機能的利益に形を変えた。

【0332】

これらのデータは、イソキノリン誘導体が、炎症性疾患の成分と再還流傷害の成分の双方を必然的に伴う臓器移植の拒絶を含む、種々の全身性及び局所の再還流傷害の症状に治療効果を有し、従って臓器移植の結果生じる炎症性疾患又は再還流傷害又は再酸素化障害を治療する又は予防するのに有用であるということを示している。

(d) 糖尿病モデルにおける例示となるイソキノリン誘導体の効果

PARS阻害剤及びPARS欠損症は、糖尿病の進行及び糖尿病合併症の発生を減らすことが知られている(メイブリー(Mabley)等、Br. J. Pharmacol. 第133巻(6):909~9ページ(2001年);ソリアーノ(Soriano)等、Nat. Med. 第7巻(1)、108~113ページ(2001年))。糖尿病モデルにおけるイソキノリン誘導体の薬効を立証するために、以前記載されたように、糖尿病の単一高用量ストレプトゾトシンモデルを実施した。手短かに言えば、ビヒクル又は例示となるイソキノリン誘導体(3 mg / kg)を腹腔内注射したマウスに 160 mg / kg のストレプトゾトシンを注射し、3日後、血糖計を用いて、血糖レベルを測定した。表13に示すデータは、例示となるイソキノリン誘導体が高血糖症を軽減しているの

【0333】

マウスにおけるPARS阻害剤、化合物81(メシル酸塩)、8p及び8jの 3 mg / kg 腹腔内注射によるインビボでのストレプトゾトシン(STZ)誘導の高血糖症の軽減

【0334】

(125)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【表 1 3】

	Basal	STZ + Vehicle	STZ + 8j	STZ + 8p	8l
Glucose (mg/ml)	153 ± 21	320 ± 13	253 ± 24	264 ± 24	244 ± 21

【0335】

従って、イソキノリン誘導体は、糖尿病及び糖尿病合併症を治療する又は予防するのに有用である。 10

(e) ミスマッチ修復を欠損する悪性神経膠腫の異種移植でのテモゾロミド耐性の克服における例示となるイソキノリン誘導体の効果

テモゾロミド (TMZ) は、悪性神経膠腫の治療に使用されるメチル化剤である。DNA は、グアニンの O6 位及び N7 位並びにアデニンの N3 位で TMZ によって先ずメチル化される。TMZ の細胞傷害性は、O6-メチルグアニンをプロセッシングしようとするミスマッチ修復系 (MMR) による無駄な試みに起因する。MMR を欠損する腫瘍細胞は TMZ に耐性である。N-メチルプリン付加体は、塩基除去修復 (BER) によって効率的に除かれる。BER を欠損する細胞は、メチル化剤に対する感受性を高めている。BER の成分の 1 つは、酵素 PARP である。 20

【0336】

それが、特に MMR 欠損細胞において TMZ の細胞傷害性を高めるかどうかを割り出すために PARP の阻害を調べた。TMZ に交差耐性であるプロカルバジン耐性の異種移植腫瘍を持つ 10 匹のマウス群を無作為に 4 つの処理群の 1 つに割り振った。4 つの処理群は、(1) 対照群 (無菌の 5% デキストロス水溶液)、(2) 化合物 81 (メシル酸塩) のみ、(3) TMZ のみ、及び (4) 化合物 81 (メシル酸塩) と TMZ の併用であった。処理は、腫瘍容積が 100 ~ 500 mm³ に達した、1 日目のみ、以下に述べるように腹腔内注射によって行った。続いて、1 週間に 2 回、副尺付き手持ち式カリパスによって腫瘍を測定し、腫瘍容積を以下のように算出した: (幅² × 長さ) / 2。腫瘍容積が 1000 mm³ を超えた場合及び腫瘍容積が最初の処理時の腫瘍容積の 5 倍を超えて大きくなった場合、動物は試験外とした。 30

【0337】

MMR が十分である (D-245-MG) 又は欠損した (D-245-MG (PR)) 異種移植を持つ胸腺欠損マウスを TMZ と化合物 81 (メシル酸塩) の組み合わせで処理した。MMR を欠損する腫瘍については、最も有効な化合物 81 (メシル酸塩) の用量は、262.5 mg / kg の TMZ (0.75 LD₅₀) と組み合わせた最初の注射との 4 時間間隔で 3 回の腹腔内で投与された 150 mg / kg であることが分かった。TMZ のこの用量は、2 回の実験で部分的な退行を誘導せず、対照の腫瘍増殖のおよそ 4 日間の遅延を誘導した。併用療法は、21.6 日及び 9.7 日の増殖遅延を増やした (それぞれ、p = 0.001 及び p = 0.006)、部分退行は、8 匹のうち 4 匹及び 9 匹のうち 3 匹で認められた。化合物 81 (メシル酸塩) の添加はまた、MMR が十分な異種移植でも腫瘍増殖の遅延をもたらした。これらの実験では、88 mg / kg の TMZ と組み合わせた 200 mg / kg の化合物 81 (メシル酸塩) でマウスは処理された。これらのマウスにおける TMZ のみの腫瘍増殖遅延は、2 セットの実験で 43.1 日及び 39.2 日であった。併用療法は、48.9 日及び 45.7 日の増殖遅延の控えめな延びを生じた (それぞれ、p = 0.001 及び p = 0.003)。これらの結果は、化合物 81 (メシル酸塩)、例示となるイソキノリン誘導体による PARP の阻害が、悪性神経膠腫、特に MMR 欠損の腫瘍での TMZ の有効性を高めることを示している。 40

【0338】

図 1 に示すように、化合物 81 (メシル酸塩) は、インビボで TMZ の抗腫瘍効果を顕 50

(126)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

著に高める。

従って、化合物 8 1 (メシル酸塩)、例示となるイソキノリン誘導体は、神経膠腫を含む CNS 及び脳の腫瘍のような癌を治療する又は予防するのに有用である。

【 0 3 3 9 】

本発明は、本発明の 2 ~ 3 の側面の説明として意図される実施形態で開示された特定の実施態様によって範囲を限定されるものではなく、機能的に同等であるいかなる実施態様も本発明の範囲内である。実際、本明細書で示され、記載されたものに加えて本発明の種々の改変が当業者に明らかになるであろうし、それらは、添付の請求項の範囲内に入ることが意図される。

【 0 3 4 0 】

多数の参考文献を引用したが、その開示全体を全体として本明細書に組み入れた。


【図面の簡単な説明】

【 0 3 4 1 】

【図 1】腫瘍容積に対する化合物 8 1 (メシル酸塩) 及びテモゾロミドの効果を示すグラフ (図中、■ : 対照、▲ : 化合物 8 1 (メシル酸塩)、× : テモゾロミド及び* : 化合物 8 1 (メシル酸塩) とテモゾロミドである)。

10

【 図 1 】



(127)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【手続補正書】

【提出日】平成17年9月27日(2005.9.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

有効量の式(I)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化1】



(I)

式中、

R_5 は、O、NH又はSであり；

R_6 は、-H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(R₁₁R₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-($C_1 \sim C_5$ アルキル)-(-3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O($C_1 \sim C_5$ アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-($C_1 \sim C_5$ のアルキレン)-NZ₁, Z₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-(-3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ の

(128)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

アルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5$ のアルキル)又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5$ のアルキル)の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5$ アルキル)、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5$ アルキル)、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；


Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

n は0～5の整数である。

【請求項2】

有効量の式(II)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化2】



式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5$ アルキル)、 $-NO_2$ 又は $-A'-B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5$ のアルキル) $-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5$ のアルキル) $-(3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

(129)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- $O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - $A-B$ であり；

A は、- SO_2- 、- SO_2NH- 、- $NHCO-$ 、- $NHCONH-$ 、- $O-$ 、- $CO-$ 、- $OC(O)-$ 、- $C(O)O-$ 、- $CONH-$ 、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、- $NH-$ 、- CH_2- 、- $S-$ 又は - $C(S)-$ であり；


B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3～7員環の単環式複素環、- 7～10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)- (3～7員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)-$ 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O-$ フェニル、又は - NZ_1Z_2 であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項3】

有効量の式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化3】



(III)

式中、

X は、- CH_2- 又は - $O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- ヒドロキシ、- $O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NO_2 、- NH_2 、- $CONH_2$ 、- $C(O)OH$ 、- $OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキル又は - $C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、- 水素又は - $A-B$ であり、

A は、- SO_2- 、- SO_2NH- 、又は - $NHCO-$ であり；

B は、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NZ_1Z_2 、- 3～7員環の単環式複素環又は - 7～10員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- 3～7員環の単環式複素環又は - 7～10員環の二環式複素

(130)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


環の1以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- 水素又は $-C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項4】

有効量の式(IV)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化4】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は0～5の整数である。

【請求項5】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項1に記載の方法。

【請求項6】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項2に記載の方法。

【請求項7】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項3に記載の方法。

【請求項8】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍

(131)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項 4 に記載の方法。

【請求項 9】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 2 に記載の方法。

【請求項 11】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 12】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 4 に記載の方法。

【請求項 13】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 9 に記載の方法。

【請求項 14】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 10 に記載の方法。

【請求項 15】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 11 に記載の方法。

【請求項 16】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 12 に記載の方法。


【請求項 17】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 18】

化合物が、

【化 5】



又は薬学上許容可能なその塩である請求項 17 に記載の方法。

【請求項 19】

薬学上許容可能な塩がメシル酸塩である請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 2 に記載の方法。

【請求項 21】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 3 に記載の方法。

(132)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【請求項 2 2】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン- 2
又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 4 に記載の方法。

【請求項 2 3】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する
有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とからなる組成物、又はその薬学上許
容可能な塩。

【化 6】



(I)

式中、

R_5 は、O、NH又はSであり；

R_6 は、- H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、- $C(O)-$ 、- CH_2- 、- CH (ハロ)-、- $CH(OH)-$ (CH_2)_n、- $CH(OH)-$ 、- CH (アリアル)-、- O-、- NH-、- S-、- $CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は- $N(SO_2Y)-$ であり、その際、Yは、- OH、- NH_2 又は- ($C_1 \sim C_5$ アルキル)- (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環) であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、- 水素、- ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリアル、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O$ ($C_1 \sim C_5$ アルキル)、- NO_2 又は- A - Bであり；

Aは、- SO_2- 、- SO_2NH- 、- $NHCO-$ 、- $NHCONH-$ 、- $CO-$ 、- $C(O)O-$ 、- $CONH-$ 、- CON ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-、- $NH-$ 、- (CH_2)-、- S- 又は- C (S)- であり；

Bは、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリアル、- NZ_1Z_2 、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキレン)- NZ_1Z_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)- (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)-$ 置換のアリアル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C(O)O-$ フェニル、又は- $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は- $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は- O- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- ハロ、- ヒドロキシ、- NO_2 、- CN、- NZ_1Z_2 、- 窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、- アリアル、- ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $C(O)O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル) 又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $OC(O)-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル) の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、- 水素、- ハロ、- ヒド

(133)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

ロキシ、 $-O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；


Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

n は0～5の整数である。

【請求項24】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化7】



(II)

式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A'-B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の

(134)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

$C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；


B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 25】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 8】



(III)

式中、

X は、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NO_2$ 、 $-NH_2$ 、 $-CONH_2$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキル又は $-C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-$ 水素又は $-A-B$ であり、

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、又は $-NHCO-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-$ ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-$ アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

(135)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- 水素又は - $C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 26】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 9】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、- $NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。


【請求項 27】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(136)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 0】



(I)

式中、

 R_5 は、O、NH又はSであり； R_6 は、-H又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH$ (ハロ) $-$ 、 $-CH(OH)-$ (CH_2) $_n$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH$ (アリール) $-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、Yは、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ (3～7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又はA-Bであり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

Bは、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、3～7員環の単環式複素環、7～10員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1$ 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ (3～7員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又はA-Bであり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、-H又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、Z

(137)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


z_3 及び z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 z_3 及び z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 z_1 及び z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 28】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 11】



(II)

式中、

R_6 は、- H 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、- 水素、- ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - $A' - B'$ であり；

A' は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S - 又は - $C(S)$ - であり；

B' は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ - (3 ~ 7 員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O$ - フェニル、又は - NZ_1Z_2 であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - $A - B$ であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- O -、- CO -、- $OC(O)$ -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- CH_2 -、- S - 又は - $C(S)$ - であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3 ~ 7 員環の単環

(138)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル) - (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O$ - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C(O)O$ - フェニル、又は - NZ_1Z_2 であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 29】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 12】



(III)

式中、

X は、- CH_2 - 又は - O - であり；

R_2 及び R_3 は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- ヒドロキシ、- O - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NO_2 、- NH_2 、- $CONH_2$ 、- $C(O)OH$ 、- $OC(O)$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキル又は - $C(O)O$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、- 水素又は - A - B であり、

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、又は - $NHCO$ - であり；

B は、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NZ_1Z_2 、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- 水素又は - $C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 30】


有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を

(139)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化13】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は0～5の整数である。

【請求項31】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、及び式(I)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化14】



式中、

R_5 は、 O 、 NH 又は S であり；

R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(ハロ)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(N$

(140)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 、 R_{12})-、又は- $N(SO_2Y)$ -であり、その際、 Y は、-OH、- NH_2 又は- $(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ -(-3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NH_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は- $A-B$ であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S -又は- $C(S)$ -であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NZ_1Z_2 、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})$ - NZ_1 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -(-3~7員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ -置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O$ -フェニル、又は- $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は- $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は- $O(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、-ハロ、-ヒドロキシ、- NO_2 、- CN 、- NZ_1Z_2 、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、- $O(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NH_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は- $A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、- H 又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は- $N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して- H 又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は- NH_2 の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

n は0~5の整数である。

【請求項32】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

(II)

R₆ は、-H 又は C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- OC(O)(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A - B であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、- H 又は - C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - N (Z₃) (Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して - H 又は - C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は

(142)


JP 2007-527872 A 2007.10.4

一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 33】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 16】



(III)

式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ～ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ～ C₅ のアルキル)、-C₁ ～ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ～ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ～ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ～ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ～ 7 員環の単環式複素環又は -7 ～ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ～ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ～ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ～ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ～ C₅ のアルキル、-3 ～ 7 員環の単環式複素環又は -7 ～ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ～ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ～ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 34】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(143)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 7】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は0～5の整数である。

【請求項 35】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(I)を有する有効量の化合物又は薬学上許容可能な化合物の塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 1 8】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(N$

(144)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 、 R_{12})-、又は- $N(SO_2Y)$ -であり、その際、 Y は、- OH 、- NH_2 又は- $(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ -(-3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NH_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は- $A-B$ であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S -又は- $C(S)$ -であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NZ_1Z_2 、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})$ - NZ_1 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -(-3~7員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ -置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O$ -($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C(O)O$ -フェニル、又は- $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は- $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は- O -($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、- NO_2 、- CN 、- NZ_1Z_2 、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $C(O)O$ -($C_1 \sim C_5$ のアルキル)又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $OC(O)$ -($C_1 \sim C_5$ のアルキル)の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、- O -($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、- NH_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は- $A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、- H 又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、- OH 又は- $N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して- H 又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は- NH_2 の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

n は0~5の整数である。


【請求項36】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(145)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 9】



(II)

式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(146)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 37】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 20】



(III)

式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ~ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 38】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(147)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 1】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は 0～5 の整数である。

【請求項 39】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 2】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H口)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又

(148)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

n は $0 \sim 5$ の整数である。

【請求項 40】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(II)

R₆ は、-H 又は C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- OC(O)(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A - B であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-H$ ドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(150)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 4 1】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I I I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 4】



(III)

式中、

X は、- CH₂ - 又は - O - であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- ヒドロキシ、- O - (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₅ のアルキル、- NO₂、- NH₂、- CONH₂、- C (O) OH、- OC (O) - C₁ ~ C₅ のアルキル又は - C (O) O - C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、- 水素又は - A - B であり、

A は、- SO₂ -、- SO₂ NH -、又は - NHCO - であり；

B は、- C₁ ~ C₅ のアルキル、- NZ₁Z₂、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、- 水素又は - C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - N (Z₃) (Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して - H 又は - C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 4 2】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I V) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(151)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 5】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 4 3】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化 2 6】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H口)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又

(152)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。


【請求項 44】

有効量の、式 (II) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(153)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 7】



式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 口、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 口置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 口置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は

(154)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項45】

有効量の、式(III)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化28】



(III)

式中、

Xは、-CH₂-又は-O-であり；

R₂及びR₃は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換されたC₁～C₅のアルキル、-ヒドロキシ、-O-(C₁～C₅のアルキル)、-C₁～C₅のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁～C₅のアルキル又は-C(O)O-C₁～C₅のアルキルであり；

R₈及びR₉は独立して、-水素又は-A-Bであり、

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、又は-NHCO-であり；

Bは、-C₁～C₅のアルキル、-NZ₁Z₂、-3～7員環の単環式複素環又は-7～10員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁～C₁₀のアルキル又はヒドロキシ置換されたC₁～C₅のアルキルで置換されないか、又は置換された-ヒドロキシ置換されたC₁～C₅のアルキル、-アミノ置換されたC₁～C₅のアルキル、-3～7員環の単環式複素環又は-7～10員環の二環式複素環の1以上で置換され；且つ

Z₁及びZ₂は、独立して、-水素又は-C₁～C₈のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁～C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。


【請求項46】

有効量の、式(IV)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(155)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 9】



式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCH(O)-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、他の基が水素であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-H 又は -C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -OH 又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 47】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 43 に記載の方法。

【請求項 48】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 44 に記載の方法。

【請求項 49】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 45 に記載の方法。

【請求項 50】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 46 に記載の方法。


【請求項 51】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

(156)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 0】



(I)

式中、

R_5 は、O、NH又はSであり；

R_6 は、-H又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH$ (ハロ)-、 $-CH(OH)-$ 、 $-(CH_2)_n$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH$ (-アリール)-、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、Yは、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ (-3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

Bは、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1$ 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ (-3~7員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン- $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、-H又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換され

(157)

JP 2007-527872 A 2007.10.4


ないか、又は-ハロ、-OH又は-N(Z_3)(Z_4)の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

nは0~5の整数である。

【請求項52】

有効量の、式(II)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化31】



(II)

式中、

R_6 は、-H又はC₁~C₅のアルキルであり；

R_1 は、-水素、-ハロ、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A'-B'であり；

A'は、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

B'は、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-(C₁~C₅のアルキル)-(3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-NZ₁Z₂であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-OC(O)(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-O-、-CO-、-OC(O)-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-CH₂-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環

(158)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル) - (- 3 ~ 7 員環の単環式複素環)、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O$ - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C(O)O$ - フェニル、又は - NZ_1Z_2 であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 53】

有効量の、式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化 32】



(III)

式中、

X は、- CH_2 - 又は - O - であり；

R_2 及び R_3 は独立して、- 水素、- ハロ、- ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- ヒドロキシ、- O - ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NO_2 、- NH_2 、- $CONH_2$ 、- $C(O)OH$ 、- $OC(O)$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキル又は - $C(O)O$ - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、- 水素又は - $A-B$ であり、

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、又は - $NHCO$ - であり；

B は、- $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- NZ_1Z_2 、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された - ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環又は - 7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、- 水素又は - $C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 54】

有効量の、式 (IV) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

(159)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 3】



式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCH(O)-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、他の基が水素であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-H 又は -C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -OH 又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 55】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 51 に記載の方法。

【請求項 56】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 52 に記載の方法。

【請求項 57】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 53 に記載の方法。


【請求項 58】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 54 に記載の方法。

【請求項 59】

式 (IV) の化合物又は薬学上許容可能なその塩。

【化 3 4】



式中、

(160)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0～5 の整数である。

【請求項 60】

R_{14} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{15} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 61】

R_{15} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{14} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 62】

n が 1 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 63】

n が 2 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 64】

n が 3 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 65】

n が 4 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 66】

n が 5 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 67】

生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクル及び有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を含む組成物。

【請求項 68】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、再灌流傷害を治療する方法。

【請求項 69】

再灌流傷害が、脳卒中又は心筋梗塞である請求項 68 に記載の方法。

【請求項 70】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、炎症性疾患を治療する方法。

【請求項 71】

炎症性疾患が、関節の炎症性疾患、歯肉の慢性炎症性疾患、炎症性腸疾患、炎症性肺疾患、中枢神経系の炎症性疾患、目の炎症性疾患、グラム陽性のショック、グラム陰性のショック、出血性ショック、アナフィラキシー性ショック、外傷性ショック又は化学療法のショックである請求項 70 に記載の方法。

【請求項 72】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、糖尿病及び糖尿病合併症を治療する方法。

【請求項 73】

糖尿病が、I 型糖尿病又は II 型糖尿病である請求項 72 に記載の方法。

【請求項 74】

(161)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、虚血性の症状を治療する方法。

【請求項 7 5】

虚血性の症状が、心筋虚血、安定狭心症、不安定狭心症、脳卒中、虚血性心疾患又は脳虚血である請求項 7 4 に記載の方法。

【請求項 7 6】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害を治療する方法。


【請求項 7 7】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、パーキンソン病を治療する方法。

【請求項 7 8】


化学式 5 3 a

【化 3 5】




を有する化合物の製造方法において、化学式

【化 3 6】



を有する化合物を、化学式 5 3 a の化合物の製造に十分な条件でトリエチルアミンを存在させる下で、化学式

【化 3 7】



を有する化合物と反応させる工程を備える、製造方法。


【請求項 7 9】

化学式

(162)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 3 8】



を有する化合物の製造方法において、


(i) 化学式

【化 3 9】




の化合物を、化学式

【化 4 0】



の化合物と反応させる工程であって、 R_b は、 $-Cl$ 、であり、化学式

【化 4 1】




の化合物を生成するために十分な条件下で塩基を存在させる反応工程と、

(ii) 化学式

(163)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 4 2】



の化合物を、


【化 4 3】



の化合物を生成するために十分な条件下で還元剤と反応させる工程と、

(i i i) 化学式

【化 4 4】




の化合物を、 $X-(CH_2)_n-COCl$ (X は Br または Cl であり、 n は $0 \sim 5$ の範囲の整数) の化学式を有する化合物と、化学式

(164)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 4 5】



の化合物を生成するために十分な条件下で反応させる工程と、


(i v) 化学式

【化 4 6】



の化合物を化学式 HNZ_1Z_2 の化合物と、化学式

【化 4 7】



の化合物を生成するために十分な条件下で反応させる工程であって、工程 (i i i) , (i v) の X , n は同一であり、

Z_1 , Z_2 は独立して、置換されていないか、 $-\text{H}$ 、 $-\text{OH}$, $-\text{NZ}_3\text{Z}_4$ のうちの1つ以上で置換された $-\text{H}$ または $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ アルキルであり、ここで、 Z_3 , Z_4 は独立して、置換されていないか、 $-\text{H}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$, $-\text{NH}_2$ のうちの1つ以上で置換された $-\text{H}$ または $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ アルキルであり、または、 N , Z_3 , Z_4 は N を含む3～7員環の単環複素環を形成し、または N , Z_1 , Z_2 は N を含む3～7員環の単環複素環を形成する工程とを備える、製造方法。


【請求項 80】

化学式 43


(165)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 4 8】

の化合物の製造方法であって、(i) 化学式


【化 4 9】

の化合物を、化学式

【化 5 0】

の化合物と反応させる工程であって、化学式 5 3 a


【化 5 1】

の化合物を生成するために十分な条件下でトリエチルアミンを存在させる反応工程と、(i i) 化学式 5 3 a の化合物を 5 % P d / C と、化学式 5 4

(166)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 5 2】



の化合物を生成するために十分な条件下でギ酸アンモニウムを存在させて反応させる工程と、

(i i i) 化学式 5 4 の化合物を、化学式 5 5 c

【化 5 3】



の化合物を生成するために十分な条件下で重炭酸ナトリウムを存在させて、クロロアセチルクロライドと反応させる工程と、

(i v) 化学式 5 5 c の化合物を、化合物 4 3 の化合物を生成するために十分な条件下でジメチルアミンと反応させる工程とを備える、製造方法。


【請求項 8 1】

化学式


(167)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 5 4】

(カンファースルホン酸塩)の化合物の製造方法であって、化合物 4 3


【化 5 5】



43

を、化学式

【化 5 6】

(カンファースルホン酸塩)の化合物を生成するために十分な条件下でカンファースルホン酸と反応させる工程を備える、製造方法。

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月8日(2006.11.8)

(168)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

有効量の式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化 1】



(I)

式中、

R_5 は、O、NH又はSであり；

R_6 は、-H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁R₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-($C_1 \sim C_5$ アルキル)-(3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O($C_1 \sim C_5$ アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

Bは、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-($C_1 \sim C_5$ のアルキレン)-NZ₁, Z₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-(3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、-C(O)OH、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン-C(O)O- ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)又は- $C_1 \sim C_5$ の

(169)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

アルキレン-OC(O)-(C₁~C₅のアルキル)の1以上で置換され；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-OC(O)(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A-Bであり；


Z₁及びZ₂は独立して、-H又は-C₁~C₁₀のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は-N(Z₃)(Z₄)の1以上で置換され、その際、Z₃及びZ₄は独立して-H又は-C₁~C₅のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は-NH₂の1以上で置換され、或いは、Z₃及びZ₄は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁及びZ₂は一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

nは0~5の整数である。

【請求項2】

有効量の式(II)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化2】



式中、

R₆は、-H又はC₁~C₅のアルキルであり；

R₁は、-水素、-ハロ、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換のC₁~C₅のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O(C₁~C₅アルキル)、-NO₂又は-A'-B'であり；

A'は、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON(C₁~C₅のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)-、-S-又は-C(S)-であり；

B'は、-C₁~C₁₀のアルキル、-C₂~C₁₀のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、-C₃~C₈の単環式シクロアルキル、-アリール、-アミノ置換のC₁~C₅のアルキル、-(C₁~C₅のアルキル)-(-3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-(C₁~C₅のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-NZ₁Z₂であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉及びR₁₀は、独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-(C₁~C₅のアルキル)、-C₁~C₁₀のアルキル、-ハロ置換の

(170)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

$C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；


B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 3】

有効量の式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化 3】



(III)

式中、

X は、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ハロ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NO_2$ 、 $-NH_2$ 、 $-CONH_2$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキル又は $-C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-$ 水素又は $-A-B$ であり、

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、又は $-NHCO-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-$ ヒドロキシ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-$ アミノ置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-$ 水素又は $-C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換さ

(171)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

れないか、又は-ヒドロキシ又は- $N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して-H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ヒドロキシ又は- NH_2 の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項4】

有効量の式(IV)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩をその必要に応じて動物に投与することを含む、癌を治療する方法。

【化4】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NH C(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、-H又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-OH又は- $N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して-H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、-ヒドロキシ又は- NH_2 の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は0～5の整数である。

【請求項5】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項1に記載の方法。

【請求項6】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項2に記載の方法。

【請求項7】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項3に記載の方法。

【請求項8】

癌が、結腸直腸癌、肺癌、膵臓癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、精巣癌、膀胱癌、腎臓癌、肝臓癌、乳癌、前立腺癌、頭頸部の癌、脳腫瘍、中枢神経系の癌、子宮癌、子宮頸癌、又は卵巣癌である請求項4に記載の方法。

【請求項9】

(172)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 2 に記載の方法。

【請求項 11】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 12】

癌が、黒色腫、転移性脳腫瘍又は神経膠腫である請求項 4 に記載の方法。

【請求項 13】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 9 に記載の方法。

【請求項 14】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 10 に記載の方法。

【請求項 15】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 11 に記載の方法。

【請求項 16】

神経膠腫が、毛様細胞性星状細胞腫、星状細胞腫、未分化の星状細胞腫又は多形性膠芽腫である請求項 12 に記載の方法。


【請求項 17】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 18】

化合物が、

【化 5】



又は薬学上許容可能なその塩である請求項 17 に記載の方法。

【請求項 19】

薬学上許容可能な塩がメシル酸塩である請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 2 に記載の方法。

【請求項 21】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 3 に記載の方法。

【請求項 22】

テモゾロミド、プロカルバジン、デカルバジン、イリノテカン、インターロイキン-2 又はこれらの組み合わせの有効量を投与することをさらに含む請求項 4 に記載の方法。


(173)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【請求項 23】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(I)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とからなる組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 6】



(I)

式中、

R_5 は、O、NH又はSであり；

R_6 は、-H又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、-C(O)-、-CH₂-、-CH(ハロ)-、-CH(OH)-(CH₂)_n-、-CH(OH)-、-CH(-アリール)-、-O-、-NH-、-S-、-CH(NR₁₁R₁₂)-、又は-N(SO₂Y)-であり、その際、Yは、-OH、-NH₂又は-($C_1 \sim C_5$ アルキル)-(3~7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3~7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-C(O)OH、-C(O)O($C_1 \sim C_5$ アルキル)、-NO₂ 又は-A-Bであり；

Aは、-SO₂-、-SO₂NH-、-NHCO-、-NHCONH-、-CO-、-C(O)O-、-CONH-、-CON($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-、-NH-、-(CH₂)_n-、-S- 又は-C(S)-であり；

Bは、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、-3~7員環の単環式複素環、-7~10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NZ₁Z₂、-($C_1 \sim C_5$ のアルキレン)-NZ₁, Z₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)-(3~7員環の単環式複素環)、-H₂NC(O)-置換のアリール、-C(O)OH、-C(O)O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-C(O)O-フェニル、又は-C(NH)NH₂であり、-NZ₁Z₂、-C(O)OH又は-C(NH)NH₂以外のそれぞれは、置換されないか、又は-O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、-ハロ、-ヒドロキシ、-NO₂、-CN、-NZ₁Z₂、-窒素含有の3~7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、-C(O)OH、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン-C(O)O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)又は- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン-OC(O)-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、-O-($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、-NH₂、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、-C(O)OH、-

(174)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

$C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；


Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

n は0～5の整数である。

【請求項24】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(II)を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化7】



式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 口、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 口置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A'-B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 口置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

(175)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OC(O)}-$ 、 $-\text{C(O)}\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C(S)}-$ であり；


B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環、 $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリール}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-(\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環)、 $-\text{H}_2\text{NC(O)}-$ 置換のアリール、 $-\text{C(O)}\text{OH}$ 、 $-\text{C(O)}\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C(O)}\text{O}-$ フェニル、又は $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 、 $-\text{OH}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 25】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 8】



(III)

式中、

X は、 $-\text{CH}_2-$ 又は $-\text{O}-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{CONH}_2$ 、 $-\text{C(O)}\text{OH}$ 、 $-\text{OC(O)}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-\text{C(O)}\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ であり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-\text{水素}$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり、

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、又は $-\text{NHCO}-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-\text{ヒドロキシ}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{アミノ}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{水素}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒にな

(176)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

って窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 26】

有効量のテモゾロミドと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 9】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 27】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 10】



式中、

R_5 は、 O 、 NH 又は S であり；

R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n$

(177)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

、 $-\text{CH}(\text{OH})$ 、 $-\text{CH}(-\text{アリーール})-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{CH}(\text{NR}_{11}\text{R}_{12})-$ 、又は $-\text{N}(\text{SO}_2\text{Y})-$ であり、その際、Yは、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{NH}_2$ 又は $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})-$ ($3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{ハロ置換の } \text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の } \text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

Aは、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-(\text{CH}_2)-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

Bは、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキレン})-\text{NZ}_1$ 、 Z_2 、 $-\text{アミノ置換の } \text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ ($3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-\text{H}_2\text{NC}(\text{O})-$ 置換のアリーール、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{フェニル}$ 、又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ であり、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 又は $-\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{窒素含有の } 3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルキニル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{ベンジル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキレン $-\text{C}(\text{O})\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキレン $-\text{OC}(\text{O})-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-\text{水素}$ 、 $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 、 $-\text{O}-(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル、 $-\text{ハロ置換の } \text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-\text{C}_2 \sim \text{C}_{10}$ のアルケニル、 $-\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ の単環式シクロアルキル、 $-\text{アリーール}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{アミノ置換の } \text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{OC}(\text{O})(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ アルキル})$ 、 $-\text{NO}_2$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{OH}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{ハロ}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$ 又は $-\text{NH}_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；

n は $0 \sim 5$ の整数である。

【請求項 28】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

式中、

R₁ は、- 水素、- ハロ、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A' - B' であり；

A' は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-(\text{CH}_2)-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C}(\text{S})-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- OC(O)(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A - B であり；

Aは、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{NHCO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OC(O)}-$ 、 $-\text{C(O)O}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CON}(\text{C}_1 \sim \text{C}_5 \text{のアルキル})-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{C(S)}-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-H$ ドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(179)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 29】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 12】



式中、

X は、-CH₂- 又は -O- であり；

R₂ 及び R₃ は独立して、-水素、-ハロ、-ハロ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-ヒドロキシ、-O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NO₂、-NH₂、-CONH₂、-C(O)OH、-OC(O)-C₁ ~ C₅ のアルキル又は -C(O)O-C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

R₈ 及び R₉ は独立して、-水素又は -A-B であり、

A は、-SO₂-、-SO₂NH-、又は -NHCO- であり；

B は、-C₁ ~ C₅ のアルキル、-NZ₁Z₂、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、C₁ ~ C₁₀ のアルキル又はヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキルで置換されないか、又は置換された -ヒドロキシ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-アミノ置換された C₁ ~ C₅ のアルキル、-3 ~ 7 員環の単環式複素環又は -7 ~ 10 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-水素又は -C₁ ~ C₈ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 30】

有効量のプロカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(180)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 3】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は 0～5 の整数である。

【請求項 3 1】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、及び式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 1 4】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H口)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環) であり；

(181)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 32】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(183)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 33】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 16】



(III)

式中、

X は、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-H$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-H$ 、 $-O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NO_2$ 、 $-NH_2$ 、 $-CONH_2$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキル又は $-C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-H$ 又は $-A-B$ であり、

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、又は $-NHCO-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 NZ_1Z_2 、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は H 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-H$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NH_2$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 34】

有効量のダカルバジンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(184)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【化 1 7】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は0～5の整数である。

【請求項 35】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式(I)を有する有効量の化合物又は薬学上許容可能な化合物の塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 1 8】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ (3～7員環の単環式複素環) であり；

 R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

(185)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_1 は、- 水素、- ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S - 又は - $C(S)$ - であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3～7員環の単環式複素環、- 7～10員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NZ_1Z_2 、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン}) - NZ_1, Z_2$ 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル}) - (-3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O$ - フェニル、又は - $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は - $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は - $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- ハロ、- ヒドロキシ、- NO_2 、- CN 、- NZ_1Z_2 、- 窒素含有の 3～7員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、- アリール、- ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $OC(O) - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7員環の単環式複素環を形成し；

n は 0～5 の整数である。

【請求項 36】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (II) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(II)

R₆ は、-H 又は C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(-3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- OC(O)(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A - B であり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(187)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 37】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (III) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 20】



式中、

X は、 $-\text{CH}_2-$ 又は $-\text{O}-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{H}$ 、 $-\text{O}-$ ($\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル)、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{CONH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル又は $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり、

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、又は $-\text{NHCO}-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又は $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NH}_2$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 38】

有効量のイリノテカンと、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (IV) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(188)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 1】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3～7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は 0～5 の整数である。

【請求項 39】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 2】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ であり；

(189)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1, Z_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-$ 窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-$ アリール、 $-$ ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-$ 水素、 $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-$ ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-NH_2$ 、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-$ ハロ、 $-$ ヒドロキシ又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ～ 5 の整数である。


【請求項 40】

有効量のインターロイキン-2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(190)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 3】



(II)

式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(191)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 4 1】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I I I) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

【化 2 4】



(III)

式中、

X は、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-H$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-OH$ 、 $-O-$ ($C_1 \sim C_5$ のアルキル)、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NO_2$ 、 $-NH_2$ 、 $-CONH_2$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OC(O)-C_1 \sim C_5$ のアルキル又は $-C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-H$ 又は $-A-B$ であり、

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、又は $-NHCO-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は H 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-OH$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NH_2$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-OH$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 4 2】

有効量のインターロイキン- 2 と、薬学上許容可能なビヒクル又はキャリアと、式 (I V) を有する有効量の化合物又は化合物の薬学上許容可能な塩とを含む組成物、又はその薬学上許容可能な塩。

(192)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 5】



式中、

 R_{13} 及び R_{16} は水素であり； R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；


Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

 n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 4 3】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化 2 6】



式中、

 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり； R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH(H口)-$ 、 $-CH(OH)-(CH_2)_n-$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH(-アリール)-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環) であり；

 R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R

(193)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、- 水素、- ハロ、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

A は、- SO_2 -、- SO_2NH -、- $NHCO$ -、- $NHCONH$ -、- CO -、- $C(O)O$ -、- $CONH$ -、- $CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ -、- NH -、- (CH_2) -、- S - 又は - C(S) - であり；

B は、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- 7 ~ 10 員環の二環式複素環、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NZ_1Z_2 、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン}) - NZ_1, Z_2$ 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル}) - (- 3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、- $H_2NC(O)$ - 置換のアリール、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C(O)O$ - フェニル、又は - $C(NH)NH_2$ であり、- NZ_1Z_2 、- $C(O)OH$ 又は - $C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は - $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- ハロ、- ヒドロキシ、- NO_2 、- CN 、- NZ_1Z_2 、- 窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、- アリール、- ベンジル、- $C(O)OH$ 、- $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $C(O)O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキレン - $OC(O) - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の 1 以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- $O - (C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、- $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、- ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、- $C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH_2 、- アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、- $C(O)OH$ 、- $C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- $OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、- NO_2 又は - A - B であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、- H 又は - $C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- OH 又は - $N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して - H 又は - $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は - ハロ、- ヒドロキシ又は - NH_2 の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 44】

有効量の、式 (II) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じ動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(II)

R₆ は、-H 又は C₁ ~ C₅ のアルキルであり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-$ アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(-3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ は、独立して、- 水素、- ハロ、- ヒドロキシ、- O- (C₁ ~ C₅ のアルキル)、- C₁ ~ C₁₀ のアルキル、- ハロ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C₂ ~ C₁₀ のアルケニル、- C₃ ~ C₈ の単環式シクロアルキル、- アリール、- NH₂、- アミノ置換の C₁ ~ C₅ のアルキル、- C(O)OH、- C(O)O(C₁ ~ C₅ アルキル)、- OC(O)(C₁ ~ C₅ アルキル)、- NO₂ 又は - A - B であり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-$ アリール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル })$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2

(195)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。

【請求項 4 5】

有効量の、式 (III) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

【化 2 8】



(III)

式中、

X は、 $-\text{CH}_2-$ 又は $-\text{O}-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 、 $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{H}$ 、 $-\text{O}-$ ($\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル)、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{CONH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{OC}(\text{O})-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル又は $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{A}-\text{B}$ であり、

A は、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}-$ 、又は $-\text{NHCO}-$ であり；

B は、 $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{NZ}_1\text{Z}_2$ 、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ のアルキル又はヒドロキシ置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-\text{H}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{アミノ}$ 置換された $\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキル、 $-\text{3} \sim \text{7}$ 員環の単環式複素環又は $-\text{7} \sim \text{10}$ 員環の二環式複素環の 1 以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 又は $-\text{N}(\text{Z}_3)(\text{Z}_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-\text{H}$ 又は $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-\text{H}$ 又は $-\text{NH}_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成する。


【請求項 4 6】

有効量の、式 (IV) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、循環器疾患以外の血管系疾患を治療する方法。

(196)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 2 9】



式中、

R_{13} 及び R_{16} は水素であり；

R_{14} 基及び R_{15} 基の一方が、 $-NHC(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ～ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ n は 0 ～ 5 の整数である。

【請求項 4 7】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 3 に記載の方法。

【請求項 4 8】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 4 に記載の方法。

【請求項 4 9】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 5 に記載の方法。

【請求項 5 0】

血管系疾患が、末梢動脈閉塞症、閉塞性血栓性血管炎、レイノー病及びレイノー現象、肢端チアノーゼ、肢端紅痛症、静脈血栓症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ水腫又は脂肪性浮腫である請求項 4 6 に記載の方法。


【請求項 5 1】

有効量の、式 (I) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

(197)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 0】



(I)

式中、

 R_5 は、O、NH又はSであり； R_6 は、-H又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

Xは、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH$ (ハロ) $-$ 、 $-CH(OH)-$ (CH_2) $_n$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH$ (アリール) $-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、Yは、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-$ (3～7員環の単環式複素環)であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又はNであり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、-水素、-ハロ、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は-A-Bであり；

Aは、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

Bは、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、3～7員環の単環式複素環、7～10員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1$ 、 Z_2 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ (3～7員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、-窒素含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルキニル、-アリール、-ベンジル、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、-水素、-ハロ、-ヒドロキシ、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、-ハロ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、-アリール、 $-NH_2$ 、-アミノ置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は-A-Bであり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、-H又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は-ハロ、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、Z

(198)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-H_2O$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 52】

有効量の、式 (II) を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化 31】



(II)

式中、

R_6 は、 $-H$ 又は $C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H_2O$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A' - B'$ であり；

A' は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B' は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は、独立して、 $-H$ 、 $-H_2O$ 、 $-H_2O$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H_2O$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A - B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-OC(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-ア$

(199)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


リール、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ ($-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環)、 $-H_2NC(O)-$ 置換のアリール、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-NZ_1Z_2$ であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 口、 $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。

【請求項53】

有効量の、式(III)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

【化32】



(III)

式中、

X は、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ であり；

R_2 及び R_3 は独立して、 $-H$ 、 $-H$ 口、 $-H$ 口置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NO_2$ 、 $-NH_2$ 、 $-CONH_2$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C(O)O-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

R_8 及び R_9 は独立して、 $-H$ 又は $-A-B$ であり、

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、又は $-NHCO-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環であり、これらのそれぞれが、置換されないか、又はそれぞれ、 $C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は $-ヒドロキシ$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキルで置換されないか、又は置換された $-ヒドロキシ$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-アミノ$ 置換された $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-3 \sim 7$ 員環の単環式複素環又は $-7 \sim 10$ 員環の二環式複素環の1以上で置換され；且つ

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_8$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-ヒドロキシ$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-ヒドロキシ$ 又は $-NH_2$ の1以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成する。


【請求項54】

有効量の、式(IV)を有する化合物又は薬学上許容可能なその塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、腎不全を治療する方法。

(200)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 3 3】



式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCH(O)-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、他の基が水素であり；

Z₁ 及び Z₂ は、独立して、-H 又は -C₁ ~ C₁₀ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -OH 又は -N(Z₃)(Z₄) の 1 以上で置換され、その際、Z₃ 及び Z₄ は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -H 又は -ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、Z₃ 及び Z₄ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、Z₁ 及び Z₂ は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 5 5】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 6】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 5 2 に記載の方法。

【請求項 5 7】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 5 3 に記載の方法。


【請求項 5 8】

腎不全が、慢性腎不全又は急性腎不全である請求項 5 4 に記載の方法。

【請求項 5 9】

式 (IV) の化合物又は薬学上許容可能なその塩。

【化 3 4】



式中、

R₁₃ 及び R₁₆ は水素であり；R₁₄ 基及び R₁₅ 基の一方が、-NHCH(O)-(CH₂)_n-NZ₁Z₂ であり、

(201)

JP 2007-527872 A 2007.10.4

他の基が水素であり；

Z_1 及び Z_2 は、独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の 1 以上で置換され、その際、 Z_3 及び Z_4 は独立して $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 又は $-NH_2$ の 1 以上で置換され、或いは、 Z_3 及び Z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、 N 、 Z_1 及び Z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；且つ

n は 0 ~ 5 の整数である。

【請求項 60】

R_{14} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{15} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 61】

R_{15} が $-NHCH(O)-(CH_2)_n-NZ_1Z_2$ であり、且つ R_{13} 、 R_{14} 及び R_{16} がそれぞれ水素である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 62】

n が 1 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 63】

n が 2 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 64】

n が 3 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 65】

n が 4 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 66】

n が 5 である請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩。

【請求項 67】

生理学的に許容可能なキャリア又はビヒクル及び有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を含む組成物。

【請求項 68】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、再灌流傷害を治療する方法。

【請求項 69】

再灌流傷害が、脳卒中又は心筋梗塞である請求項 68 に記載の方法。

【請求項 70】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、炎症性疾患を治療する方法。

【請求項 71】

炎症性疾患が、関節の炎症性疾患、歯肉の慢性炎症性疾患、炎症性腸疾患、炎症性肺疾患、中枢神経系の炎症性疾患、目の炎症性疾患、グラム陽性のショック、グラム陰性のショック、出血性ショック、アナフィラキシー性ショック、外傷性ショック又は化学療法のショックである請求項 70 に記載の方法。

【請求項 72】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、糖尿病及び糖尿病合併症を治療する方法。

【請求項 73】

糖尿病が、I 型糖尿病又は II 型糖尿病である請求項 72 に記載の方法。

【請求項 74】

有効量の請求項 59 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、虚血性の症状を治療する方法。

(202)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【請求項 7 5】

虚血性の症状が、心筋虚血、安定狭心症、不安定狭心症、脳卒中、虚血性心疾患又は脳虚血である請求項 7 4 に記載の方法。

【請求項 7 6】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、臓器移植の結果生じる再酸素化傷害を治療する方法。


【請求項 7 7】

有効量の請求項 5 9 に記載の化合物又は薬学上許容可能なその化合物の塩を、その必要に応じて動物に投与することを含む、パーキンソン病を治療する方法。

【請求項 7 8】

化学式 5 3 a


【化 3 5】



53a


を有する化合物の製造方法において、化学式

【化 3 6】



を有する化合物を、化学式 5 3 a の化合物の製造に十分な条件でトリエチルアミンを存在させる下で、化学式

【化 3 7】



を有する化合物と反応させる工程を備える、製造方法。


【請求項 7 9】

化学式


J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

O=C1NC2=C(C=C1)c3ccccc3C2NCC(=O)OCCN(C)C


【化 3 9】



【化 4 0】



【化 4 1】




(i i) 化学式

(204)


J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 4 2】



の化合物を、


【化 4 3】



の化合物を生成するために十分な条件下で還元剤と反応させる工程と、

(i i i) 化学式

【化 4 4】




の化合物を、 $X-(CH_2)_n-COCl$ (X はBrまたはClであり、 n は0～5の範囲の整数)の化学式を有する化合物と、化学式

(205)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 4 5】



の化合物を生成するために十分な条件下で反応させる工程と、


(i v) 化学式

【化 4 6】



の化合物を化学式 HNZ_1Z_2 の化合物と、化学式

【化 4 7】



の化合物を生成するために十分な条件下で反応させる工程であって、工程 (i i i) , (i v) の X , n は同一であり、

Z_1 , Z_2 は独立して、置換されていないか、 $-\text{H}$ 、 $-\text{OH}$, $-\text{NZ}_3\text{Z}_4$ のうちの1つ以上で置換された $-\text{H}$ または $-\text{C}_1 \sim \text{C}_{10}$ アルキルであり、ここで、 Z_3 , Z_4 は独立して、置換されていないか、 $-\text{H}$ 、 $-\text{ヒドロキシ}$, $-\text{NH}_2$ のうちの1つ以上で置換された $-\text{H}$ または $-\text{C}_1 \sim \text{C}_5$ アルキルであり、または、 N , Z_3 , Z_4 は N を含む3～7員環の単環複素環を形成し、または N , Z_1 , Z_2 は N を含む3～7員環の単環複素環を形成する工程とを備える、製造方法。


【請求項 80】

化学式 43

(206)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


【化 4 8】

**43**

の化合物の製造方法であって、


(i) 化学式

【化 4 9】




の化合物を、化学式

【化 5 0】



の化合物と反応させる工程であって、化学式 5 3 a

【化 5 1】

**53a**


の化合物を生成するために十分な条件下でトリエチルアミンを存在させる反応工程と、

(i i) 化学式 5 3 a の化合物を 5 % P d / C と、化学式 5 4

(207)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化52】




54

の化合物を生成するために十分な条件下でギ酸アンモニウムを存在させて反応させる工程と、

(iii) 化学式54の化合物を、化学式55c

【化53】



55c


の化合物を生成するために十分な条件下で重炭酸ナトリウムを存在させて、クロロアセチルクロライドと反応させる工程と、

(iv) 化学式55cの化合物を、化合物43の化合物を生成するために十分な条件下でジメチルアミンと反応させる工程とを備える、製造方法。

【請求項81】

化学式


【化54】




(208)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

(カンファースルホン酸塩)
の化合物の製造方法であって、化合物 4 3
【 化 5 5 】



を、化学式
【 化 5 6 】



(カンファースルホン酸塩)
の化合物を生成するために十分な条件下でカンファースルホン酸と反応させる工程を備える、製造方法。


【 請求項 8 2 】

再灌流傷害を治療、または予防するための方法であって、必要に応じて有効量の化学式
(I)

(209)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

【化 5 7】



(I)

の化合物またはその医薬上許容可能な塩を動物に投与する工程を備え、

ここで、 R_5 は、 O 、 NH 又は S であり；

R_6 は、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキルであり；

X は、 $-C(O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH$ (ハロ) $-$ 、 $-CH(OH)-$ (CH_2) $_n$ 、 $-CH(OH)-$ 、 $-CH$ ($-アリール$) $-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-S-$ 、 $-CH(NR_{11}R_{12})-$ 、又は $-N(SO_2Y)-$ であり、その際、 Y は、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 又は $-(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ であり；

R_{11} 及び R_{12} は、独立して水素、又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル又は N であり、 R_{11} 及び R_{12} は、一緒になって窒素含有の3～7員環の単環式複素環を形成し；

R_1 は、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

A は、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-CO-$ 、 $-C(O)O-$ 、 $-CONH-$ 、 $-CON(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-$ 、 $-NH-$ 、 $-(CH_2)_n-$ 、 $-S-$ 又は $-C(S)-$ であり；

B は、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $3 \sim 7$ 員環の単環式複素環、 $7 \sim 10$ 員環の二環式複素環、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキレン})-NZ_1Z_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})-(3 \sim 7 \text{ 員環の単環式複素環})$ 、 $-H_2NC(O)-$ 置換の $-アリール$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C(O)O-$ フェニル、又は $-C(NH)NH_2$ であり、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-C(O)OH$ 又は $-C(NH)NH_2$ 以外のそれぞれは、置換されないか、又は $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 、 $-NO_2$ 、 $-CN$ 、 $-NZ_1Z_2$ 、 $-窒素$ 含有の3～7員環の単環式複素環、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_{10}$ のアルキニル、 $-アリール$ 、 $-ベンジル$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-C(O)O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 又は $-C_1 \sim C_5$ のアルキレン $-OC(O)-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ の1以上で置換され；

R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_7 、 R_8 、 R_9 及び R_{10} は独立して、 $-H$ 、 $-H$ 、 $-ヒドロキシ$ 、 $-O-(C_1 \sim C_5 \text{ のアルキル})$ 、 $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキル、 $-H$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C_2 \sim C_{10}$ のアルケニル、 $-C_3 \sim C_8$ の単環式シクロアルキル、 $-アリール$ 、 $-NH_2$ 、 $-アミノ$ 置換の $C_1 \sim C_5$ のアルキル、 $-C(O)OH$ 、 $-C(O)O(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-OC(O)(C_1 \sim C_5 \text{ アルキル})$ 、 $-NO_2$ 又は $-A-B$ であり；

Z_1 及び Z_2 は独立して、 $-H$ 又は $-C_1 \sim C_{10}$ のアルキルであり、それは置換されないか、又は $-H$ 、 $-OH$ 又は $-N(Z_3)(Z_4)$ の1以上で置換され、その際、 Z

(210)

J P 2007-527872 A 2007.10.4


z_3 及び z_4 は独立して -H 又は -C₁ ~ C₅ のアルキルであり、それは置換されないか、又は -ハロ、-ヒドロキシ又は -NH₂ の 1 以上で置換され、或いは、N、 z_3 及び z_4 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；或いは、N、 z_1 及び z_2 は一緒になって窒素含有の 3 ~ 7 員環の単環式複素環を形成し；

n は 0 ~ 5 の整数であって、再灌流傷害は心肺バイパス障害に起因している、方法。

【請求項 83】

前記化合物は、

【化 58】



またはその薬学上許容可能な塩である、請求項 82 に記載の方法。

【請求項 84】

前記薬学上許容可能な塩はメシラートである、請求項 83 に記載の方法。

【請求項 85】

前記再灌流傷害は心肺バイパス障害に起因している、請求項 68 に記載の方法。

(211)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US05/06243									
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) : A61K 31/473 ; C07D 221/18 US CL : 514/284 ; 546/61 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC											
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 514/284 ; 546/61 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN STRUCTURE SEARCH, FILE CAPLUS											
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category *</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>WO 03/020700 A2 (JAGTAP et al) 13 March 2003 (13.03.2003), see compounds 8a-8r, 10a, 10b in scheme 1 on page 23 as well as claims 1-73.</td> <td>1-16, 18, 19, 43-77</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>WO 00/21537 (CUSHMAN et al) 20 April 2000 (20.04.2000), see table 1 on pages 16-17 as well as claims 1, 3 and 4.</td> <td>1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14</td> </tr> </tbody> </table>			Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	WO 03/020700 A2 (JAGTAP et al) 13 March 2003 (13.03.2003), see compounds 8a-8r, 10a, 10b in scheme 1 on page 23 as well as claims 1-73.	1-16, 18, 19, 43-77	X	WO 00/21537 (CUSHMAN et al) 20 April 2000 (20.04.2000), see table 1 on pages 16-17 as well as claims 1, 3 and 4.	1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.									
X	WO 03/020700 A2 (JAGTAP et al) 13 March 2003 (13.03.2003), see compounds 8a-8r, 10a, 10b in scheme 1 on page 23 as well as claims 1-73.	1-16, 18, 19, 43-77									
X	WO 00/21537 (CUSHMAN et al) 20 April 2000 (20.04.2000), see table 1 on pages 16-17 as well as claims 1, 3 and 4.	1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14									
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.		☐ See patent family annex.									
* Special categories of cited documents: <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed </td> <td style="vertical-align: top;"> "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family </td> </tr> </table>			"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family							
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family										
Date of the actual completion of the international search 01 July 2005 (01.07.2005)		Date of mailing of the international search report 29 JUL 2005									
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (703) 305-3230		Authorized officer <i>Mania J. Aulakh</i> CHARANJIT S. AULAKH Telephone No. (571)272-1600									

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

(212)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US05/06243

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 3 of first sheet)This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
Please See Continuation Sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: Please See Continuation Sheet

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

(213)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US05/06243**BOX III. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING**

This application contains claims directed to more than one species of the generic invention. These species are deemed to lack unity of invention because they are not so linked as to form a single general inventive concept under PCT Rule 13.1.

In order for more than one species to be examined, the appropriate additional examination fees must be paid. The species are as follows:

I. Compounds of formula (IV), pharmaceutical compositions containing compounds of formula (I) alone where x represents -C(O)- or -CH₂- and methods of using compounds of formula (I) alone where x represents -C(O)- or -CH₂-.

II. Methods of using compounds of formula (I) alone where x represents -CH(halo)-, -CH(OH)-(CH₂)_n-, -CH(OH)-, -CH(aryl)- or -CH(NR₁NR₂)- as well as pharmaceutical compositions containing these compounds alone.

III. Methods of using compounds of formula (I) alone where x represents -O- or -S- as well as pharmaceutical compositions containing these compounds alone.

IV. Methods of using compounds of formula (I) alone where x represents -NH- or -N(SO₂Y)- as well as pharmaceutical compositions containing these compounds alone.

V. Methods of using compounds of formula (I) where x represents -C(O)- or -CH₂- in combination with other drugs as well as pharmaceutical compositions containing these combinations.

VI. Methods of using compounds of formula (I) where x represents -CH(halo)-, -CH(OH)-(CH₂)_n-, -CH(OH)-, -CH(aryl)- or -CH(NR₁NR₂)- in combination with other drugs as well as pharmaceutical compositions containing these combinations.

VII. Methods of using compounds of formula (I) where x represents -O- or -S- in combination with other drugs as well as pharmaceutical compositions containing these combinations.

VIII. Methods of using compounds of formula (I) where x represents -NH- or -N(SO₂Y)- in combination with other drugs as well as pharmaceutical compositions containing these combinations.

The claims are deemed to correspond to the species listed above in the following manner:

Species I : Claims 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 and 58-77.

Species V : Claims 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 and 42.

The following claim(s) are generic: Claims 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 and 57.

(214)

J P 2007- 527872 A 2007. 10. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/US05/06243

The species listed above do not relate to a single general inventive concept under PCT Rule 13.1 because, under PCT Rule 13.2, the species lack the same or corresponding special technical features for the following reasons:

There is no common core which in the Markush Practice, is a significant structural element shared by all of the alternatives; see PCT Administrative Instructions Annex B Part I (f) (i) (B) (i).

Continuation of Box III Item 4:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-77 and in part for 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 and 57

(215)

J P 2007-527872 A 2007. 10. 4

フロントページの続き

(51)Int. Cl.

A 6 1 K 31/437 (2006. 01)
 A 6 1 K 31/4188 (2006. 01)
 C 0 7 D 221/18 (2006. 01)
 C 0 7 D 401/12 (2006. 01)
 C 0 7 D 471/04 (2006. 01)
 C 0 7 D 409/12 (2006. 01)
 C 0 7 D 491/048 (2006. 01)
 C 0 7 D 495/04 (2006. 01)
 A 6 1 P 35/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 35/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 13/08 (2006. 01)
 A 6 1 P 13/10 (2006. 01)
 A 6 1 P 35/04 (2006. 01)
 A 6 1 P 43/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 9/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 7/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 9/08 (2006. 01)
 A 6 1 P 13/12 (2006. 01)
 A 6 1 P 9/10 (2006. 01)
 A 6 1 P 29/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 19/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 1/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 1/04 (2006. 01)
 A 6 1 P 11/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 25/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 27/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 3/10 (2006. 01)
 A 6 1 P 39/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 25/16 (2006. 01)
 A 6 1 P 37/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 19/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 11/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 31/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 31/08 (2006. 01)
 A 6 1 P 17/00 (2006. 01)
 A 6 1 P 17/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 25/28 (2006. 01)
 A 6 1 P 25/14 (2006. 01)
 A 6 1 P 21/04 (2006. 01)
 A 6 1 P 17/02 (2006. 01)
 A 6 1 P 3/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 9/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 9/04 (2006. 01)
 A 6 1 P 27/12 (2006. 01)
 A 6 1 P 27/06 (2006. 01)
 A 6 1 P 31/10 (2006. 01)
 A 6 1 P 3/04 (2006. 01)

F I

A 6 1 K 31/437
 A 6 1 K 31/4188
 C 0 7 D 221/18 C S P
 C 0 7 D 221/18
 C 0 7 D 401/12
 C 0 7 D 471/04 1 0 5 C
 C 0 7 D 409/12
 C 0 7 D 471/04 1 0 4 Z
 C 0 7 D 491/048
 C 0 7 D 495/04 1 0 5 A
 A 6 1 P 35/00
 A 6 1 P 35/02
 A 6 1 P 13/08
 A 6 1 P 13/10
 A 6 1 P 35/04
 A 6 1 P 43/00 1 2 1
 A 6 1 P 9/00
 A 6 1 P 7/02
 A 6 1 P 9/08
 A 6 1 P 13/12
 A 6 1 P 9/10 1 0 3
 A 6 1 P 29/00
 A 6 1 P 19/02
 A 6 1 P 1/02
 A 6 1 P 1/04
 A 6 1 P 11/00
 A 6 1 P 25/00
 A 6 1 P 27/02
 A 6 1 P 3/10
 A 6 1 P 9/10
 A 6 1 P 39/06
 A 6 1 P 25/16
 A 6 1 P 37/06
 A 6 1 P 29/00 1 0 1
 A 6 1 P 19/00
 A 6 1 P 11/06
 A 6 1 P 31/06
 A 6 1 P 31/08
 A 6 1 P 17/00
 A 6 1 P 17/06
 A 6 1 P 43/00
 A 6 1 P 25/28
 A 6 1 P 25/14
 A 6 1 P 21/04
 A 6 1 P 17/02
 A 6 1 P 3/06
 A 6 1 P 9/06

テーマコード (参考)

4 C 0 8 6
 4 C 2 0 6

(216)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

A 6 1 P 9/12 (2006.01)

A 6 1 K 31/166 (2006.01)

A 6 1 P 9/04

A 6 1 P 27/12

A 6 1 P 27/06

A 6 1 P 31/10

A 6 1 P 3/04

A 6 1 P 9/12

A 6 1 K 31/166

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW, EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CQ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NQ, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 バログル、エルカン

アメリカ合衆国 0 2 1 8 0 マサチューセッツ州 ストーンハム ベンジャミン テラス 8

(72) 発明者 バン ドゥーザー、ジョン エイチ .

アメリカ合衆国 0 1 8 3 3 マサチューセッツ州 ジョージタウン サーロウ ストリート 1 0 2

(72) 発明者 サボー、シャバ

アメリカ合衆国 0 1 9 3 0 マサチューセッツ州 グロスター スタークノート ハイツ 3 0

(72) 発明者 ザルツマン、アンドリュー エル .

アメリカ合衆国 0 2 4 7 8 マサチューセッツ州 ベルモント プレザント ストリート 4 8 3 ユニット 1

(72) 発明者 ロイ、アロカ

アメリカ合衆国 0 1 7 2 0 マサチューセッツ州 アクトン イーサン アレン ドライブ 3 4

(72) 発明者 ウィリアムズ、ウィリアム

アメリカ合衆国 0 1 9 3 8 マサチューセッツ州 イプスウィッチ ニューマーチ ストリート 1 4

(72) 発明者 ニボロジキン、アレキサンダー

アメリカ合衆国 0 2 1 3 2 マサチューセッツ州 ウェスト ロックスベリー デント ストリート 1 1 8

F ターム(参考) 4C034 Q 02

4C050 AA01 AA07 BB07 CC16 DD10 EE01 FF01 GG03 HH01 HH04

4C063 AA01 BB07 BB08 CC17 CC25 CC41 CC92 DD03 DD10 DD12

EE01

4C065 AA04 AA18 BB04 BB06 CC01 CC09 DD02 DD03 EE02 HH01

JJ 01 JJ 04 KK01 KK09 LL01 PP18 QQ04

4C071 AA01 AA07 CC01 CC21 DD15 EE13 FF06 HH08 LL01

4C086 AA01 AA02 AA03 BC27 BC38 BC50 BC60 BC73 CB05 CB22

GA04 GA07 GA08 GA09 GA12 GA13 MA01 MA02 MA03 MA04

MA05 NA14 ZA02 ZA16 ZA22 ZA33 ZA36 ZA38 ZA39 ZA40

ZA42 ZA45 ZA54 ZA59 ZA66 ZA67 ZA68 ZA70 ZA81 ZA89

ZA94 ZA96 ZB08 ZB11 ZB26 ZB27 ZB35 ZC33 ZC35 ZC37

ZC75

4C206 AA01 AA02 AA03 AA04 HA03 KA01 MA01 MA02 MA03 MA04

NA14 ZA01 ZA02 ZA15 ZA16 ZA22 ZA33 ZA36 ZA38 ZA39

ZA40 ZA42 ZA44 ZA54 ZA59 ZA66 ZA67 ZA68 ZA70 ZA81

(217)

J P 2007-527872 A 2007.10.4

ZA89 ZA94 ZA96 ZB08 ZB09 ZB11 ZB15 ZB26 ZB27 ZB33
ZB35 ZC02 ZC33 ZC35 ZC75

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-521828

(P2008-521828A)

(43) 公表日 平成20年6月26日(2008.6.26)

(51) Int. Cl.	F 1	テーマコード (参考)
C07K 16/00 (2006.01)	C07K 16/00 Z N A	4 B 0 2 4
C07K 16/08 (2006.01)	C07K 16/08	4 B 0 6 4
C07K 16/12 (2006.01)	C07K 16/12	4 C 0 8 4
C07K 16/14 (2006.01)	C07K 16/14	4 C 0 8 5
C07K 16/18 (2006.01)	C07K 16/18	4 H 0 4 5
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 62 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2007-543601 (P2007-543601)
 (86) (22) 出願日 平成17年11月29日 (2005.11.29)
 (85) 翻訳文提出日 平成19年7月10日 (2007.7.10)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2005/043257
 (87) 国際公開番号 W02006/065533
 (87) 国際公開日 平成18年6月22日 (2006.6.22)
 (31) 優先権主張番号 60/631,757
 (32) 優先日 平成16年11月29日 (2004.11.29)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 60/673,146
 (32) 優先日 平成17年4月19日 (2005.4.19)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)


(71) 出願人 505314468
 シアトル ジェネティックス, インコー
 ボレイテッド
 アメリカ合衆国 ワシントン 98021
 , ボセル, エス. イー., 30ティ
 ーエイチ ドライブ - 21823
 (74) 代理人 100078282
 弁理士 山本 秀策
 (74) 代理人 100062409
 弁理士 安村 高明
 (74) 代理人 100113413
 弁理士 森下 夏樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 操作された抗体およびイムノコンジュゲート

(57) 【要約】

薬剤結合の所定部位および化学量論を有する抗体薬剤コンジュゲートを提供する。抗体薬剤コンジュゲートを使用する方法も提供する。特定の実施形態では、本発明のイムノコンジュゲートは、操作された抗体を含む、イムノコンジュゲートであって、該操作された抗体は、(a) 標的抗原のための機能的に活性な抗原結合領域、(b) 鎖間システイン残基少なくとも1つ、(c) 鎖間システイン残基のアミノ酸置換少なくとも1つ、および(d) 鎖間システイン残基少なくとも1つにコンジュゲートした診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤を有する。



(2)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

操作された抗体を含む、イムノコンジュゲートであって、該操作された抗体は、(a) 標的抗原のための機能的に活性な抗原結合領域、(b) 鎖間システイン残基少なくとも1つ、(c) 鎖間システイン残基のアミノ酸置換少なくとも1つ、および(d) 鎖間システイン残基少なくとも1つにコンジュゲートした診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤を有する、イムノコンジュゲート。

【請求項2】

鎖間システイン残基4つおよび鎖間システイン残基のアミノ酸置換4つを有する、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項3】

鎖間システイン残基2つおよび鎖間システイン残基のアミノ酸置換6つを含む、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項4】

I g G 1またはI g G 4である、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項5】

各アミノ酸置換がシステインからセリンへの置換である、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項6】

前記診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤が治療薬剤である、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項7】

前記治療薬剤がオーリスタチンまたはオーリスタチン誘導体である、請求項6記載のイムノコンジュゲート。

【請求項8】

前記オーリスタチン誘導体がドバリナーバリンドライソロイシンドラプロリンフェニルアラニン(MMAF)またはモノメチオーリスタチンE(MMAE)である、請求項7記載のイムノコンジュゲート。

【請求項9】

前記診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤が診断薬剤である、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項10】

前記診断薬剤が放射性薬剤、酵素、蛍光化合物または電子移動剤である、請求項9記載のイムノコンジュゲート。

【請求項11】

前記抗体がCD20、CD30、CD33、CD40、CD70またはLewis Yに結合する、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項12】

前記抗体が免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質に結合する、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項13】

前記抗体が微生物抗原に結合する、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項14】

前記抗体がウイルス抗原に結合する、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項15】

前記抗体が抗核抗体、抗dsDNA抗体、抗ssDNA抗体、抗カルジオリビン抗体IgMもしくはIgG、抗リン脂質抗体IgMもしくはIgG、抗SM抗体、抗ミトコンドリ

(3)

特表2008-521828(P2008-521828A)

ア抗体、抗甲状腺抗体、抗マイクロソーム抗体、抗サイログロブリン抗体、抗SCL70抗体、抗Jo抗体、抗U1RNP抗体、抗La/SSB抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗壁細胞抗体、抗ヒストン抗体、抗RNP抗体、抗C-ANCA抗体、抗P-ANCA抗体、抗中心体抗体、抗フィブリラリン抗体または抗GBM抗体である、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項16】

前記抗体が抗体フラグメントである、請求項1記載のイムノコンジュゲート。

【請求項17】

前記抗体フラグメントがFab、Fab' およびscFvFcから選択される、請求項16記載のイムノコンジュゲート。

【請求項18】

前記フラグメントがFab' またはscFvFcである、請求項17記載のイムノコンジュゲート。

【請求項19】

請求項1記載のイムノコンジュゲートであって、下記の式：

【化1】



を有するか、または薬学的に受容可能なその塩または溶媒和物であり、

ここで：

Abは抗体であり、

Aはストレッチャー単位であり、

aは0または1であり、

各Wは独立してリンカー単位であり、

wは0～12の範囲の整数であり、

Yはスペーサー単位であり、

yは0、1または2であり、

pは1～約20の範囲であり、


Dは診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤であり、そして、

zはタンパク質上の所定のコンジュゲーション部位の数である、イムノコンジュゲート。

【請求項20】

下記の式：

【化2】



を有し、ここで、R¹⁷は-C₁-C₁₀アルキレン-、-C₃-C₈カルボシクロ-、-O-(C₁-C₈アルキル)-、-アリーレン-、-C₁-C₁₀アルキレン-アリーレン-、-アリーレン-C₁-C₁₀アルキレン-、-C₁-C₁₀アルキレン-(C₃-C₈カルボシクロ)-、-(C₃-C₈カルボシクロ)-C₁-C₁₀アルキレン-、-C₃-C₈ヘテロシクロ-、-C₁-C₁₀アルキレン-(C₃-C₈ヘテロシクロ)-、-(C₃-C₈ヘテロシクロ)-C₁-C₁₀アルキレン-、-(CH₂CH₂O)_r-および(CH₂CH₂O)_r-CH₂-から選択される、請求項19記載のイムノコンジュゲート。


【請求項21】

下記の式：

(4)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【化3】




ここで、 R^{17} は $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン、 $-\text{C}_3-\text{C}_8$ カルボシクロ、 $-\text{O}(\text{C}_1-\text{C}_8 \text{ アルキル})-$ 、 $-\text{アリーレン}$ 、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-アリーレン、 $-\text{アリーレン}-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン- $(\text{C}_3-\text{C}_8 \text{ カルボシクロ})-$ 、 $-(\text{C}_3-\text{C}_8 \text{ カルボシクロ})-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン、 $-\text{C}_3-\text{C}_8$ ヘテロシクロ、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン- $(\text{C}_3-\text{C}_8 \text{ ヘテロシクロ})-$ 、 $-(\text{C}_3-\text{C}_8 \text{ ヘテロシクロ})-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン、 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_x$ および $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_x-\text{CH}_2$ から選択される] を有する、請求項19記載のイムノコンジュゲート。

【請求項22】

下記の式：

【化4】




を有する、請求項19記載のイムノコンジュゲート。

【請求項23】

下記の式：

【化5】




を有する、請求項19記載のイムノコンジュゲート。

【請求項24】

下記の式：

【化6】



を有する、請求項19記載のイムノコンジュゲート。


【請求項25】

下記の式：

(5)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【化7】



を有する、請求項19記載のイムノコンジュゲート。

【請求項26】

請求項1記載のイムノコンジュゲートおよび薬学的に受容可能な担体を含む、医薬組成物。

【請求項27】

前記イムノコンジュゲートが薬学的に受容可能な非経口ビヒクルを用いて製剤される、請求項26記載の医薬組成物。

【請求項28】

前記イムノコンジュゲートが単位用量の注射可能形態に製剤される、請求項26記載の医薬組成物。

【請求項29】

腫瘍細胞または癌細胞を殺傷または増殖抑制するための方法であって、該腫瘍細胞または癌細胞を殺傷または増殖抑制するために有効な量の請求項6記載のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物で該腫瘍細胞または癌細胞を処理する工程を包含する、方法。

【請求項30】

癌を処置するための方法であって、ある量の請求項6記載のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与する工程を包含し、該量が、癌の処置に有効である、方法。

【請求項31】

自己免疫疾患を処置するための方法であって、ある量の請求項6記載のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与する工程を包含し、該量が該自己免疫疾患の処置に有効である、方法。

【請求項32】

感染性疾患を処置するための方法であって、ある量の請求項6記載のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与する工程を包含し、該量が該感染性疾患の処置に有効である、方法。

【請求項33】

請求項6記載の抗体薬剤コンジュゲート化合物；

容器；および

CD20、CD30、CD33、CD40、CD70およびLewis Yのうちの少なくとも1つの過剰発現を特徴とする癌を処置するために該化合物を使用することができることを示す、パッケージインサートまたはラベルを備える、製造品。

【請求項34】

癌を診断するための方法であって、患者に請求項9記載のイムノコンジュゲートの有効量を投与する工程であって、ここで該イムノコンジュゲートは該癌により過剰発現される抗原に結合する工程；および該患者における該イムノコンジュゲートを検出する工程を包含する、方法。

【請求項35】

感染性疾患を診断するための方法であって、患者に請求項9記載のイムノコンジュゲート

(6)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

の有効量を投与する工程であって、ここで該イムノコンジュゲートは微生物抗原またはウイルス抗原に結合する、工程；および該患者における該イムノコンジュゲートを検出する工程を包含する、方法。

【請求項36】

自己免疫疾患を診断するための方法であって、患者に請求項9記載のイムノコンジュゲートの有効量を投与する工程であって、ここで該イムノコンジュゲートは該自己免疫疾患に関連する抗原に結合する、工程；および該患者における該イムノコンジュゲートを検出する工程を包含する、方法。

【請求項37】

イムノコンジュゲートを製造するための方法であって：

(a) 操作された抗体を発現する宿主細胞を培養する工程であって、ここで、該操作された抗体は、(i) 標的抗原のための機能的に活性な抗原結合領域、(ii) 鎖間システイン残基少なくとも1つ、および(iii) 鎖間システイン残基のアミノ酸置換少なくとも1つを含み、該宿主細胞は、該操作された抗体をコードする単離された核酸で形質転換またはトランスフェクトされている、工程；

(b) 培養された宿主細胞または培養培地から該抗体を回収する工程；ならびに

(c) 該鎖間システイン残基少なくとも1つに診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤をコンジュゲートする工程

を包含する、方法。

【請求項38】

前記アミノ酸置換がシステインからセリンへの置換である、請求項37記載の方法。

【請求項39】

前記抗体がインタクトな抗体または抗原結合フラグメントである、請求項37記載の方法

。

【請求項40】

前記抗原結合フラグメントがFab、Fab' またはscFvFcである、請求項39記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

(関連出願の引用)

本出願は各々参照により全体が本明細書に援用される2004年11月29日出願の米国仮特許出願第60/631,757号および2005年4月19日出願の米国仮特許出願第60/673,146号の利益を請求する。

【背景技術】

【0002】

(背景)

本発明は活性部分に対する結合の予め決められた点を有する操作された抗体に関する。特に本発明は抗体のアミノ酸残基の選択的置換により活性部分に対する結合の予め決められた点を有する抗体に関する。

【0003】

放射性核種または他の細胞傷害性剤にコンジュゲートしたターゲティングモノクローナル抗体の使用は、腫瘍部位に直接そのような薬剤を送達することにより薬剤の正常組織への曝露を制限するという可能性をもたらす(例えば非特許文献1参照)。近年、抗体系の治療の潜在性および腫瘍関連抗原の局在化におけるその正確さが、実験室および臨床の両方の研究において明らかにされている(例えば非特許文献2；非特許文献3；Baldwin等の特許文献1および特許文献2；Youngの特許文献3および特許文献4；Irie等の特許文献5；Hellstrom等の特許文献6および特許文献7参照)。一般的に、腫瘍関連マーカーに対する放射標識された抗体または抗体フラグメントの使用は、治療のためよりも腫瘍の位置特定のために良好に使用されているが、その理由は部分的に

(7)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

は、腫瘍による抗体の取り込みが一般的に低値であり、注射した総量の僅か0.01%～0.001%の範囲に過ぎないためである（非特許文献4）。腫瘍への用量を増大させるために放射標識の濃度を増大させることは、一般的に、放射能への健康な組織の曝露も増大させるため、逆効果である。

【0004】

モノクローナル抗体は放射性核種以外の種々の薬剤にコンジュゲートして診断および治療において使用するためのイムノコンジュゲートを形成することができる。これらの薬剤は、イムノコンジュゲートが放射性同位体ならびに毒素および化学療法剤などの細胞傷害性剤と安定な結合を形成できるようにするキレートを包含する。例えば、通常は全身投与されれば患者にとって毒性が高すぎる細胞傷害性剤は、その毒性作用が標的抗原を担持する腫瘍細胞のみに対して指向されるような様式において抗癌抗体にコンジュゲートすることができる。イムノコンジュゲートの診断上または治療上の効果は数種の要因に依存している。これらの要因に包含されるものは、薬剤の抗体に対するモル比およびイムノコンジュゲートの結合活性である。

【0005】

研究者等は、抗体に直接連結できる薬剤の最大数が抗体分子上の修飾可能な部位の数および抗体の免疫反応性の潜在的損失により制限されることを見出している。例えば、非特許文献5は、抗原結合活性を大きく低減することなく抗体に取り込ませることのできる薬剤分子の数には限界があることを報告している。Kulkarni等によれば、メトトレキセートに関して得られた最大取り込みは抗体分子当たり約10個のメトトレキセート分子であり、約10を超えて薬剤-抗体のモル比を上昇させる試みはイムノコンジュゲートの収率を低下させ、抗体活性を損なうものであることを見出されている。非特許文献6は同様の結果を報告している。

【0006】

薬剤および放射性核種のための送達ビヒクルとしてモノクローナル抗体が機能するためには、その部位特異的コンジュゲーションのための方法を、最終的な免疫反応性の変動を最小限にしながら開発することが重要である。最も一般的には、薬剤と放射性核種とのコンジュゲーションはアミノ酸残基の側鎖への共有結合を介して行われる。これらの残基の非部位制限性の特徴のため、抗原結合部位（ABS）の内部または近接部に存在する残基における望ましくないカップリングを回避することは困難であり、低減された親和性および非均質な抗原結合特性がもたらされてしまう。あるいは、コンジュゲーションはスルフィドリル基に指向させることもできる。しかしながら、直接の標識はジスルフィド（S-S）結合の還元依存しており、タンパク質のフラグメント化の危険性を伴う可能性がある。このような結合の不完全な還元は結合の非均質なパターンをもたらす場合がある。

【0007】

例えば、cAC10抗体薬剤コンジュゲート（CD30を指向）の早期前臨床型は、システイン残基を介した抗体への8MMAE（モノメチルオーリスチンE）薬剤分子の連結を行っている。システイン残基は4つの鎖間ジスルフィド結合の還元により得られる（非特許文献7）。最近の報告はcAC10ADCのインビボのパラメーターに対する薬剤の多重度の作用を説明している（非特許文献8）。抗体当たり4薬剤分子が結合したcAC10MMAE薬剤コンジュゲート（C8-E4と標記、ここでC#はコンジュゲーションのために使用できる鎖内システイン残基の数を示し、E#は抗体分子当たり結合した薬剤分子の平均数を示す）は、動物モデルにおいて、抗体当たり8薬剤が結合したcAC10薬剤コンジュゲート（C8-E8と標記）よりも大きい治療ウィンドウを有することが示されている。C8-E4はcAC10単独と同様の薬物動態特性を示すのに対し、C8-E8はより急速に循環から消失する（非特許文献8）。これらの特性はC8-E4が臨床開発の候補であることを示唆している。

【0008】

cAC10からのC8-E4の製造は、コンジュゲーションの方法によっては低収率で薬剤結合が非均一となる。抗体当たり8薬剤未満が負荷されたMMAEコンジュゲートを

(8)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

得るために使用される1つの方法は、システイン残基の部分還元を利用している（非特許文献8）。このコンジュゲーションプロセスは、抗体分子当たり0、2、4、6または8薬剤分子を有する物質種（それぞれC8-E0、C8-E2、C8-E4、C8-E6およびC8-E8と標記）の混合物をもたらし、そのうち約30%がC8-E4である。このコンジュゲート混合物を疎水性相互作用クロマトグラフィーにより分離することにより純粋なC8-E4を得ることができるが、このプロセスは、薬剤が8つの可能なコンジュゲーション部位に渡って分布するため、全体収量の更なる低下と比均質性の存続をもたらす。さらにまた、重鎖から軽鎖へのジスルフィド結合の還元が重鎖から重鎖ジスルフィドへの頻度のほぼ2倍で起こり、該当するC8-E4異性体は2：1の比になってしまう（例えば非特許文献9参照）。

【特許文献1】米国特許第4,925,922号明細書

【特許文献2】米国特許第4,916,213号明細書

【特許文献3】米国特許第4,918,163号明細書

【特許文献4】米国特許第5,204,095号明細書

【特許文献5】米国特許第5,196,337号明細書

【特許文献6】米国特許第5,134,075号明細書

【特許文献7】米国特許第5,171,665号明細書

【非特許文献1】Goldenberg, Semin, Nucl. Med. 19:332 (1989)

【非特許文献2】Thorpe, TIBTECH 11:42 (1993)

【非特許文献3】Goldenberg, Scientific American, Science & Medicine 1:64 (1994)

【非特許文献4】Vaughanら、Brit. J. Radiol. 60:567 (1987)

【非特許文献5】Kulkarniら、Cancer Research 41:2700-2706 (1981)

【非特許文献6】Kanellosら、JNCI 75:319-329 (1985)

【非特許文献7】Doroninaら、Nat. Biotechnol. 21(7):778-84 (2003)

【非特許文献8】Hamblettら、Clin. Cancer Res. 15:7063-7070 (2004)

【非特許文献9】Sunら、Bioconj Chem 16:1282-1290 (2005)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

従って、化学量論的な薬剤結合のために1つ以上の予め決められた部位を有する抗体が必要とされている。過去における上記および他の制約および問題は本発明により解決される。

【課題を解決するための手段】

【0010】

（発明の簡単な要旨）

本発明は操作された抗体およびイムノコンジュゲートに関する。本発明は操作された抗体およびイムノコンジュゲート、ならびに、このような操作された抗体およびイムノコンジュゲートを製造する方法を提供する。本発明はまた、イムノコンジュゲートの医薬組成物ならびに種々の状態および疾患を治療または診断するためにイムノコンジュゲートを使用する方法を提供する。

【0011】

1つの態様において、本発明は、標的抗原のための機能的に活性な抗原結合部位、鎖間システイン残基少なくとも1つ、鎖間システイン残基のアミノ酸置換少なくとも1つ、お

(9)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

よび鎖間システイン残基少なくとも1つにコンジュゲートした診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤を有する操作された抗体を含むイムノコンジュゲートを提供する。1つの実施形態において、本発明は鎖間システイン残基4つおよび鎖間システイン残基のアミノ酸置換4つを有するイムノコンジュゲートを提供する。関連する実施形態において、本発明は鎖間システイン残基2つおよび鎖間システイン残基のアミノ酸置換6つを含むイムノコンジュゲートを提供する。別の実施形態において、本発明はI g G 1またはI g G 4アイソタイプであるイムノコンジュゲートを提供する。アミノ酸置換は例えば鎖間システイン残基のシステインからセリンへのアミノ酸置換であり得る。

【0012】

別の態様において、本発明は鎖間システイン残基少なくとも1つに治療薬剤がコンジュゲートしている上記したイムノコンジュゲートを提供する。1つの実施形態において、治療薬剤はオーリスタチンまたはオーリスタチン誘導体である。一部の実施形態においては、オーリスタチン誘導体はドバリナーバリンードライソロイシンードラプロリンフェニルアラニン (MMAF) またはモノメチオーリスタチンE (MMAE) である。

【0013】

別の態様において、本発明は鎖間システイン残基少なくとも1つに診断薬剤がコンジュゲートしている上記したイムノコンジュゲートを提供する。診断薬剤は例えば放射性薬剤、酵素、蛍光化合物または電子移動剤であり得る。

【0014】

別の態様において、本発明は抗体が標的抗原に対して機能的に活性な抗原結合部位を有する上記したイムノコンジュゲートを提供する。抗体は例えばCD 20、CD 30、CD 33、CD 40、CD 70またはLewis Yに結合することができる。抗体はまた、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質に結合することもできる。他の例では、抗体はまた、微生物抗原またはウイルス抗原に結合する。抗体はまた、抗核抗体、抗dsDNA抗体、抗ssDNA抗体、抗カルジオリピン抗体I g MまたはI g G、抗リン脂質抗体I g MまたはI g G、抗SM抗体、抗ミトコンドリア抗体、抗甲状腺抗体、抗ミクロソーム抗体、抗サイログロブリン抗体、抗SCL 70抗体、抗Jo抗体、抗U1RNP抗体、抗La/SSB抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗壁細胞抗体 (anti-peritoneal cell antibody)、抗ヒストン抗体、抗RNP抗体、抗C ANCA抗体、抗P ANCA抗体、抗中心体抗体、抗フィブリラリン抗体または抗GBM抗体であり得る。

【0015】


別の態様において、本発明は抗体が抗体フラグメントであるイムノコンジュゲートを提供する。1つの実施形態においては、抗体フラグメントはFab、Fab' またはscFvFcから選択される。

【0016】

1つの態様において、本発明は下記の式のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を提供する：

【0017】

【化8】



ここで、

Abは抗体であり、

Aはストレッチャー単位であり、

aは0または1であり、

各Wは独立してリンカー単位であり、

wは0～12の整数であり、

Yはスペーサー単位であり、

(1 0)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

yは0、1または2であり、
pは1～約20の範囲であり、そして、
Dは診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤であり、そして、
zはタンパク質上の所定のコンジュゲーション部位の数である。

【0018】

一部の実施形態においては、イムノコンジュゲートは以下の式を有する： $Ab-MC-vc-PAB-MMAF$ 、 $Ab-MC-vc-PAB-MMAE$ 、 $Ab-MC-MMAE$ または $Ab-MC-MMAF$ 。

【0019】

別の態様において、本発明は上記したイムノコンジュゲートおよび薬学的に受容可能な担体を含む医薬組成物を提供する。1つの実施形態において、イムノコンジュゲートは薬学的に受容可能な非経口ビヒクルを用いて製剤される。別の実施形態においては、イムノコンジュゲートは単位用量の注射可能形態に製剤される。関連する特徴において、本発明は治療薬剤にコンジュゲートしたイムノコンジュゲート、容器、ならびに、CD20、CD30、CD33、CD40、CD70およびLewis Yのうちの少なくとも1つの過剰発現を特徴とする癌を処置するためにこの化合物を使用することができることを示すパッケージインサートまたはラベルを含む製造品を提供する。

【0020】

別の態様において、本発明は治療薬剤にコンジュゲートした上記イムノコンジュゲートを用いて種々の状態または疾患を処置する方法を提供する。1つの実施形態において、方法は、腫瘍細胞または癌細胞を殺傷または増殖抑制するために有効な量のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を腫瘍細胞または癌細胞に投与することにより腫瘍細胞または癌細胞を殺傷または増殖抑制することを包含する。別の実施形態において、この方法は、癌を処置するために有効な量のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与することにより癌を処置することを包含する。別の実施形態において、この方法は、自己免疫疾患を処置するために有効な量のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与することによりこの自己免疫疾患を処置することを包含する。さらに別の実施形態において、この方法は感染性疾患を処置するために有効な量のイムノコンジュゲートまたは薬学的に受容可能なその塩もしくは溶媒和物を患者に投与することにより感染性疾患を処置することを包含する。

【0021】

別の態様において、本発明は診断薬剤にコンジュゲートした上記イムノコンジュゲートを用いて種々の状態または疾患を診断する方法を提供する。1つの実施形態において、方法は癌により過剰発現される抗原に結合するイムノコンジュゲートの有効量を患者に投与することおよび患者におけるイムノコンジュゲートを検出することにより癌を診断することを包含する。別の実施形態において、方法は微生物またはウイルス抗原に結合するイムノコンジュゲートの有効量を患者に投与することおよび患者におけるイムノコンジュゲートを検出することにより感染性疾患を診断することを包含する。さらに別の実施形態においては、方法は自己免疫疾患に関連する抗原に結合するイムノコンジュゲートの有効量を患者に投与することおよび患者におけるイムノコンジュゲートを検出することにより自己免疫疾患を診断することを包含する。

【0022】

別の態様において、本発明は標的抗原のための機能的に活性な抗原結合領域、鎖間システイン残基少なくとも1つ、および、鎖間システイン残基のアミノ酸置換少なくとも1つを有する操作された抗体を発現する宿主細胞を培養することを含むイムノコンジュゲートの製造方法を提供する。宿主細胞は操作された抗体をコードする単離された核酸で形質転換またはトランスフェクトされ得る。抗体は培養された宿主細胞または培養培地から回収され、そして鎖間システイン残基少なくとも1つを介して診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤にコンジュゲートされ得る。1つの実施形態において、抗体はインタクトな抗体また

(1 1)

特表2008-521828(P2008-521828A)

は抗原結合フラグメントである。好ましい実施形態においては、抗原結合フラグメントは Fab、Fab' または scFvFc である。

【0023】

本発明は、以下に記載する好ましい実施形態の詳細な説明を、添付する図面と組み合わせることで参照することにより最も良好に理解されよう。以下の考察は説明、解説および例示であり、添付する請求項により定義される範囲を限定するものとはみなされない。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

(定義)

特段の記載が無い限り、本明細書において使用する全ての技術的および科学的な用語は、記載する方法および組成物に関する分野における通常の技術者が一般的に理解するものと同じ意味を有する。本明細書においては、以下の用語および表現は特段の記載が無い限りそれらに帰属する意味を有する。

【0025】

抗体。本明細書においては、「抗体」とはモノクローナル抗体、例えばネズミ、キメラ、ヒトまたはヒト化抗体、抗体の混合物、ならびにその抗原結合フラグメントを指す。そのようなフラグメントには Fab、Fab'、F(ab)₂、F(ab')₂ が包含される。抗体フラグメントはまた、軽鎖可変領域よりなる単離されたフラグメント、重鎖および軽鎖の可変領域よりなる「Fv」フラグメント、ならびに、軽鎖および重鎖の可変領域がペプチドリンカーにより連結されている組み換え一本鎖ポリペプチド分子（例えば scFv および scFvFc）も包含する。一部の実施形態においては、抗体は鎖間システイン残基少なくとも 1 つを含む。

【0026】

インタクトな抗体。「インタクトな」抗体は V_L および V_H 抗原結合可変領域ならびに軽鎖定常ドメイン (C_L) および重鎖定常ドメイン C_H 1、C_H 2、C_H 3 および C_H 4 を含むものである。定常ドメインは天然配列定常ドメイン（例えばヒト天然配列定常ドメイン）またはそのアミノ酸配列変異体であってよい。

【0027】

鎖間システイン残基：本明細書においては、「鎖間システイン残基」または「鎖間システイン」とは未操作抗体の別の鎖のシステイン残基との鎖間ジスルフィド結合の形成に関与することができる抗体鎖のシステイン残基を指す。鎖間システイン残基は軽鎖の C_L ドメイン、重鎖の C_H 1 ドメインおよびヒンジ領域に位置する。抗体中の鎖間システイン残基の数は変動できる。例えばヒト IgG 1、IgG 2、IgG 3 および IgG 4 アイソタイプはそれぞれ 4、6、13 および 4 つの鎖間システイン結合を有する。特定の例においては、抗体 cAC10 を参照すれば、鎖間システインチオールは、Kabat のナンバリング法に従って、軽鎖のアミノ酸 214 位ならびに重鎖のアミノ酸 220、226 および 229 位に位置する (Kabat ら、Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th ed. NIH, Bethesda, MD (1991))。

【0028】

鎖間ジスルフィド結合。「鎖間ジスルフィド結合」という用語は、抗体に関する場合、2 つの重鎖または重鎖と軽鎖との間のジスルフィド結合を指す。

【0029】

操作された抗体。本明細書においては、「操作された抗体」とは別のアミノ酸残基との鎖間システイン残基のアミノ酸置換（例えばシステインからセリンへの置換）少なくとも 1 つを有し、そして、未置換の鎖間システイン残基少なくとも 1 つを保持している、天然に存在しないインタクトな抗体または抗原結合フラグメントを指す。

【0030】

異性体。「異性体」という用語は、抗体に関する場合、鎖間システイン残基のアミノ酸置換の特定のパターンまたは順序を有する抗体を指す。イムノコンジュゲートに関する場

(1 2)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

合、「異性体」という用語は、鎖間システイン残基のアミノ酸置換の特定のパターン若しくは順序および／または活性部分のコンジュゲーション部位の特定のパターンを有する抗体を指す。抗体の異性体は命名法C#v#により指し示すことができ、ここでC#はコンジュゲーションのために使用可能な鎖間システイン残基の数を示し、そしてv#は鎖間システイン残基の特定のパターンまたは順序を指す。イムノコンジュゲートの異性体は命名法C#v#-Yにより指し示すことができ、ここでC#およびv#は上記と同様の意味を有し、そしてYは抗体分子当たり結合している診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤の平均数を指す。

【0031】

完全に負荷された。「完全に負荷された」という用語は、特定の型および／または同様の反応性のコンジュゲーションの予め決められた点が活性部分にコンジュゲートし、イムノコンジュゲートの均質な集団 (C# = Y) を与える抗体を指す。

【0032】

部分的に負荷された。「部分的に負荷された」という用語は、特定の型および／または同様の反応性のコンジュゲーションの予め決められた点の一部分のみが活性部分にコンジュゲートし、イムノコンジュゲートの特定の異性体 (C# > Y) の形成をもたらす抗体を指す。

【0033】

診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤。本明細書においては、「診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤」という用語は診断、予防および／または治療のために有用なイムノコンジュゲートを製造するために抗体にコンジュゲートされる巨大分子、分子または原子などの活性部分である。診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤の例は薬剤、毒素および検出可能な標識を包含する。

【0034】

イムノコンジュゲート。本明細書においては、「イムノコンジュゲート」とは少なくとも1つの診断薬剤、予防薬剤および／若しくは治療薬剤、または、診断薬剤、予防薬剤および／若しくは治療薬剤に結合するキレート形成剤に直接または間接的にコンジュゲートしている抗体を含む分子である。イムノコンジュゲートは抗体の免疫反応性を保持しており、例えば抗体はコンジュゲーション前とほぼ同じか僅かにのみ低減したコンジュゲーション後の抗原結合能を有する。本明細書においては、イムノコンジュゲートはまた抗体薬剤コンジュゲート (ADC) とも称する。

【0035】

機能的に活性。「機能的に活性」という用語は、抗体に関する場合、抗体が標的抗原に免疫特異的に結合することを意味する。

【0036】

単離された。「単離された」という用語は、分子または巨大分子（例えば抗体または核酸）に関する場合、その天然の環境の成分から識別、分離および／または回収されているものである。その天然の環境の夾雑成分は分子の所望の用途（例えば診断または治療）を妨害する物質であり、そして酵素、ホルモンおよび他の蛋白性または非蛋白性の溶質を包含してよい。一部の実施形態においては、単離された分子または巨大分子は、（１）例えばLowryまたはBradford法により測定した場合に分子または巨大分子の95%超、または99%超まで、（２）スピニングカップシーケンサーを用いることによりN末端または内部のアミノ酸配列の少なくとも15残基が得られるのに十分な程度まで、あるいは（３）例えばクーマシーブルーまたは好ましくは銀染色法により測定した場合の還元または非還元条件下のSDS-PAGEにより均質となるまで、精製することになる。単離された分子および巨大分子は組み換え細胞内のインサイチュの分子および巨大分子も包含するが、その理由は分子および巨大分子の天然の環境の成分少なくとも1つが存在しないためである。しかしながら通常は単離された分子および巨大分子は少なくとも1つの精製工程により製造される。

【0037】

(1 3)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

構造遺伝子。本明細書においては、「構造遺伝子」とは、メッセンジャーRNA (mRNA) に転写され、次に特定のポリペプチドに特徴的なアミノ酸配列に翻訳される配列を有するDNA分子である。

【0038】

プロモーター。本明細書においては、「プロモーター」とは構造遺伝子の転写を指向してmRNAを生産する核酸の配列である。典型的には、プロモーターは構造遺伝子の開始コドンに近位の遺伝子の5'領域内に位置する。プロモーターが誘導プロモーターである場合は、転写率は誘導剤に応答して増大する。これとは対照的に、プロモーターが構成プロモーターである場合には、転写率は誘導剤により調節されない。

【0039】

エンハンサー。本明細書においては、「エンハンサー」とは、転写の開始部位と相対的なエンハンサーの距離または方向とは無関係に、特定の遺伝子がmRNAに転写される効率を増大できるプロモーターエレメントである。

【0040】

相補DNA (cDNA)。本明細書においては、「相補DNA」とは、酵素である逆転写酵素によりmRNA鋳型から形成される一本鎖DNA分子である。典型的には、mRNAの一部に相補なプライマーを逆転写の開始に使用する。当業者はまた、そのような一本鎖DNA分子およびその相補体よりなる二本鎖DNA分子を指すために「cDNA」という用語も使用する。

【0041】

発現。本明細書においては、「発現」とは構造遺伝子またはcDNA分子からポリペプチドが生成されるプロセスである。プロセスはコーディング領域のmRNAへの転写およびmRNAのポリペプチドへの翻訳を包含する。

【0042】

クローニングベクター。本明細書においては、「クローニングベクター」とは、宿主細胞内で自律複製する能力を有し、そして細胞を形質転換して遺伝子を調整するために使用されるプラスミド、コスミドまたはバクテリオファージなどのDNA分子である。クローニングベクターは典型的には、ベクターの本質的な生物学的機能を損失することなく測定可能なやり方において外来性DNA配列を挿入してよい制限エンドヌクレアーゼ認識部位1つまたは少数、ならびに、クローニングベクターにより形質転換された細胞の識別および選択において使用するために適するマーカー遺伝子を含有する。マーカー遺伝子は典型的にはテトラサイクリン耐性またはアンピシリン耐性をもたらす遺伝子を包含する。

【0043】

発現ベクター。本明細書においては、「発現ベクター」とは組み換え宿主中の外来タンパク質の発現を可能とする外来タンパク質をコードする異種の構造遺伝子またはcDNAを含むDNA分子である。典型的には、異種の遺伝子の発現はプロモーターおよび/またはエンハンサー配列などの特定の調節配列の制御下に（即ちこれらに作動可能に連結して）置かれる。プロモーター配列は構成または誘導の何れかであってよい。

【0044】

組み換え宿主。「組み換え宿主」とは、異種（外来）タンパク質の発現のための何れかの原核生物または真核生物の細胞であってよい。一部の実施形態においては、組み換え宿主はクローニングベクターまたは発現ベクターを含有する。この用語はまた、宿主細胞の染色体またはゲノム内の異種タンパク質をコードする核酸を含有するように遺伝子的に操作されている原核生物または真核生物の細胞を包含することも意味する。安定な宿主の例は、例えば、全て参照により本明細書に援用されるSambrookら、Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York (1989); Sambrookら、Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Third Edition, Cold Spring Harbor Publish, C

(14)

特表2008-521828(P2008-521828A)


old Spring Harbor, New York (2001); および Ausubelら、Current Protocols in Molecular Biology, 4th ed., John Wiley and Sons, New York (1999) を参照のこと。

【0045】

MMAE。略語「MMAE」は下記：

【0046】

【化9】




のモノメチルオーリスタチンEを指す。

【0047】

MMAF。略語「MMAF」は下記：

【0048】

【化10】




のドバリンーバリンードライソロイシンードラプロリンーフェニルアラニンを指す。

【0049】

AFP。略語「AFP」は下記：

【0050】

【化11】



のジメチルバリンーバリンードライソロイシンードラプロリンーフェニルアラニン-p-フェニレンジアミンを指す。

【0051】

AE B。略語「AE B」はオーリスタチンEをパラアセチル安息香酸と反応させることにより製造されるエステルを指す。

【0052】

AEVB。略語「AEVB」はオーリスタチンEをベンゾイル吉草酸と反応させることにより製造されるエステルを指す。

【0053】

患者。「患者」とは限定しないがヒト、ラット、マウス、モルモット、サル、ブタ、ヤギ、ウシ、ウマ、イヌ、ネコ、トリおよび家禽類を包含する。

【0054】

(1 5)

特表2008-521828(P2008-521828A)

有効量。「有効量」という用語は哺乳類における疾患または障害の診断、予防または治療のために十分な診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤の量を指す。

【0055】

治療有効量。「治療有効量」という用語は哺乳類における疾患または障害を予防または治療するために有効な薬剤、毒素または他の分子の量を指す。癌の場合は、治療有効量は、癌細胞の数を低減し；腫瘍の大きさを低減し；末梢臓器への癌細胞の浸潤を抑制（即ちある程度まで緩徐化および好ましくは停止）し；腫瘍の転移を抑制（即ちある程度まで緩徐化および好ましくは停止）し；腫瘍の増殖をある程度まで抑制し；および／または癌に関連する症状の1つ以上をある程度まで緩解してよい。薬剤、毒素または他の分子が既存の癌細胞を増殖抑制および／または殺傷する限り、それは細胞増殖抑制性および／または細胞傷害性である。癌の治療の場合は、薬効は例えば疾患の進行までの時間（TTP）の試験および／または応答率（RR）の測定により調べることができる。

【0056】

「薬学的に受容可能な塩」という語句は本明細書においては、分子または巨大分子の薬学的に受容可能な有機または無機の塩を指す。酸付加塩はアミノ基で形成することができる。例示される塩は、限定しないが、硫酸塩、クエン酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩、塩化物、臭化物、ヨウ化物、硝酸塩、重硫酸塩、リン酸塩、酸性リン酸塩、イソニコチン酸塩、乳酸塩、サリチル酸塩、酸性クエン酸塩、酒石酸塩、オレイン酸塩、タンニン酸塩、パントテン酸塩、重酒石酸塩、アスコルビン酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、ゲンチシン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、グルクロン酸塩、サッカリン酸塩、蟻酸塩、安息香酸塩、グルタミン酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩およびパモ酸塩（即ち1, 1'-メチレンビス-(2-ヒドロキシ-3-ナフトエート)）の塩を包含する。薬学的に受容可能な塩はアセテートイオン、スクシネートイオンまたは他の対イオンなどの別の分子の封入を包含してよい。対イオンは親化合物上の電荷を安定化させる何れかの有機または無機の部分であってよい。さらにまた、薬学的に受容可能な塩はその構造中に1つより多い荷電した原子を有してよい。複数の荷電原子が薬学的に受容可能な塩の部分となる場合は、塩は複数の対イオンを有することができる。従って、薬学的に受容可能な塩は1つ以上の荷電原子および／または1つ以上の対イオンを有することができる。

【0057】

「薬学的に受容可能な溶媒和物」または「溶媒和物」は1つ以上の溶媒分子と分子または巨大分子との会合を指す。薬学的に受容可能な溶媒和物を形成する溶媒の例は、限定しないが、水、イソプロパノール、エタノール、メタノール、DMSO、酢酸エチル、酢酸およびエタノールアミンを包含する。

【0058】

(詳細な説明)

本発明は、操作された抗体およびイムノコンジュゲート、ならびにこのような抗体およびイムノコンジュゲートを製造する方法を提供する。操作された抗体は診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤などの活性部分に対するコンジュゲーションのための予め決められた部位少なくとも1つを有する。一部の態様において、操作された抗体は診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤に化学量論的にコンジュゲートして薬剤の予め決められた平均負荷量とのイムノコンジュゲートを形成することができる。イムノコンジュゲートはインビボの画像化のため、および他の用途のために治療上、診断上（例えばインビトロまたはインビボで）使用できる。開示を明確化するためであって限定するものではないが、本発明の詳細な説明を以下のサブセクションに分割する。

【0059】

(操作された抗体)

1つの態様において、操作された抗体が提供される。操作された抗体は鎖間システイン残基少なくとも1つのアミノ酸置換を有しつつ、診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤へのコンジュゲーションのための鎖間システイン残基少なくとも1つを保持している。

(16)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【0060】

一部の実施形態においては、抗体はインタクトな抗体である。抗体は例えばIgG、IgA、IgM、IgDまたはIgEクラスのもの、そしてこれらのクラス内に置いて、種々のサブクラス、例えばIgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1またはIgA2のアイソタイプであり得る。例えば一部の実施形態においては、抗体はIgG、例えばIgG1、IgG2、IgG3またはIgG4であり得る。

【0061】

一部の実施形態においては、操作された抗体は別のアミノ酸で鎖間システイン残基を置き換えるアミノ酸置換少なくとも1つを含む。鎖間システイン残基は、軽鎖と重鎖との間、および／または、重鎖間の鎖間ジスルフィド結合の形成に関与することができる。即ち、アミノ酸置換は軽鎖のC_Lドメイン、重鎖のC_H1ドメインおよび／またはヒンジ領域内の鎖間システイン残基であり得る。例えば抗体cAC10を参照すれば、鎖間システイン残基はKabatのナンバリング法に従って、軽鎖のアミノ酸214位ならびに重鎖のアミノ酸位220(C_H1)および226および229(ヒンジ領域)にある(Kabatら、Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th ed. NIH, Bethesda, MD(1991))。cAC10のこれらの鎖間システイン残基の1つ以上が置換され得る。

【0062】

一部の実施形態においては、アミノ酸置換はシステイン残基に対するセリンである。一部の実施形態においては、アミノ酸置換導入はセリンまたはスレオニン残基である。一部の実施形態においては、アミノ酸置換導入はセリン、スレオニンまたはグリシン残基である。一部の実施形態においては、アミノ酸置換は中性(例えばセリン、スレオニンまたはグリシン)または親水性(例えばメチオニン、アラニン、バリン、ロイシンまたはイソロイシン)残基を導入する。一部の実施形態においては、アミノ酸置換はシステイン残基以外の天然アミノ酸を導入する。

【0063】

操作された抗体は活性部分へのコンジュゲーションのための未置換の鎖間システイン残基少なくとも1つを保持している。操作された抗体における保持されたシステイン間残基の数は0より大きいが、親(非操作)抗体の鎖間システイン残基の総数より小さい。即ち、一部の実施形態においては、操作された抗体は鎖間システイン残基少なくとも1つ、少なくとも2つ、少なくとも3つ、少なくとも4つ、少なくとも5つ、少なくとも6つまたは少なくとも7つを有する。典型的な実施形態においては、操作された抗体は鎖間システイン残基偶数個(例えば少なくとも2、4、6または8反応性部位)を有する。一部の実施形態においては操作された抗体は鎖間システイン残基8未満を有する。

【0064】

典型的な実施形態においては、鎖間システイン残基は対状態で置換され、その場合、鎖間ジスルフィド結合の形成に関与するシステイン残基両方が置換される(このような鎖間システイン残基は「相補」鎖間システイン残基と称する)。例えば、C_L鎖間システイン残基が置換される場合、相補C_H1鎖間システイン残基もまた置換される。別の例においては、ヒンジ領域の鎖間システイン残基の各対が置換されるか、または対状態で未置換のままとなり得る。別の実施形態においては、鎖間システイン残基は置換され、相補残基は未置換のままとなり得る。

【0065】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有し、且つヒンジ領域の鎖間システイン残基を保持している重鎖を含む。関連する実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはヒンジ領域の鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0066】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基のアミ

(1 7)

特表2008-521828(P2008-521828A)

ノ酸置換を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基のアミノ酸置換およびヒンジ領域の鎖間システイン残基の少なくとも1つのアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連する実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0067】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基を保持し、そしてヒンジ領域鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、このように操作された抗体のイムノコンジュゲートは C_L 鎖間システイン残基および重鎖 $C_H 1$ 鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0068】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基を保持し、そしてヒンジ領域鎖間システイン残基の少なくとも1つであるが全てよりは少ないアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、このように操作された抗体のイムノコンジュゲートは C_L 鎖間システイン残基に、重鎖 $C_H 1$ 鎖間システイン残基に、そして、残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0069】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基のアミノ酸置換、および、ヒンジ領域鎖間システイン残基の少なくとも1つにおけるアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートは C_L 鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0070】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基のアミノ酸置換、および、ヒンジ領域鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートは C_L 鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0071】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基およびヒンジ領域鎖間システイン残基を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートは $C_H 1$ 鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0072】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基を有し、そしてヒンジ領域鎖間システイン残基の少なくとも1つにおいてアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートは $C_H 1$ 鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0073】

一部の実施形態においては、操作された抗体は、各々が C_L 鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々が $C_H 1$ 鎖間システイン残基を有し、そしてヒンジ領域鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートは $C_H 1$ 鎖間システイン残基にコンジュゲートした活性部分を有する。

【0074】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換およびヒンジ領域の鎖間システイン残基を保持している重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはヒンジ領域の鎖間システイン残基にコンジュゲートした4つの活性部分を有する。

【0075】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基を保持し、そして、両方のヒンジ領域の鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、そのように操作された抗体のイムノコンジュゲートはC_L鎖間システイン残基および重鎖C_H1鎖間システイン残基にコンジュゲートした4つの活性部分を有する。

【0076】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換、および、一方のヒンジ領域の鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはC_L鎖間システイン残基およびヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした4つの活性部分を有する。

【0077】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換および一方のヒンジ領域鎖間システイン残基の置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態においては、操作された抗体のイムノコンジュゲートはヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした2つの活性部分を有する。

【0078】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換、および、両方のヒンジ領域の鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした2つの活性部分を有する。

【0079】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基、および、一方のヒンジ領域の鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはC_L鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の残存する鎖間システイン残基にコンジュゲートした6つの活性部分を有する。

【0080】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基を有する軽鎖、および、各々がC_H1鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有し、そして、両方のヒンジ領域の鎖間システイン残基を保持している重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはC_L鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の鎖間システイン残基にコンジュゲートした6つの活性部分を有する。

【0081】

親抗体が8つの鎖間システイン残基を有する例示的な実施形態においては、操作された抗体は、各々がC_L鎖間システイン残基のアミノ酸置換を有する軽鎖、および、各々がC

(19)

特表2008-521828(P2008-521828A)

H₁鎖間システイン残基および両方のヒンジ領域鎖間システイン残基を保持している重鎖を含む。関連の実施形態において、操作された抗体のイムノコンジュゲートはC_H1鎖間システイン残基に、そして、ヒンジ領域の鎖間システイン残基にコンジュゲートした6つの活性部分を有する。

【0082】

抗体はまた、抗原結合抗体フラグメント、例えば、Fab、F(ab')、F(ab')₂、Fd鎖、一本鎖Fv（例えばscFvおよびscFvFc）、一本鎖抗体、ジスルフィド連結Fv(sdFv)、V_LまたはV_Hドメインの何れかを含むフラグメント、ミニボディー、マキシボディー、F(ab')₃、またはFab発現ライブラリにより形成されるフラグメントであり得る。抗原結合抗体フラグメント、例えば一本鎖抗体は、可変領域を単独で、または以下、即ち、ヒンジ領域、C_H1、C_H2、C_H3、C_H4および/若しくはC_Lドメインの全体または一部分と組み合わせて含むことができる。さらにまた、抗原結合フラグメントはヒンジ領域、C_H1、C_H2、C_H3、C_H4および/またはC_Lドメインとの可変領域の何れかの組み合わせを含むことができる。参照により本明細書に援用されるHolligerおよびHudson, Nat. Biotechnol. 23:1126-1136(2005)を参照のこと。

【0083】

一部の実施形態においては、抗体フラグメントは鎖間システイン残基少なくとも1つを包含するドメインまたはドメインの部分少なくとも1つを含む。例えば、抗体フラグメントはヒンジ領域、C_LおよびC_H1ドメイン、C_LおよびC_H1ドメインならびにヒンジ領域等を包含することができる。

【0084】

抗体フラグメントは何れかの適切な抗体クラス（例えばIgG、IgA、IgM、IgDおよびIgE）およびサブクラス（例えばIgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1およびIgA2）のものであり得る。

【0085】

典型的には、抗体はヒト、げっ歯類（例えばマウス、ラットまたはハムスター）、ロバ、ヒツジ、ウサギ、ヤギ、モルモット、ラクダ、ウマまたはニワトリのものである。本明細書においては、「ヒト」抗体はヒト免疫グロブリンのアミノ酸配列を有する抗体を包含し、そしてヒト免疫グロブリンライブラリから、ヒトB細胞から、または、後述若しくは例えばReichert等(Nat. Biotechnol. 23:1073-8(2005))ならびに米国特許第5,939,598および第6,111,166号に記載されている通り、ヒト免疫グロブリン1つ以上に関してトランスジェニックである動物から単離された抗体を包含する。抗体は単一特異性、二重特異性、三重特異性またはそれより多重の特異性のものであってよい。

【0086】

抗体は典型的には、モノクローナル抗体であるが、モノクローナル抗体の混合物でもあり得る。対象がヒト対象である場合は、抗体は抗原に対する使用可能な免疫応答を搭載することができる何れかの動物を免疫化することにより得てよい。動物はマウス、ラット、ヤギ、イツジ、ウサギまたは他の適切な実験動物であってよい。抗原は天然に存在する免疫原またはハプテンと免疫原性担体との合成免疫原性コンジュゲートの形態で提示してよい。免疫化された動物の抗体生産細胞を「不死」若しくは「不死化」ヒトまたは動物細胞と融合させて、抗体を生産するハイブリドーマを得てよい。所望により、抗体が異なる宿主細胞において生産されるように免疫グロブリン鎖1つ以上をコードする遺伝子をクローニングしてよく、そして所望により、配列を、そしてそれゆえに生産される抗体の免疫学的特性を改変するように遺伝子を変異させてよい(Tengら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 80:7308-7312(1983); Kozborら、Immunology Today 4:72-79(1983); およびOlssonら、Meth. Enzymol. 92:3-16(1982)参照)。ヒトモノクローナル抗体は当該分野で知られた多くの手法の何れか、例えばファージディスプレイ（例えばH

(20)

特表2008-521828(P2008-521828A)

oogenboom, Nat. Biotechnol. 23:1105-16 (2005) 参照); ヒト免疫グロブリン遺伝子を発現するトランスジェニックマウス (例えば Lonberg, Nat. Biotechnol. 23:1117-25 (2005) 参照); リボソーム、mRNA およびコウボーディスプレイライブラリ (例えば Hoogenboom, 前出参照) および患者由来のヒトハイブリドーマ (Braendleinら、Histol. Histopathol. 19:897-905 (2004); および Illertら、Oncol. Rep. 13:765-70 (2005)) 並びに/または単一抗原選択リンパ球 (例えば Lagerkvistら、Biotechniques 18:862-9 (1995); および Babcookら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:7843-8 (1996) 参照) により作製してよい。

【0087】

抗体は例えば当該分野で良く知られている手法により生産されたネズミ、キメラ、ヒト化または完全ヒト型の抗体であり得る。標準的な組み換えDNA手法を用いて作成できるヒト型および非ヒト型の部分の両方を含む組み換え抗体、例えばキメラおよびヒト化モノクローナル抗体が有用な抗体である。キメラ抗体は異なる部分が異なる動物種から誘導された分子、例えばネズミモノクローナルから誘導した可変領域およびヒト免疫グロブリン定常領域を有するものである (例えば参照により全体が本明細書に援用される Cabiliy 等の米国特許第4,816,567号; および Boss 等の米国特許第4,816,397号を参照)。一部の実施形態においては、抗体軽鎖定常領域ドメインはキメラではない。一部の実施形態においては、抗体重鎖定常領域はキメラではない。これに関する場合、「キメラ」とは2つの異なる種に由来する部分よりなる定常領域または定常領域ドメインを指す。

【0088】

抗体はまた、二重特異性抗体でもあり得る。二重特異性抗体を作成するための方法は当該分野で知られている。完全長二重特異性抗体の伝統的な製造は2つの免疫グロブリンの重鎖-軽鎖の対の同時発現に基づいており、その場合、2つの鎖は異なる特異性を有する (Milsteinら、Nature 305:537-539 (1983))。二重特異性抗体を形成するための更なる詳細は、例えば Sureshら、Methods in Enzymology 121:210 (1986); Rodriguesら、J. Immunology 151:6954-6961 (1993); Carterら、Bio/Technology 10:163-167 (1992); Carterら、Hematotherapy 4:463-470 (1995); Merchantら、Nature Biotechnology 16:677-681 (1998) を参照のこと。このような手法を用いながら、疾患の治療または予防において使用するための二重特異性抗体を製造することができる。二官能性抗体はまた、欧州特許公開EPA0105360号に記載されている。ハイブリッドまたは二官能性抗体は生物学的に、即ち細胞融合の手法により、あるいは、化学的に、特に架橋剤またはジスルフィド架橋試薬を用いながら誘導することができ、そして全抗体またはそのフラグメントを含んでよい。このようなハイブリッド抗体を得るための方法は例えばともに参照により本明細書に援用される国際公開WO83/03679号および欧州特許公開EPA0217577号に開示されている。

【0089】

一部の実施形態においては、抗体の定常ドメインはエフェクター機能を有する。「抗体エフェクター機能」即ちAECという用語は本明細書においては、IgのFcドメインにより寄与される機能を指す。このような機能は、例えば、貪食作用または溶解活性を有する免疫細胞上のFc受容体にFcエフェクタードメインを結合させることにより、または、補体系の成分にFcエフェクタードメインを結合させることにより、発揮させることができる。エフェクター機能は例えば「抗体依存性細胞性細胞傷害性」即ちADCC、「抗体依存性細胞貪食作用」即ちADCP、「補体依存性細胞傷害性」即ちCDCであり得る。別の実施形態においては、定常ドメインは1つ以上のエフェクター機能を欠失している。

(2 1)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

。

【0090】

抗体は診断、予防および／または治療目的等、目的の抗原に対して指向させてよい。例えば抗原は感染性の病原体（例えば、限定しないが、ウイルス、細菌、カビおよび原虫）、寄生虫、腫瘍細胞または特定の医学的状態に関連するものであり得る。腫瘍関連抗原（TAA）の場合は、癌は免疫系、肺、結腸、直腸、乳房、卵巣、前立腺、頭部、頸部、骨または何れかの他の解剖学的位置のものであつてよい。一部の実施形態においては、抗原はCD2、CD20、CD22、CD30、CD33、CD38、CD40、CD52、CD70、HER2、EGFR、VEGF、CEA、HLA-DR、HLA-Drl0、CA125、CA15-3、CA19-9、L6、Lewis X、Lewis Y、アルファフェトプロテイン、CA242、胎盤アルカリホスファターゼ、前立腺特異的膜抗原、前立腺特異的抗原、前立腺酸性ホスファターゼ、表皮成長因子、MAGE-1、MAGE-2、MAGE-3、MAGE-4、抗トランスフェリン受容体、p97、MUC1、gp100、MART1、IL-2受容体、ヒト絨毛性ゴナドトロピン、ムチン、P21、MPGおよびNeu癌遺伝子産物である。

【0091】

一部の特定の有用な抗体は、例えば、限定しないが、BR96mAb (Trailら、Science 261:212-215 (1993))、BR64 (Trailら、Cancer Research 57:100-105 (1997))、CD40抗原に対するmAb、例えばS2C6mAb (Franciscoら、Cancer Res. 60:3225-3231 (2000))およびCD30抗原に対するmAb、例えばAC10 (Bowenら、J. Immunol. 151:5896-5906 (1993))を包含する。腫瘍特異的抗原に結合する多くの他の内在化抗体を使用することができ、そして研究されている（例えばFrankeら、Cancer Biother. Radiopharm. 15:459-76 (2000)；Murray, Semin Oncol. 27:64-70 (2000)；Breitlingら、Recombinant Antibodies, John Wiley and Sons, New York, 1998を参照のこと）。これらの参考文献の開示は参照により本明細書に援用される。

。

【0092】

一部の実施形態においては、抗原は「腫瘍特異的抗原」である。「腫瘍特異的抗原」とは本明細書においては、特定の腫瘍に特徴的な、または、そのような腫瘍に強力に相関する抗原を指す。しかしながら、腫瘍特異的抗原は必ずしも腫瘍組織に独特のものではなく、即ち腫瘍特異的抗原に対する抗体は正常組織の抗原とも交差反応する場合がある。腫瘍特異的抗原が腫瘍細胞に独特のものではない場合において、実際上は、腫瘍特異的抗原に対する抗体の結合は、交差反応に起因する保証されない危険や妨害を伴うことなく所望の手順を実施するためには十分に腫瘍細胞に特異的である場合が多い。多くの要因がこの実際上の特異性に寄与している。例えば、腫瘍細胞上の抗原の量は正常細胞上に見出される交差反応性抗原の量を遥かに超過しているか、または、腫瘍細胞上の抗原はより効果的に提示される場合がある。従って、「腫瘍特異的抗原」という用語は、本明細書においては、実際上利用される特異性に関し、そして、絶対的な特異性を指し示すことや、抗原が腫瘍に独特であること意味することは意図していない。

腫瘍関連または腫瘍特異的な抗原に対して免疫特異的な抗体をコードするヌクレオチド配列は、例えばGenBankのデータベースまたは類似のデータベース、商業的な入手元、文献出版物から、または、通常のクローニングおよび配列決定により得ることができる。

【0093】

一部の実施形態においては、抗体は自己免疫疾患の診断、治療または予防のために、抗原に対して指向される。自己免疫抗体の製造を担っている細胞の抗原に対して免疫特異的な抗体は、GenBankのデータベースまたは類似のデータベース、商業的またはその

(2 2)

特表2008-521828(P2008-521828A)

他の入手元から、または当該分野で知られた何れかの方法、例えば化学合成若しくは組み換え発現手法により得ることができる。

【0094】

一部の実施形態においては、抗体は抗核抗体；抗dsDNA；抗ssDNA；抗カルジオリビン抗体IgM、IgG；抗リン脂質抗体IgM、IgG；抗SM抗体；抗ミトコンドリア抗体；甲状腺抗体；ミクロソーム抗体；サイログロブリン抗体；抗SCL70；抗Jo；抗U1RNP；抗La/SSB；抗SSA；抗SSB；抗壁細胞抗体；抗ヒストン；抗RNP；抗CANCA；抗PANCA；抗中心体；抗フィブリラリンまたは抗GBM抗体である。

【0095】

一部の実施形態においては、抗体は標的細胞（例えば活性化リンパ球）上に発現される受容体または受容体複合体に結合することができる。受容体または受容体複合体は免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーメンバー、TNF受容体スーパーファミリーメンバー、インテグリン、サイトカイン受容体、ケモカイン受容体、主要組織適合性タンパク質、レクチンまたは補体制御タンパク質を含むことができる。適切な免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーの非限定的な例は、CD2、CD3、CD4、CD8、CD19、CD22、CD28、CD79、CD90、CD152/CTLA4、PD1およびICOSである。適切なTNF受容体スーパーファミリーメンバーの非限定的な例は、CD27、CD40、CD95/Fas、CD134/OX40、CD137/41BB、TNFR1、TNFR2、RANK、TACI、BCMA、オステオプロテゲリン、Apo2/TRAILR1、TRAILR2、TRAILR3、TRAILR4およびAPO3である。適切なインテグリンの非限定的な例は、CD11a、CD11b、CD11c、CD18、CD29、CD41、CD49a、CD49b、CD49c、CD49d、CD49e、CD49f、CD103およびCD104である。適切なレクチンの非限定的な例はC型、S型およびI型レクチンである。他の実施形態において、受容体はCD70である。

【0096】

一部の実施形態において、抗体はウイルスまたは微生物抗原に対して免疫特異的である。本明細書においては、「ウイルス抗原」という用語は、限定しないが、免疫応答を誘発することができる何れかのウイルスペプチド、ポリペプチドタンパク質（例えばHIVgp120、HIVnef、RSV糖タンパク質、インフルエンザウイルスノイラミニダーゼ、インフルエンザウイルスヘマグルチニン、HTLVtax、単純疱疹ウイルス糖タンパク質（例えばgB、gC、gDおよびgE）およびB型肝炎表面抗原）を包含する。本明細書においては、「微生物抗原」という用語は、限定しないが、免疫応答を誘発することができる何れかの微生物ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、糖類、多糖類または脂質の分子（例えば、細菌、カビ、病原性原虫またはコウボのポリペプチド、例えばLPSおよび荚膜多糖類5/8）を包含する。

【0097】

ウイルスまたは微生物抗原に免疫特異的な抗体は、市販品として、例えばBD Biosciences (San Francisco, CA)、Chemicon International, Inc (Temecula, CA) またはVector Laboratories, Inc. (Burlingame, CA) から得るか、または、または当該分野で知られた何れかの方法、例えば化学合成または組み換え発現手法により製造することができる。ウイルスまたは微生物抗原に対して免疫特異的である抗体をコードするヌクレオチド配列は、例えば、GenBankのデータベースまたは類似のデータベース、文献出版物から、または、通常のクローニングおよび配列決定により得ることができる。

【0098】

ウイルス感染症または微生物感染症の診断または治療のために有用な抗体の例は、限定しないが、ヒト化抗呼吸器シンシチウムウイルス（RSV）感染症の患者の治療のために

(2 3)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

有用なRSVモノクローナル抗体であるSYNAGIS (MedImmune, Inc., MD); HIV感染の治療に有用なCD4融合抗体であるPRO542 (Progenics Pharmaceuticals, Inc., NY); B型肝炎ウイルスの治療に有用なヒト抗体であるOSTAVIR (Protein Design Labs, Inc., CA); サイトメガロウイルス (CMV) の治療に有用なヒト化IgG1抗体であるPROTOVIR (Protein Design Labs, Inc., CA); および抗LPS抗体を包含する。

【0099】

他の抗体は、限定しないが、例えば細菌の病原性菌株 (ストレプトコッカス・ヒオゲンス、ストレプトコッカス・ニューモニア、ナイセリア・ゴノレア、ナイセリア・メニンギチジス、コリネバクテリウム・ジフテリア、クロストリジウム・ボツリナム、クロストリジウム・パーフリンゲンス、クロストリジウム・テタニ、ヘモフィルス・インフルエンザ、クレブシエラ・ニューモニア、クレブシエラ・オザエナス、クレブシエラ・リノスクレロモチス、スタフィロコッカス・アウレウス、ビブリオ・コレラ、エシェリシア・コリ、シュドモナス・アエルギノーサ、カンピロバクター (ビブリオ) フェタス、エアロモナス・ヒドロフィリア、バチルス・セレウス、エドワルドシエラ・タルダ、エルシニア・エンテロコリチカ、エルシニア・ペスチス、エルシニア・シュドツベルクロシス、シゲラ・ジセンテリア、シゲラ・フレキシネリ、シゲラ・ソネイ、サルモネラ・チフムリウム、トレボネマ・パリダム、トレボネマ・ベルテヌ、トレボネマ・カラテネウム、ボレリア・ビンセンチ、ボレリア・ブルゴドルフェリ、レプトスピラ・イクテロヘモラジエ、マイコバクテリウム・ツベルクロシス、ニューモシスティス・カリニ、フランシセラ・ツラレンシス、ブルセラ・アボルタス、ブルセラ・スイス、ブルセラ・メリテンシス、マイコプラズマ種、リケッチア・プロワゼキ、リケッチア・ツツガムシ、クラミジア種); 病原性のカビ (例えばコクシジオイデス・イミティス、アスペルギルス・フミガタス、カンジダ・アルビカンズ、ブラストミセス・デルマチチジス、クリプトコッカス・ネオホルマンズ、ヒストプラズマ・カプスラタム); 原虫 (エントモエバ・ヒストリチカ、トキソプラズマ・ゴンジ、トリコモナス・テナス、トリコモナス・ホミニス、トリコモナス・バギナリス、トリパノソマ・ガンビエンス、トリパノソマ・ロデシエンス、トリパノソマ・クルジ、レイシマニア・ドノヴァニ、レイシマニア・トロピカ、レイシマニア・ブラジリエンシス、ニューモシチス・ニューモニア、プラズモジウム・ビバックス、プラズモジウム・ファルシパラム、プラズモジウム・マラリア); または蠕虫 (エンテロビウス・ベルミクラリス、トリクリス・トリキウア、アスカリス・ルンブリコイデス、トリキネラ・スピラリス、ストロンギロイデス・ステルコラリス、スキストソマ・ジャボニカム、スキストソマ・マンソニ、スキストソマ・ヘマトビウムおよび十二指腸虫) 由来の抗原に対する抗体を包含する。

【0100】

他の抗体としては、限定しないが、病原性ウイルス、例えばボックスウイルス科、ヘルペスウイルス科、単純疱疹ウイルス1型、単純疱疹ウイルス2型、アデノウイルス科、パポウイルス科、エンテロウイルス科、ピコナウイルス科、パルボウイルス科、レオウイルス科、レトロウイルス科、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、おたふくかぜ、麻疹、呼吸器シンシチウムウイルス、風疹、アルボウイルス科、ラブドウイルス科、アレナウイルス科、A型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス、非A/非B型肝炎ウイルス、リノウイルス科、コロナウイルス科、ロトウイルス科およびヒト免疫不全ウイルスの抗原に対する抗体を包含する。

【0101】

(タンパク質をコードする核酸配列を改変することにより抗体にアミノ酸置換を導入するための方法)

アミノ酸置換は何れかの適切な方法により抗体をコードする核酸配列内に導入することができる。このような方法はポリメラーゼ連鎖反応系の変異誘発、部位特異的変異誘発、合成DNAオリゴマーを用いたポリメラーゼ連鎖反応による遺伝子合成、および核酸合成

(24)

特表2008-521828(P2008-521828A)

、ならびに、その後の適宜重鎖および／または軽鎖の他の部分を含む、発現ベクターへの合成DNAのライゲーションを包含する（前出のSambrook等およびAusubel等を参照のこと）。

【0102】

抗体をコードするヌクレオチド配列は例えばGenBankのデータベース若しくは類似のデータベース、文献出版物から、または、通常のクローニングおよび配列決定により得ることができる。指向された変異誘発のために使用できる一部の方法の例は、M13DNAを用いたオリゴヌクレオチド指向変異誘発、プラスミドDNAを用いたオリゴヌクレオチド指向変異誘発、および、PCR増幅オリゴヌクレオチド指向変異誘発である（例えばGlickら、Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA, Second Edition, ASM Press, 171-182頁（1998）参照。変異誘発およびクローニングの例は実施例1に記載する。

【0103】

オリゴヌクレオチド指向変異誘発の詳細なプロトコルおよびクローニングされたDNAの変異誘発のための関連する手法は当該分野で良く知られている（例えばZollerおよびSmith, Nucleic Acids Res. 10:6487-6500（1982）参照；また前出のSambrook等およびAusubel等を参照）。

【0104】

一部の実施形態においては、アミノ酸置換はシステイン残基に対するセリンである。一部の実施形態においては、アミノ酸置換導入はセリンまたはスレオニン残基である。一部の実施形態においては、アミノ酸置換は中性（例えばセリン、スレオニンまたはグリシン）または親水性（例えばメチオニン、アラニン、バリン、ロイシンまたはイソロイシン）残基を導入する。一部の実施形態においては、アミノ酸置換はシステイン残基以外の天然のアミノ酸を導入する。

【0105】

本発明は抗体または抗体フラグメント内に鎖間システイン残基のアミノ酸置換（例えばシステインからセリンへの置換）を導入するための方法を提供するが、本発明はそれに限定されない。当業者の知る通り、コンジュゲーションのために他のアミノ酸、例えばリジン残基を抗体または抗体フラグメントの別の位置において導入／除去することも可能である。さらにまた、スルフィドリル基を鎖間システイン残基以外のアミノ酸において抗体内に組み換え導入することもできる。コンジュゲーションのための別の代替変異誘発部位は当該分野で良く知られている分子モデリング手法を用いて識別することができる。例えばLesk等“Antibody Structure and Structural Predictions Useful in Guiding Antibody Engineering”, Antibody Engineering: A Practical Guide, C. Borrebaeck (ed.), W. H. Freeman and Company, pp. 1-38 (1992); Cheetham, “Engineering Antibody Affinity”, Antibody Engineering: A Practical Guide (前出), 39-67頁を参照のこと。一般的には、部位指向性変異誘発のための方法に関しては、Sambrookら、Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed, Cold Spring Harbor Publish, Cold Spring Harbor, New York (2001); Ausubelら、Current Protocols in Molecular Biology, 4th ed., John Wiley and Sons, New York (1999)（これら全ては参照により本明細書に援用される）を参照のこと。

【0106】

（操作された抗体のDNA配列のタンパク質産物を発現させ単離するための方法）

（A. 操作された抗体を発現させる方法）

(2 5)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

ヌクレオチド配列を改変した後、核酸配列のコンホーメーション等をさらに分析するためにクローニングベクター内に核酸を挿入する。核酸によりコードされるポリペプチドを発現するためには、発現ベクター内の転写発現を制御する調節配列に核酸を作動可能に連結し、そして次に、原核生物または真核生物の宿主細胞に導入することができる。プロモーターおよびエンハンサーなどの転写調節配列のほかに、発現ベクターは翻訳調節配列および／または発現ベクターを含有する細胞の選択に適するマーカー遺伝子を包含してよい。

【0107】

原核生物宿主内での発現のためのプロモーターは抑制、構成または誘導のものであり得る。適切なプロモーターは当該分野で良く知られており、そして例えばT4、T3、Sp6およびT7ポリメラーゼに対するプロモーター、バクテリオファージラムダのP_RおよびP_Lプロモーター、大腸菌のtrp、recA、熱ショックおよびlacZプロモーター、B・サブチルスのアルファアミラーゼおよびシグマ₂₈特異性プロモーター、バチルス・バクテリオファージのプロモーター、ストレプトマイセスプロモーター、バクテリオファージラムダのintプロモーター、pBR322のベータラクタマーゼ遺伝子のbla_pプロモーター、ならびに、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子のCATプロモーターを包含する。原核生物プロモーターはGlick, J. Ind. Microbiol. 1:227-282 (1987); Watsonら, Molecular Biology Of The Gene, Forth Edition, Benjamin Cummins (1987); Ausubel等 (前出); および Sambrook等 (前出) により検討されている。

【0108】

一部の実施形態においては、原核生物宿主は大腸菌である。大腸菌の適切な菌株は例えばY1088、Y1089、CSH18、ER1451およびER1647を包含する (例えばBrown (Ed.), Molecular Biology Labfax, Academic Press (1991) 参照)。代替となる宿主はバチルス・サブチルス、例えばBR151、YB886、MI119、MI120およびB170などの菌株である (例えばHardy, "Bacillus Cloning Methods", in DNA Cloning: A Practical Approach, Glover (Ed.), IRL Press (1985) 参照)。

【0109】

大腸菌中で抗体フラグメントを生産するための方法は当該分野で良く知られている。例えば、Huse, "Combinatorial Antibody Expression Libraries in Filamentous Phage", in Antibody Engineering: A Practical Guide, C. Borrebaeck (ed.), W. H. Freeman and Company, 103-120頁 (1992); Ward, "Expression and Purification of Antibody Fragments Using Escherichia coli as a Host" 同上, 121-138頁 (1992) を参照のこと。Fvフラグメントもまた当該分野で知られた方法により生産できる。例えば上記を参照のこと。またさらにWhitlowら, "Single-Chain Fv Proteins and their Fusion Protein", New Techniques In Antibody Generation, Methods 2 (2) (1991) も参照のこと。さらにまた、原核生物細胞において抗体をクローニングするための特定の発現系が市販されている。

【0110】

一部の実施形態においては、核酸配列は真核生物細胞、そして特に哺乳類、昆虫およびコウボ細胞内において発現させる。1つの実施形態において、真核生物宿主は哺乳類細胞である。哺乳類細胞は適切な折り畳みおよびグリコシル化を含む、クローニングされたポリペプチドへの翻訳後の修飾を提供する。例えばこのような哺乳類宿主細胞は、COS-

(26)

特表2008-521828(P2008-521828A)

7細胞(例えばATCC CRL1651)、非分泌型ミエロマ細胞(例えばSP2/0-AG14; ATCC CRL1581)、チャイニーズハムスター卵巢細胞(例えばCHO-K1、ATCC CCL61; CHO-DG44、Urlaubら、*Somatic Cell Mol Genet.* 12(6):555-66(1986))、ラット下垂体細胞(例えばGH₁; ATCC CCL82)、HeLaS3細胞(例えばATCC CCL2.2)およびラット肝細胞癌細胞(例えばH-4-II-E; ATCC CRL1548)を包含する。

【0111】

哺乳類宿主については、転写および翻訳の調節シグナルは種々の原料、例えばアデノウイルス、ウシ乳頭腫ウイルスおよびシミアンウイルスから誘導してよい。さらに、アクチン、コラーゲンまたはミオシンなどの哺乳類細胞由来のプロモーターも使用できる。あるいは、原核生物プロモーター(例えばバクテリオファージT3RNAポリメラーゼプロモーター)を使用することができ、その場合、原核生物プロモーターは真核細胞プロモーターにより調節される(例えば、Zhouら、*Mol. Cell. Biol.* 10:4529-4537(1990); Kaufmanら、*Nucl. Acids Res.* 19:4485-4490(1991)を参照のこと)。遺伝子の発現がモジュレートできるように抑制または活性化を可能にする転写開始調節シグナルを選択してよい。

【0112】

一般的に、真核生物調節領域はRNA合成の開始を指向するために十分なプロモーター領域を包含することになる。このような真核生物プロモーターは例えばマウスメタロチオンインI遺伝子のプロモーター(Hamerら、*J. Mol. Appl. Gen.* 1:273-288(1982));ヘルペスウイルスのTKプロモーター(McKnight, *Cell* 31:355-365(1982));SV40早期プロモーター(Benoistら、*Nature (London)* 290:304-310(1981));ラウス肉腫ウイルスプロモーター((Gorman, "High Efficiency Gene Transfer into Mammalian cells", in *DNA Cloning: A Practical Approach*, Volume I, Glover (Ed.), IRL Press, 143-190頁(1985));サイトメガロウイルスプロモーター(Foeckingら、*Gene* 45:101(1980));コウボガ14遺伝子プロモーター(Johnstonら、*Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 79:6971-6975(1982); Silverら、*Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 81:5951-5955(1984));およびIgGプロモーター(Orlandiら、*Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86:3833-3837(1989))であり得る。

【0113】

強力な調節配列を使用できる。そのような調節配列の例はSV40プロモーター-エンハンサー(Gorman, "High Efficiency Gene Transfer into Mammalian cells", in *DNA Cloning: A Practical Approach*, Volume I, Glover (Ed.), IRL Press, 143-190頁(1985));hCMV-MIEプロモーター-エンハンサー(Bebbingtonら、*Bio/Technology* 10:169-175(1992))、チャイニーズハムスターEF-1 α プロモーター(例えば米国特許第5,888,809号参照)および抗体重鎖プロモーター(Orlandiら、*Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86:3833-3837(1989))を包含する。同様に包含されるものは、軽鎖の発現のためのカッパ鎖エンハンサーおよびIgHエンハンサーである(Gillies, "Design of Expression Vectors and Mammalian Cell Systems Suitable for Engineered Antibodies", in *Antibody Engineering: A Practical Guide*, C. Borrebaeck (Ed.), W. H. Freeman and Company

(2 7)

特表2008-521828(P2008-521828A)

， 1 3 9 - 1 5 7 頁 (1 9 9 2) ; O r l a n d i ら、前出)。

【0114】

操作された抗体コード核酸および作動可能に連結したプロモーターは直鎖分子または環状分子の何れかであってよい非複製DNA分子として真核生物細胞内に導入してよい。そのような分子は自律的に複製できないため、タンパク質の発現は導入された配列の一過性の発現を介して起こってよい。1つの態様において、永久的な発現は宿主染色体内への導入された配列の組み込みを介して起こる。

【0115】

一部の実施形態においては、導入された核酸はレシピエント宿主内で自律複製が可能なプラスミドまたはウイルスベクターに取り込まれる。この目的のために多くの可能なベクター系が利用可能である。ベクターの1つのクラスはウシ乳頭腫ウイルス、ポリオマウイルス、アデノウイルスまたはSV40ウイルスなどの動物ウイルスから誘導した自律複製染色体外プラスミドを与えるDNAエレメントを利用する。ベクターの第2のクラスは宿主染色体内への所望のゲノムまたはcDNA配列の組み込みに依存している。mRNAの最適な合成のためには別のエレメントが必要となる場合もある。これらのエレメントにはスプライシングシグナルならびに転写プロモーター、エンハンサーおよび終止シグナルが含まれる。このようなエレメントを取り込んだcDNA発現ベクターはOkayama, Mol. Cell. Biol. 3:280 (1983), Sambrookら、前出、Ausubelら、前出、Bebbingtonら、前出、Orlandiら、前出、Fouserら、Bio/Technology 10:1121-1127 (1992); およびGillies, 前出により記載されているものを包含する。イントロン配列を含むゲノムDNA発現ベクターはOrlandiら、前出に記載されている。さらに一般的にLerner等 (Eds.), New Techniques In Antibody Generation, Methods 2 (2) (1991) も参照のこと。

【0116】

インタクトな抗体を発現する哺乳類細胞を得るためには、抗体軽鎖をコードする核酸を含む発現ベクターを抗体重鎖発現ベクターと共に哺乳類細胞内に同時トランスフェクトまたはトランスフェクトすることができる。あるいは、重鎖発現ベクターを含有する哺乳類細胞を抗体軽鎖発現ベクターでトランスフェクトすることができ、あるいは、抗体軽鎖発現ベクターを含有する哺乳類細胞を抗体重鎖発現ベクターでトランスフェクトすることができる。さらに、哺乳類細胞は抗体軽鎖をコードする核酸 (例えばDNA) フラグメントならびに抗体重鎖をコードする核酸 (例えばDNA) フラグメントを含む単一の発現ベクターでトランスフェクトすることができる。例えばGillies前出; Bebbingtonら、前出を参照できる。これらの方策の何れも全体の操作された抗体分子を発現するトランスフェクトされた細胞を生成する。標準的なトランスフェクションおよび形質転換の手法は当該分野で良く知られている。例えばSambrookら、前出、Ausubelら、前出を参照できる。

【0117】

細胞系統の開発およびタンパク質発現の例は実施例1に記載する。

【0118】

(B. トランスフェクトされた細胞から操作された抗体を単離するための方法)

発現ベクターを担持する形質転換またはトランスフェクトされた細胞は適切な薬剤を使用しながら選択される。例えば、G418はアミノグリコシドホスホトランスフェラーゼ遺伝子を有する発現ベクターを担持するトランスフェクトされた細胞を選択するために使用できる (例えばSouthernら、J. Mol. Appl. Gen. 1:327-341 (1982) 参照)。あるいは、ハイグロマイシン-Bを用いて、ハイグロマイシンBホスホトランスフェラーゼ遺伝子を有する発現ベクターを担持するトランスフェクトされた細胞を選択することができる (例えばPalmerら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84:1055-1059 (1987) 参照)。アミノプテリンおよびマイコフェノール酸を用いて、キサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラー

(28)

特表2008-521828(P2008-521828A)

ゼ遺伝子を有する発現ベクターを担持するトランスフェクトされた細胞を選択することができる(例えばMulliganら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:2072-2076(1981)参照)。メトトレキセートを用いてジヒドロフォレート還元酵素遺伝子を有する発現ベクターを担持するトランスフェクトされた細胞を選択することができる(例えばWiglerら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77(6):3567-70(1980)参照)。

【0119】

操作された抗体を生産する形質転換またはトランスフェクトされた細胞は種々の方法を用いて識別することができる。例えば、何れかの免疫検出試験を用いてこのような「トランスフェクトーマ」を識別することができる。

【0120】

形質転換体またはトランスフェクト体が識別された後、細胞を培養し、抗体を細胞および/または培養上澄みから単離する。単離の手法はプロテインAセファロースを用いたアフィニティークロマトグラフィー、サイズエクスクルージョンクロマトグラフィー、およびイオン交換クロマトグラフィーを包含する。詳細なプロトコルについては例えばColligan等(eds.), Current Protocols In Immunology, John Wiley and Sons(1991)を参照のこと。

【0121】

(イムノコンジュゲートを製造するための方法)

(A. 抗体フラグメントの製造)

本発明はまた、操作された抗体または抗原結合抗体フラグメント由来のイムノコンジュゲートを提供する。抗体フラグメントは例えば組み換え宿主細胞(例えば形質転換体またはトランスフェクト体)から、および/または、インタクトな操作された抗体の蛋白分解切断により得ることができる。抗体フラグメントは変異されている重鎖構造遺伝子で細胞をトランスフェクトすることにより、形質転換体またはトランスフェクト体から直接得ることができる。例えば、 C_H1 ドメインの配列の後に停止コドンが挿入されれば、トランスフェクトーマはFabフラグメントを生産できる。あるいは、重鎖のヒンジ領域をコードする配列の後に停止コドンが挿入されれば、トランスフェクトーマはFab' またはF(ab')₂フラグメントを生産できる。

【0122】

あるいは、抗体フラグメントはよく知られた蛋白分解の手法を用いてインタクトな抗体から製造できる。例えばColliganら、前出を参照できる。さらに、F(ab')₂フラグメントはインタクトな抗体のペプシン消化を用いて得ることができる。2価のフラグメントは従来のジスルフィド結合還元剤、例えばジチオスレイトール(DTT)等を用いて分解することにより1価のフラグメントにすることができる。

【0123】

(B. コンジュゲーション方法)

広範な種類の診断、予防および治療薬剤を本発明の抗体に好都合にコンジュゲートすることができる。一部の実施形態においては、抗体を化学量論的に、即ち完全に負荷することができる(即ちC# = Y、ここでYは各抗体分子に結合した活性部分の平均数を指す)。他の実施形態においては、抗体を部分的に負荷することができる(即ちC# > Y)。

【0124】

イムノコンジュゲートは診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤をインタクトな抗体またはその抗原結合フラグメントにコンジュゲートすることにより製造できる。このような手法は、Shihら、Int. J. Cancer 41:832-839(1988); Shihら、Int. J. Cancer 46:1101-1106(1990); Shih等の米国特許第5,057,313号; Shih Cancer Res. 51:4192, 国際公開WO02/088172号; 米国特許第6,884,869号; 国際特許公開WO2005/081711号; および米国特許出願2003-0130189A1に記載されており、これらは全て参照により本明細書に援用される。

(2 9)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

【0125】

さらに、当業者の認知する通り、コンジュゲーション方法には種々の可能な変法があり得る。例えば「2 価のイムノコンジュゲート」は診断または治療薬剤を炭水化物部分に、または、遊離のスルフィドリル基に結合することにより構築することができる。

【0126】

一部の実施形態においては、鎖間システイン残基はシステイン残基のチオール（—S H）側鎖基の酸化の結果としてジスルフィド結合として存在する。ジスルフィド結合を還元剤で処理することによりジスルフィド結合の還元的開裂が起こり、遊離のチオール基が残存する。

【0127】

一部の実施形態においては、薬剤は鎖間システイン残基と反応性を有する基を有するか、それを含むように修飾される。例えば、薬剤はチオール基へのコンジュゲーションにより結合できる。コンジュゲーションのために使用できる化学物質の例は、例えば Current Protocols in Protein Science (John Wiley & Sons, Inc)、Chapter 15 (Chemical Modification of Proteins) を参照のこと（この開示内容は参照により全体が本明細書に援用される）。

【0128】

例えば、抗体の化学的活性化が遊離のチオール基の形成をもたらす場合、タンパク質はスルフィドリル反応性の薬剤とコンジュゲートしてよい。一部の実施形態においては、薬剤は遊離のチオール基に対して実質的に特異的なものである。このような薬剤は例えばマレイミド、ハロアセトアミド（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ハロエステル（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ハロメチルケトン（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ベンジル性ハロゲン化物（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ビニルスルホンおよびビリジルチオを包含する。

【0129】

特定の実施形態においては、スルフィドリル反応性薬剤はアルファハロアセチル化合物、例えばヨードアセトアミド、マレイミド、例えばN-エチルマレイミド、水銀誘導体、例えばアセテート、クロリドまたはニトレートの対イオンを有する3, 6-ビス（水銀メチル）ジオキサン、および、ジスルフィド誘導体、例えばジスルフィドジオキサン誘導体、ポリメチレンビスメタンチオスルホネート試薬およびクラベセイン（還元された抗体の交差ジスルフィド結合を付加することがわかっている2つの遊離スルフィドリル基を含有するフルオレセインの蛍光誘導体）であり得る。

【0130】

アルファハロアセチル化合物、例えばヨードアセテートは、スルフィドリル基と容易に反応してアミドを形成する。これらの化合物を用いて遊離チオールをカルボキシメチル化している。それらは厳密にはSH特異的ではなく、アミンと反応する。反応にはチオレートの親核攻撃が含まれ、ハライドの置き換えが起こる。反応性のハロアセチル部分、X—CH₂CO—は種々の目的のために化合物に取り込まれている。例えば、プロモトリフルオロアセトンF-19の取り込みのために使用されており、そしてN-クロロアセチルヨードトリアミンはタンパク質への放射性ヨウ素の導入のために使用されている。

【0131】

マレイミド、例えばN-エチルマレイミドは特に他の基がプロトン化される7未満のpH値においてスルフィドリル基に顕著な特異性を示すと考えられる。チオールはマレイミドとマイケル反応を起こし、二重結合への付加物のみを与える。形成されるチオエーテル結合は極めて安定である。それらはまた、アミノおよびイミダゾリル基とも遅かに緩徐な速度において反応する。例えばpH7においては、単純なチオールとの反応は相当するアミンに対するよりも約1000倍高速に起こる。反応に伴う300nm領域の特徴的な吸光度の変化は反応をモニタリングするための好都合な方法を与える。これらの化合物は低pHにおいて安定であるが、高pHでは加水分解を受けやすい。一般的には、Wong,

(30)

特表2008-521828(P2008-521828A)

Chemistry of Protein Conjugation and Cross-linking; CRC Press, Inc., Boca Raton, 1991: Chapters 2 and 4を参照のこと。

【0132】

スルフィドリルとは元来反応性ではない薬剤（例えば薬品）もなお、薬剤と反応性の基およびスルフィドリル反応性の基の両方を担持した二官能性の架橋剤を用いることにより、化学的に活性化された抗体にコンジュゲートしてよい。架橋剤は目的の分子と（例えばアミノ、カルボキシまたはヒドロキシ基を介して）、そして化学的に活性化されたタンパク質と同時に反応してよく、あるいは、それを用いて目的の分子を誘導体化することにより相手分子を形成し、次にこれが薬剤から誘導した部分によりスルフィドリル反応性となってよく、あるいは、それを用いることにより化学的に活性化されたタンパク質が目的分子と反応性となるように誘導体化してよい。

【0133】

薬剤はまたリンカーにより抗体に連結できる。適切なリンカーは例えば切断可能、または非切断可能なリンカーを包含する。切断可能なリンカーは典型的には細胞内条件下の切断を受けやすいものである。適切な切断可能なリンカーは例えばリソソームプロテアーゼまたはエンドソームプロテアーゼなどの細胞内プロテアーゼにより切断可能なペプチドリナーを包含する。例示的な実施形態においては、リンカーはジペプチドリナー、例えばバリン-シトルリン (val-cit) またはフェニルアラニン-リジン (phe-lys) リンカーであり得る。他の適切なリンカーは5.5未満のpHで加水分解可能なリンカー、例えばヒドラゾンリンカーを包含する。別の適切な切断可能なリンカーはジスルフィドリナーを包含する。

【0134】


リンカーは抗体への連結のための基を包含できる。例えばリンカーはスルフィドリル反応性の基（例えばマレイミド、ハロアセトアミド（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ハロエステル（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ハロメチルケトン（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ベンジル性ハロゲン化物（例えばヨード、ブロモまたはクロロ）、ビニルスルホンおよびピリジルチオ）を包含できる。一般的には、Wong, Chemistry of Protein Conjugation and Cross-linking; CRC Press, Inc., Boca Raton, 1991を参照のこと。

【0135】

特定の実施形態においては、イムノコンジュゲートは下記の式：

【0136】

【化12】



を有するか、または薬学的に受容可能なその塩または溶媒和物であり、ここで、

Abは抗体であり、

Aはストレッチャー単位であり、

aは0または1であり、

各Wは独立してリンカー単位であり、

wは0～12の整数であり、

Yはスペーサー単位であり、

yは0、1または2であり、

pは1～約20の範囲であり、そして、

Dは診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤であり、そして、

zはタンパク質上の所定のコンジュゲーション部位の数である。

【0137】

(3 1)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

抗体が完全に負荷されている場合、 $p = z$ である。抗体が部分的に負荷されている場合は $p < z$ である。一部の実施形態においては、 p は偶数である。特定の実施形態においては、 $p = 2, 4, 6$ または 8 である。特定の実施形態においては、 $p = z = 4$ である。別の実施形態においては、 $0 < p < 8$ である。

【0138】

ストレッチャー単位は抗体にリンカー単位を連結することができる。ストレッチャー単位は抗体の鎖間システイン残基と結合を形成できる官能基である。有用な官能基は限定しないが上記したスルフィドリル反応性基を包含する。

【0139】

リンカー単位は典型的にはアミノ酸単位、例えばジペプチド、トリペプチド、テトラペプチド、ペンタペプチド、ヘキサペプチド、ヘプタペプチド、オクタペプチド、ノナペプチド、デカペプチド、ウンデカペプチドまたはドデカペプチドである。リンカー単位は細胞内で切断可能または非切断可能である。

【0140】

1つの実施形態において、アミノ酸単位はバリンーシトルリンである。別の実施形態において、アミノ酸単位はフェニルアラニンーリジンである。さらに別の実施形態において、アミノ酸単位はN-メチルバリンーシトルリンである。さらに別の実施形態において、アミノ酸単位は5-アミノ吉草酸、ホモフェニルアラニンリジン、テトライソキノリンカルボキシレートリジン、シクロヘキシルアラニンリジン、イソネペコチック酸リジン、ベータアニリンリジン、グリシンセリンバリングルタミンおよびイソネペコチック酸である。特定の実施形態においては、アミノ酸単位は天然のアミノ酸を含み得る。別の実施形態においては、アミノ酸単位は非天然のアミノ酸を含む。

【0141】


スペーサー単位は、存在する場合は、リンカー単位をDに連結する。あるいは、スペーサー単位は、リンカー単位が存在しない場合に、ストレッチャー単位を薬剤部分に連結することができる。スペーサー単位はまた、リンカー単位とストレッチャー単位との両方が存在しない場合に、抗体に診断、予防および治療薬剤を連結することができる。1つの実施形態において、スペーサー単位はp-アミノベンジルアルコール (PAB) 単位、p-アミノベンジルーテル単位、またはp-アミノベンジルカルバモイル単位である (例えば米国特許公開第2003-0130189号を参照のこと)。

【0142】

一部の実施形態においては、イムノコンジュゲートは下記の式を有する：

【0143】

【化13】



ここで、 R^{17} は $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-、 $-\text{C}_3-\text{C}_8$ カルボシクロ-、 $-\text{O}(\text{C}_1-\text{C}_8\text{アルキル})-$ 、 $-\text{アリーレン-}$ 、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-アリーレン-、 $-\text{アリーレン-}\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン- $(\text{C}_3-\text{C}_8\text{カルボシクロ})-$ 、 $-(\text{C}_3-\text{C}_8\text{カルボシクロ})-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-、 $-\text{C}_3-\text{C}_8$ ヘテロシクロ-、 $-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン- $(\text{C}_3-\text{C}_8\text{ヘテロシクロ})-$ 、 $-(\text{C}_3-\text{C}_8\text{ヘテロシクロ})-\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキレン-、 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_r-$ および $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_r-\text{CH}_2-$ から選択される。一部の実施形態においては、 R^{17} は $-(\text{CH}_2)_5-$ または $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_r-\text{CH}_2-$ であり、 r は2である。

【0144】


(3 2)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

別の実施形態において、イムノコンジュゲートは下記の式を有する：

【0145】

【化14】







ここで、 R^{17} は上記の通り定義される。

【0146】

別の実施形態において、イムノコンジュゲートは下記の式のうちの1つを有する：

【0147】

【化15】



【0148】

最終的なイムノコンジュゲートは従来の手法、例えばセファクリルS-300上のサイジングクロマトグラフィー、プロテインAまたはプロテインGセファロースなどのアフィニティークロマトグラフィー等を用いて精製してよい。

【0149】

タンパク質の精製およびコンジュゲーションの例を実施例1および2において記載する。

【0150】

(診断および治療のためのイムノコンジュゲートの使用)

(3 3)

特表2008-521828(P2008-521828A)

(A. 診断のためのイムノコンジュゲートの使用)

イムノコンジュゲートは診断画像化のために使用できる。例えばイムノコンジュゲートは放射線標識モノクローナル抗体であり得る。例えばSrivastava(ed.), *Radiolabeled Monoclonal Antibodies For Imaging And Therapy*, Plenum Press(1988); Chase, "Medical Applications of Radioisotopes", in Remington's *Pharmaceutical Science*, 18th Edition, Gennaro等(eds.), Mack Publishing Co., 624-652頁(1990); Brown, "Clinical Use of Monoclonal Antibodies", in *Biotechnology and Pharmacy*, Pezzuto等(eds.), Chapman and Hall, 227-249頁(1993)を参照できる。イムノシンチグラフィーとしても知られているこの手法は、モノクローナル抗体にコンジュゲートしたガンマ線発射放射性同位体の位置を検出するためにガンマカメラを使用している。診断画像化は癌、自己免疫疾患、感染症および／または心臓血管疾患を診断するために使用できる(例えばBrown, 前出を参照)。

【0151】

一例において、イムノコンジュゲートは心臓血管疾患を診断するために使用できる。例えば、抗ミオシン抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートは、急性心筋梗塞に伴う心筋壊死を画像化するために使用できる。血小板またはフィブリンに結合する抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートは、深静脈血栓を画像化するために使用できる。さらに、活性化血小板に結合する抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートはアテローム性動脈硬化症のプラークを画像化するために使用できる。

【0152】

イムノコンジュゲートはまた、感染性疾患の診断において使用できる。例えば、特定の細菌抗原に結合する抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートは、膿瘍の位置特定のために使用できる。さらに、顆粒球および炎症性白血球に結合する抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートは、細菌感染症の部位を特定するために使用できる。

【0153】

多くの研究が癌のシンチグラフィー検出のためのモノクローナル抗体の使用を評価している。例えば前出Brownを参照のこと。研究対象は黒色腫、結腸直腸癌、卵巣癌、乳癌、肉腫および肺癌などの固形腫瘍の主要な型を包含する。即ち、本発明はまた、癌を検出するための腫瘍マーカーに結合する抗体フラグメントを含むイムノコンジュゲートを用いる癌の検出を意図している。このような腫瘍マーカーの例は、癌胎児性抗原、アルファフェトプロテイン、癌遺伝子産物、腫瘍関連細胞表面抗原、および、壊死関連細胞内抗原、ならびに後述する腫瘍関連抗原および腫瘍特異的抗原を包含する。

【0154】

診断のほかに、モノクローナル抗体画像化は治療応答をモニタリングし、疾患の再発を検出し、そして、後の臨床判断の指針とするために使用できる。

【0155】

診断およびモニタリング目的のためには、放射性同位体を直接、または中間的官能基を用いて間接的に、抗体フラグメントに結合してよい。このような中間的官能基には例えばDTPA(ジエチレントリアミン5酢酸)およびEDTA(エチレンジアミン4酢酸)が包含される。患者に送達される放射線の線量は典型的には可能な限り低水準に維持する。これは検出および正確な測定を可能にする最小限の半減期、最小限の体内保持時間、および、最小限の同位体量の最良の組み合わせとなるように同位体を選択することにより達成できる。抗体に結合することができ、そして診断画像化に適切な放射性同位体の例は、 ^{99m}Tc および ^{111}In を包含する。

【0156】

研究によれば、抗体フラグメント、特にFabおよびFab' が適切な腫瘍/バックグ

(3 4)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

ラウンド比を与えるとされる（例えば前出Brown参照）。

【0157】

イムノコンジュゲートはまた、インビボの診断の目的のために常磁性イオンで標識できる。磁気共鳴画像化のために特に有用な元素はGd、Mn、DyおよびFeイオンである。

【0158】

イムノコンジュゲートはインビトロの特定の抗原の存在を検出することもできる。そのような免疫試験において、イムノコンジュゲートは液相中で使用するか、または、固相担体に結合させてよい。例えば、重合体コーティングビーズ、プレートまたはチューブなどの不溶性の支持体に抗体成分を連結するためには、アミノデキストランなどの重合体にインタクトな抗体、または、その抗原結合フラグメントを結合することができる。

【0159】

あるいは、イムノコンジュゲートは、組織学的標本から調製した組織切片における特定の抗原の存在を検出するために使用できる。このようなインサイチュの検出は例えば検出可能に標識されたイムノコンジュゲートを組織切片に適用することにより達成できる。インサイチュ検出は特定の抗原の存在を調べるため、および、検査組織における抗原の分布を調べるために使用できる。インサイチュ検出の一般的手法は当該分野で良く知られている（例えばPonder, "Cell Marking Techniques and Their Application", in Mammalian Development: A Practical Approach, Monk (ed.), IRL Press, 115-138頁（1987）; Coliganら、前出参照）。

【0160】

酵素、蛍光化合物、電子転移剤等の検出可能な標識は、当該分野で良く知られている従来の方法により担体に連結できる。これらの標識された担体およびそれから製造されたイムノコンジュゲートは、抗体コンジュゲートが抗体への標識の直接の結合により製造できるが、インビトロ免疫試験およびインサイチュ検出のために使用できる。複数の標識によるイムノコンジュゲートの負荷は免疫試験または組織学的手順の感度を上昇させることができ、その場合、標的抗原への抗体または抗体フラグメントの結合を低値とすることができる。

【0161】

（B. 治療のためのイムノコンジュゲートの使用）

イムノコンジュゲートを用いてウイルスおよび細菌の感染性疾患、心臓血管疾患、自己免疫疾患および癌を治療することができる。そのような治療の目的は非標的組織への曝露を最小限にしながら、標的細胞に活性剤（例えば放射線、毒素または薬剤）の細胞傷害性または細胞増殖抑制用量を送達することである。

【0162】

放射性同位体は直接、または、キレート形成剤を介して間接的に、インタクトな抗体またはその抗原結合フラグメントに結合できる。例えば ^{67}Cu は、キレート形成剤p-ブロモアセトアミドベンジルテトラエチルアミン4酢酸（TETA）を用いて抗体成分にコンジュゲートできる（例えば前出のChase参照）。

【0163】

さらに、イムノコンジュゲートは治療薬剤が毒素または薬剤であるように製造できる。そのようなイムノコンジュゲートの製造のための有用な毒素はリシン、アブリン、アメリカマゴボウ抗ウイルスタンパク質、ゲロニン、ジフテリン毒素およびシュードモナス内毒素を包含する。イムノコンジュゲートを製造するための有用な化学療法剤は、オーリスチン、ドラスタチン、MMAE、MMAF、AFP、AEB、ドキソルビシン、ダウノルビシン、メトトレキセート、メルフェリン、クロラムブシル、ビンカルカロイド、5-フルオロウリジン、マイトマイシン-C、タキソール、L-アスパラギナーゼ、メルカプトプリン、チオグアニン、ヒドロキシ尿素、シタラビン、シクロホスファミド、イフォスファミド、ニトロソ尿素、シスプラチン、カルボプラチン、マイトマイシン、ダカルバ

(3 5)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

ジン、プロカルバジン、トボテカン、ナイトロジェンマスタード、シトキサン、エトボシド、BCNU、イリノテカン、カンプトテシン、ブレオマイシン、イダルビシン、ダクチノマイシン、プリカマイシン、ミトキサントロン、アスパラギナーゼ、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンレルビン、パクリタキセルおよびドセタキセルならびにこれらの塩、溶媒和物および誘導体を包含する。他の適切な薬剤は、検出可能な標識、例えば蛍光分子、または、細胞傷害性剤、例えば重金属若しくは放射性核種を複合体化することができるキレート形成剤、例えばDTPA；および毒素、例えばシェードモナス内毒素等を包含する。

【0164】

一部の実施形態においては、診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤はオーリスタチンE（ドラスタチン-10としても知られている）またはその誘導体、ならびに、薬学的に受容可能なその塩または溶媒和物である。典型的には、オーリスタチンE誘導体は、例えばオーリスタチンEとケト酸との間に形成したエステルである。例えばオーリスタチンEをパラアセチル安息香酸またはベンゾイル吉草酸と反応させることによりそれぞれAEBおよびAEVBを生成することができる。他の典型的なオーリスタチンE誘導体はAFP、MMAFおよびMMAEを包含する。オーリスタチンEおよびその誘導体ならびにリンカーの合成および構造は米国特許第09/845,786号（米国特許出願公開第20030083263号）、米国特許出願公開第2005-0238629号；国際特許出願PCT/US03/24209号；国際特許出願PCT/US02/13435号；国際特許出願PCT/US02/13435号；国際特許公開WO04/073656号；および米国特許第6,884,869号；第6,323,315号；第6,239,104号；第6,214,345号；第6,034,065号；第5,780,588号；第5,665,860号；第5,663,149号；第5,635,483号；第5,599,902号；第5,554,725号；第5,530,097号；第5,521,284号；第5,504,191号；第5,410,024号；第5,138,036号；第5,076,973号；第4,986,988号；第4,978,744号；第4,879,278号；第4,816,444号；および第4,486,414号に記載されている（これらは全て参照により全体が本明細書に援用される）。

【0165】

一部の実施形態においては、抗癌剤は例えば以下の薬剤表に列挙する薬剤を包含するがこれらに限定されない。

【0166】

【表1A-1】

薬剤表

アルキル化剤	
ナイトロジェンマスタード：	シクロホスファミド
	イフォスファミド
	トロフォスファミド
	クロラムブシル
ニトロソ尿素：	カルムスシン（BCNU）
	ロムスチン（CCNU）
アルキルスルホネート	ブスルファン

【0167】

(3 6)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

【表1A-2】

	トレオスルファン
トリアゼン：	ダカルバジン
白金含有化合物	シスプラチン
	カルボプラチン
<u>植物アルカロイド</u>	
ビンカアルカロイド：	ビンクリスチン
	ビンブラスチン
	ビンデシン
	ビノレルビン
タキソイド：	パクリタキセル
	ドセタキソール
<u>DNAトポイソメラーゼ阻害剤</u>	
エピボドフィリン：	エトボシド
	テニボシド
	トポテカン
	9-アミノカンプトデシン
	カンプトデシン
	クリスナトール
<u>マイトマイシン：</u>	マイトマイシンC
代謝拮抗物質	
<u>葉酸拮抗物質：</u>	
DHFR阻害剤：	メトトレキセート
	トリメトレキセート
IMPデヒドロゲナーゼ阻害剤：	ミコフェノール酸
	チアゾフリン
	リバビリン
	EICAR
リボヌクレオチド還元酵素阻害剤：	ヒドロキシ尿素
	デフェロキサミン
<u>ピリミジンアナログ：</u>	
ウラシルアナログ	5-フルオロウラシル
	フロクスウリジン
	ドキシフルリジン
	ラチトレキセド
<u>シトシンアナログ</u>	シタラビン (ara C)
	シトシンアラビノシド
	フルダラビン
<u>プリンアナログ：</u>	メルカプトプリン
	チオグアニン
<u>ホルモン療法：</u>	
受容体拮抗剤：	
抗エストロゲン	タモキシフェン
	ラロキシフェン
	メグストロール
<u>LHRHアゴニスト：</u>	ゴスクルクリン
	ロイプロリドアセテート
抗アンドロゲン：	フルタミド

【0168】

(3 7)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

【表1A-3】

	ビカルタミド
レチノイド／デルトイド	
ビタミンD3アナログ：	EB 1089
	CB 1093
	KH 1060
光ダイナミック療法：	ベルトポルフィン (BPD-MA)
	フタロシアニン
	光増感剤P c 4
	デメトキシーヒポクレリンA
	(2BA-2-DMHA)
サイトカイン：	インターフェロン- α
	インターフェロン- γ
	腫瘍壊死因子
その他：	
イソプレニル化阻害剤：	ロバスタチン
ドーパミン作用性神経毒：	1-メチル-4-フェニルピリジニウムイオン
細胞周期阻害剤：	スタウロスポリン
アクチノマイシン：	アクチノマイシンD
	ダクチノマイシン
ブレオマイシン：	ブレオマイシンA 2
	ブレオマイシンB 2
	ペプロマイシン
アントラサイクリン：	ダウノルビシン
	ドキソルビシン (アドリアマイシン)
	イダルビシン
	エビルビシン
	ビラルビシン
	ゾルビシン
	ミトザントロン
MDR阻害剤：	ベラパミル
Ca ²⁺ +ATPase阻害剤：	タブシガルギン

一部の実施形態においては、診断薬剤、予防薬剤または治療薬剤は放射性同位体ではない。

【0169】

一部の実施形態においては、イムノコンジュゲートは以下の特定の型の癌の1つを治療するために使用できる：

固形腫瘍、例えば、限定しないが、

肉腫

線維肉腫

粘液肉腫

脂肪肉腫

軟骨肉腫

骨原性肉腫

軟骨腫

血管肉腫

内皮肉腫

リンパ管肉腫

リンパ管内皮肉腫

骨膜腫

中皮腫

(3 8)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

ユーイング腫
平滑筋肉腫
横紋筋肉腫
結腸癌
結腸直腸癌
腎臓癌
脾臓癌
骨癌
乳癌
卵巣癌
前立腺癌
食道癌
胃癌（例えば胃腸の癌）
口腔癌
鼻腔癌
咽喉癌
扁平細胞癌（例えば肺の）
基底細胞癌
腺癌（例えば肺の）
肝腺癌
皮脂腺癌
乳頭状癌
乳頭状腺癌
嚢胞腺腫
髄様癌
気管支原生癌
腎細胞癌
肝細胞癌
胆管癌
絨毛癌
精上皮腫
胎生期癌
ウィルムス腫
子宮頸癌
子宮癌
精巣癌
小細胞肺癌
膀胱癌
肺癌
非小細胞肺癌
上皮癌
神経膠腫
多形神経膠芽腫
星状細胞腫
髄芽細胞腫
頭蓋咽頭腫
脳室上衣細胞腫
松果体腫
血管芽腫
聴神経腫

(3 9)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

乏突起神経膠腫

髄膜腫

皮膚癌

黒色腫

神経芽腫

網膜芽腫

血液骨癌、例えば、限定しないが、

急性リンパ芽球性白血病 (ALL)

急性リンパ芽球性B細胞白血病

急性リンパ芽球性T細胞白血病

急性骨芽球性白血病 (AML)

急性前骨髄球性白血病 (APL)

急性単芽球性白血病

急性赤白血病

急性巨核芽球白血病

急性骨髄単球性白血病

急性非リンパ球性白血病

急性未分化型白血病

慢性骨髄球性白血病 (CML)

慢性リンパ球性白血病 (CLL)

ヘアリーセル白血病

多発性骨髄腫

急性および慢性白血病：

リンパ芽球性

骨髄原性

リンパ球性

骨髄球性白血病

リンパ腫：

ホジキン病

非ホジキンリンパ腫

多発性骨髄腫

ヴァルデンストレームマクログロブリン血症

重鎖疾患

真性赤血球増加症

他の癌：

腹腔癌

肝細胞癌

肝細胞腫

唾液腺癌

外陰部癌

甲状腺

陰茎癌

肛門癌

頭部頸部癌

腎細胞癌

急性未分化大細胞癌

皮膚未分化大細胞癌。

【0170】

一部の実施形態においては、イムノコンジュゲートは以下の特定の型の自己免疫疾患の

1つを治療するために使用できる：

(4 0)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

活動性慢性肝炎
アジソン病
アレルギー性肺炎
アレルギー反応
アレルギー性鼻炎
アルポート症候群
アナフィラキシー
強直性脊椎炎
抗リン脂質症候群
関節炎
回虫症
アスペルギルス症
アトピー性アレルギー
アトピー性皮膚炎
アトピー性鼻炎
ベーチェット病
鳥飼育者肺
気管支喘息
キャプラン症候群
心筋症
セリアック病
シャーガス病
慢性糸球体腎炎
コーガン症候群
寒冷凝集素病
先天性風疹感染
CREST症候群
クローン病
クリオグロブリン血症
クッシング症候群
皮膚筋炎
円板状エリテマトーデス
ドレスラー症候群
イートン-ランバート症候群
エコーウイルス感染症
脳脊髄炎
内分泌性眼障害
エプスタインバーウイルス乾癬
ウマ慢性肺気腫
紅斑
エバンズ症候群
フェルティ症候群
線維筋肉痛
フックス毛様体炎
胃萎縮
胃腸アレルギー
巨細胞性動脈炎
糸球体腎炎
グッドパスチャー症候群
対宿主性移植片病

(4 1)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

グレース病
ギヤンバレー病
橋本甲状腺炎
溶血性貧血
ヘーノホーシェーンライン紫斑病
特発性副腎萎縮
特発性肺線維症
I g A 腎症
炎症性腸疾患
インスリン依存性真性糖尿病
若年性関節炎
若年性真性糖尿病（Ⅰ型）
ランバートーイートン症候群
蹄葉炎
扁平苔癬
ルポイド肝炎
狼瘡
リンパ球減少症
メニエール病
混合結合組織病
多発性硬化症
重症筋無力症
悪性貧血
多腺症候群
初老期痴呆
原発性無ガンマグロブリン症
原発性胆汁性肝硬変
乾癬
乾癬性関節炎
レイノー兆候
再発性流産
ライター症候群
リウマチ熱
関節リウマチ
サンブター症候群
住血吸虫症
シュミット症候群
硬皮症
シャルマン症候群
シェーグレン症候群
スティッフマン症候群
交感性眼炎
全身エリテマトーデス
高安動脈炎
側頭動脈炎
甲状腺炎
血小板減少症
甲状腺中毒症
中毒性表皮壊死症
B型インスリン抵抗性

(4 2)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

I 型真性糖尿病

潰瘍性結腸炎

ブドウ膜炎

白斑

ヴァルデンストレームマクログロブリン血症

ヴェーゲナー肉芽腫症。

【0171】

他の癌または自己免疫疾患の治療のためのイムノコンジュゲートの使用も意図され、本発明の範囲に包含される。

【0172】

(C. イムノコンジュゲートの投与)

一般的に投与されるイムノコンジュゲートの用量は患者の年齢、体重、性別、全身状態およびそれまでの病歴のような要因に応じて変動する。典型的には、約 1 pg/kg ～ 20 mg/kg (薬剤量/患者体重) の範囲のイムノコンジュゲートの用量をレシビエントに与えることが望ましいが、より低用量または高用量を投与してもよい。例えば多くの研究は $0.1 \sim 1.0$ ミリグラムの用量を用いた場合の良好な診断画像化を実証しているが、別の研究では 10 ミリグラム超の用量で向上した位置特定が示されている (例えば前出 Brown 参照)。

【0173】

治療用途のためには、プロトコルに応じて一般的に約 $10 \sim 200$ ミリグラムのイムノコンジュゲートを投与する。一部の実施形態においては、用量は約 0.5 mg/kg ～ 20 mg/kg 、または約 1 mg/kg ～ 10 mg/kg または約 15 mg/kg である。一部のプロトコルは数日間、数週間または数ヶ月の期間、毎日投与する。一部の実施形態においては、イムノコンジュゲートは週に $1 \sim 3$ 回、週 1 回、隔週または月 1 回投与する。患者の感受性を低減させるために、用量を低減、および/または、他の種由来の抗体を使用、および/または低アレルギー性の抗体、例えばハイブリッドヒト若しくは霊長類抗体を使用することが必要となる場合がある。

【0174】

イムノコンジュゲートの患者への投与は、静脈内、動脈内、腹腔内、筋肉内、皮下、胸膜内、髄膜内とするか、局所用カテーテルを介した灌流によるか、または、直接の患部内注射により行うことができる。注射によりイムノコンジュゲートを投与する場合は、投与は連続注入によるか、または、単回または複数回の瞬時投与であってよい。

【0175】

イムノコンジュゲートは知られた方法に従って製剤することにより薬学的に有用な組成物、例えば医薬品を製造することができ、これによりイムノコンジュゲートを薬学的に受容可能な担体との混合物中で組み合わせる。組成物は、その投与がレシビエント患者により耐容され得る場合に、「薬学的に受容可能な担体」ということができる。滅菌されたリン酸塩緩衝食塩水は薬学的に受容可能な担体の一例である。他の適切な担体は当該分野で良く知られている (例えば Remington's Pharmaceutical Sciences, 18th Ed. (1990) を参照)。

【0176】

免疫療法の目的のためには、イムノコンジュゲートおよび薬学的に受容可能な担体は治療有効量で患者に投与する。「治療有効量」とは生理学的に意味のある投与量である。薬剤は、その存在がレシビエント患者の生理学的状態の検出可能な変化をもたらす場合に、生理学的に意味のあるものとなる。

【0177】

追加的な薬学的方法を用いることにより、治療用途においてイムノコンジュゲートの作用の持続時間を制御してよい。制御放出調製物はイムノコンジュゲートと複合体形成するかこれを吸着するための重合体の使用を介して調製できる。例えば、生体適合性重合体はポリ (エチレンコビニルアセテート) のマトリックス、および、ステアリン酸 2 量体とセ

(43)

特表2008-521828(P2008-521828A)

バシン酸とのポリ無水物共重合体のマトリックスを包含する（例えばSherwoodら、Bio/Technology 10:1446-1449(1992)参照）。そのようなマトリックスからのイムノコンジュゲートの放出速度は、イムノコンジュゲートの分子量、マトリックス内のイムノコンジュゲートの量、および、分散された粒子の大きさに依存する（例えばSaltzmanら、Biophysical J. 55:163-171(1989)；および前出のSherwoodら、参照）。他の固体剤型はRemington's Pharmaceutical Sciences, 18th Ed. (1990)に記載されている。

【0178】

本発明は本明細書に記載した特定の実施形態により範囲を限定されない。本明細書に記載したものに加えて本発明の種々の変形は上記説明および添付図面から当業者には自明となるものである。このような変形は添付する請求項の範囲内に包含されるものとする。

【0179】

本発明は以下の実施例においてさらに説明するが、これらは本発明の範囲を限定するものではない。以下の実施例において記載する細胞系統はAmerican Type Culture Collection(ATCC)またはDeutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Germany(DMSZ)により特定される条件に従って培養物中に維持した。細胞培養試薬はInvitrogen Corp., Carlsbad, CAより入手した。

【実施例】

【0180】

(実施例1)

(cAC10システイン変異体の構築および発現)

(手順)

AC10ハイブリドーマからのキメラAC10(cAC10)の構築、およびCHO細胞系統におけるcAC10の発現が報告されている(Wahlら、Cancer Res. 62(13):3736-42(2002))。

【0181】

(i) 変異誘発およびクローニング

cAC10の変異体はcDNAをcAC10重鎖について(配列番号6)(pBSSK-AC10H内)またはcAC10軽鎖について(配列番号8)(pBSSK-AC10L内)含有し、そして、それぞれcAC10重鎖(配列番号7)またはcAC10軽鎖(配列番号9)をそれぞれコードするpBluescriptベクター内で作成した。変異誘発はQuikchange(登録商標)部位指向性変異誘発キット(Stratagene, La Jolla, CA)を用いながら製造元の説明書に従って実施した。cAC10重鎖cDNAを含有するpBluescriptベクター、即ち図4に示すpBSSK-AC10Hを鋳型として使用することにより重鎖C226S、C229S二重変異体(システインからセリンへの置換は226位および229位にある)を作成した(残基の番号付けは、シグナル配列を除き、成熟cAC10重鎖および軽鎖によるものである)。プライマーC226S:C229S:

【0182】

【化16】

5'GACAAAACTCACACATCCCCACCGTCCCCAGCACCTGAACTC

(配列番号1)およびそのリバース相補相手を用いてアミノ酸置換を導入した(変異したコドンに下線を付した)。得られたプラスミドはcAC10H226/220に関するcDNA(配列番号14)を含有し、そしてcAC重鎖C226S、C229S二重変異体(配列番号15)をコードするpBSSK-AC10H226, 229と命名した。

【0183】

(44)

特表2008-521828(P2008-521828A)

cAC10重鎖C220S変異体は鋳型としてのpBSSK AC10HおよびプライマーC220S:

【0184】

【化17】

5'GTTGAGCCCAAATCTTCTGACAAAACCTCA-
CACATGCCC

(配列番号2)およびそのリバーズ相補相手を用いて作成(変異したコドンに下線を付した)することにより、cAC10H220に関するcDNA(配列番号10)を含有し、そしてcAC10C220S変異体(配列番号11)をコードするコンストラクトpBSSK AC10H220を作成した。pBSSK AC10H220を鋳型として使用することにより、プライマーC226S:

【0185】

【化18】

5'GACAAAACCTCACACATTCCCCACCG-TGCCCAGC

(配列番号3)およびそのリバーズ相補相手(第2の変異コドンに下線を付した)を用いながら重鎖C220S、C226S二重変異体を作成した。得られたプラスミドはcAC10H220/226に関するcDNA(配列番号12)を含有し、そしてcAC重鎖C220S、C226S二重変異体(配列番号13)をコードするpBSSK AC10H220、226と命名した。pBSSK AC10H226、229を鋳型として使用することにより、プライマーC220S:

【0186】

【化19】

5'GTTGAGCCCAAATCTTCTGACAAAACCTCACACATCCCC

(配列番号4)およびそのリバーズ相補相手(変異コドンに下線を付した)を用いながら重鎖C220S、C226S、C229S変異体を作成した。得られたプラスミドはcAC10H220/226/229に関するcDNA(配列番号16)を含有し、そしてcAC重鎖C220S、C226S、C229S変異体(配列番号17)をコードするpBSSK AC10H220、226、229と命名した。

【0187】

cAC10軽鎖cDNAを含有するpBluescriptベクター、即ち図5に示すpBSSK AC10Lを鋳型として使用することにより、プライマーC218S:

【0188】

【化20】

5'CTTCAACAGGGGAGAGTCTTAGACGCG-

TATTGG

(配列番号5)およびそのリバーズ相補相手(変異コドンに下線を付した)を用いて軽鎖C218S変異体pBSSK AC10L218を作成した。得られたプラスミドはcAC10L218に関するcDNA(配列番号18)を含有し、そしてcAC10軽鎖C218S変異体(配列番号19)をコードするpBSSK AC10L218と命名した。

【0189】

cAC10重鎖の親およびシステイン変異体のcDNAを制限酵素XhoIおよびXbaIで切断することによりpBluescriptから遊離させ、CHEF EF-1αプロモーターの下流においてpDEF38発現ベクター(Running Deer and Allison, Biotechnol Prog. 20(3):880-9(2004))内にライゲーションした。cAC10軽鎖の親およびシステイン変異体のcDNAをMluIでpBluescriptから遊離させ、CHEF EF-1αプロモーターの下流においてpDEF38のMluI部位にクローニングした。

(45)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【0190】

(ii) 安定な細胞系統の開発およびタンパク質発現

cAC10変異体をcAC10親抗体に関して前述の通りCHO-DG44細胞系統内で安定に発現させた(Wahlら、Cancer Res. 62:3736-3742(2002))。pDEF38発現コンストラクトを制限酵素PvuIで線状化した後に、トランスフェクションに付した。線状化pDEF38 cAC10 H鎖の親またはシステイン変異体のコンストラクト50マイクログラムを、エレクトロポレーションにより、CHO-DG44細胞内に線状化pDEF38 cAC10 L鎖の親またはシステイン変異体のコンストラクト50μgと同時にトランスフェクトした(Urlaubら、Somat Cell Mol Genet. 12(6):555-66(1986))。エレクトロポレーションの後、ヒポキサンチンおよびチミジン(JRH Bioscience, Lenexa, KS)および4mMのL-グルタミン(Invitrogen, Carlsbad, CA)を含有するEX-CELL 325 PF CHO培地中で2日間、細胞を回復させた。2日間の後、培地をヒポキサンチンおよびチミジンを含有しない選択培地と交換することによりcAC10変異体を発現している安定な細胞系統を選択した。選択可能なマーカーを含有する、プラスミドDNAを取り込んだ細胞のみがヒポキサンチンおよびチミジンの不在下で増殖することができた。細胞を回収し、安定なプールを30ml容の振とうフラスコ培養にスケールアップした。細胞のクローニングは非トランスフェクトCHO-DG44フィーダー細胞のバックグラウンド中の限界希釈法を用いて実施した。概すれば、ヒポキサンチンおよびチミジンの不在下、EX-CELL 325 PF CHO培地中、マイクロプレートのウェル当たり0.5トランスフェクト細胞および1000非トランスフェクト細胞をプレーティングした。7~10日間インキュベーションした後、個々のコロニーを採取し、増殖させた。高力価のクローンを選択し、スピナー中終容量2.5Lで、またはWAVEバイオリアクター(WAVE Biotech LLC, Bridgewater, NJ)中終容量5~10Lで培養した。

【0191】

(結果)

cAC10はヒトCD30に結合するキメラIgG₁である(Wahlら、前出)。抗体cAC10は、容易に還元され且つほぼ定量的な収率でチオール反応性オーリスチン薬剤であるvcMMAEにコンジュゲートされる溶媒接触可能な鎖間ジスルフィド結合4つを有している(Doroninaら、Nat. Biotechnol. 21:778-784(2003))。全てで8つの接触可能なシステイン有するcAC10親抗体を含み、そしてvcMMAEを負荷されているこのADCを本明細書においてはC8-E8と標記する(図1A)。cAC10内の接触可能なシステインを系統的に変異させて相同性残基であるセリンとすることにより4つ(C4v1、C4v2およびC4v3)または2つ(C2v1およびC2v2)の残存する接触可能なシステインを有する抗体変異体を作成した(表1および図1A)。さらに、重鎖システイン残基226がセリンに変化した抗体変異体C6v1(図示せず)は6つの接触可能なシステインを有した。これらの操作された抗体変異体を薬剤結合の厳密に定められた化学量論および部位においてコンジュゲートを形成するための出発点とした。

【0192】

全抗体変異体を安定なCHO-DG44細胞系統において25~125mg/Lの力価で発現させた。抗体変異体をプロテインAアフィニティーおよびイオン交換クロマトグラフィー(表1)により2.5~10L培養物から精製し、次にサイズ排除クロマトグラフィーおよびSDS-PAGEにより分析した。C4v3を除く全ての抗体変異体はサイズ排除クロマトグラフィーによれば>98%単量体であると推定された(表2)。還元条件下で電気泳動に付した全変異体が重鎖および軽鎖の存在と合致する2つの主要なバンドを示した(データ示さず)。非還元条件下のSDS-PAGEに関しては、全ての抗体変異体(C4v3を除く)が予想された鎖間ジスルフィド結合パターン(図1A)と合致した電気泳動パターン(図1B)を示した。抗体変異体C4v3は、その予想とは異なる電気

(4 6)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

泳動パターンおよびサイズ排除クロマトグラフィーのプロファイルがかなりの凝集を示唆していたことに基づいて、これらの試験の残余からは除外した。

【0193】

【表1】

表 1
抗体変異体の生成および特徴付け

cAC10 変異体 *	C v s → S e r 変異の位置 †	K a r p a s - 2 9 9 への競合結合 (IC ₅₀ , nM) #
C8	無し (親)	2.8 ± 0.1
C2v1	L214, H220, H226	2.2 ± 0.4
C2v2	H220, H226, H229	2.6 ± 0.4
C4v1	L214, H220	3.2 ± 0.4
C4v2	H226, H229	2.4 ± 0.1
C4v3	H220, H226	nd

* c A C 1 0 変異体は溶媒接触可能なシステイン残基の数、および、必要な場合は変異体数により識別される。例えば C 2 v 1 は溶媒接触可能なシステイン残基 2 つを含有する c A C 1 0 変異体を示す (図 1 A)。

† L、軽鎖；H、重鎖；Kabatら (Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th ed. NIH, Bethesda, MD (1991)) のナンバリングスキーム。

3 以上の独立した実験に関する平均 (± S E M)。

‖ n d、ピークのショルダーおよびブロード化が存在したので決定しなかった。

【0194】

【表2】

表 2
プロテイン A 精製後の各 c A C 1 0 システイン変異体に関するタンパク質回収および
サイズ排除クロマトグラフィー分析の結果

cAC10 cys 変異体	培養物 1 L あたりのタンパク質回収量 m g (プロテイン A 精製)	%単量体
C2v1	120	98.8%
C2v2	92	99.1%
C4v1	33	99.5%
C4v2	36	94.6%
C4v3	37	*
C6v1	28	97.3%

* ピークのショルダーおよびブロード化が存在したので決定しなかった。

精製したタンパク質は還元および非還元条件下で SDS-PAGE により分析した。c A C 1 0 C 4 v 3 を除く全変異体が表 3 および図 1 B に示すとおり非還元条件下で予想されたバンド形成パターンを示した。

【0195】

(47)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【表3】

表 3
SDS-PAGEにより非還元条件下で分析した変異体に関する予想される
バンドパターンおよび分子量

cAC10 変異体	システイン変異	非還元 バンドパターン	MWs (kDa)
C2v1	L218, H220/226	HH + L	98 + 24
C2v2	H220/226/229	H + L	49 + 24
C4v1	L218, H220	HH + L	98 + 24
C4v2	H226/229	HL	73
C4v3	H220/226	HH + L	98 + 24
C6v1	H226	HHLL	146

凝集はサイズ排除高速液体クロマトグラフィーにより評価し、cAC10C4v3を除く全ての変異体が>94%単量体であることが判明した。cAC10C4v3は非還元SDS-PAGEおよびサイズ排除分析の両方において不均質であることが分かった。非還元条件下のcAC10C4v3のバンド形成パターンは表3に示すとおり予想された重鎖-重鎖2量体および軽鎖のバンドを含んでいたが、重鎖-軽鎖2量体および重鎖単独も存在しており、遊離の軽鎖システインがH229位において重鎖システインとジスルフィド結合を形成できたことを示唆している。

【0196】

(抗体薬剤コンジュゲートの製造および分析)

(手順)

(i) 抗体薬剤コンジュゲートの製造

cAC10親株およびシステイン変異体の抗体を、プロテインAクロマトグラフィーを用いて精製し、そしてSDS-PAGEおよびサイズ排除クロマトグラフィーにより分析した。cAC10C6v1を除く全てのcAC10システイン変異体は、37℃1時間で、0.025Mホウ酸ナトリウムpH8、0.025M NaClおよび1mMジエチレントリアミン4酢酸(DTPA; Aldrich, Milwaukee, WI)中約100Xの抗体より過剰量の10mMジチオスレイトール(DTT; Sigma, St. Louis, MO)を用いて還元した。還元された抗体を水で150mLに希釈し、70mL容のヒドロキシアパタイトカラム(MacroprepセラミックI型40μm, BioRad)に流量10mL/分で適用した。カラムは、予め、5カラム容の0.5Mリン酸ナトリウムpH7、10mM NaClおよび5カラム容の10mMリン酸ナトリウムpH7、10mM NaClで平衡化させた。適用の後、カラムを5カラム容の10mMリン酸ナトリウムpH7、10mM NaClで洗浄し、次いで100mMリン酸ナトリウムpH7、10mM NaClで溶出した。還元された抗体を5, 5'-ジチオビス-(2-ニトロ安息香酸)(DTNB; Pierce)で滴定することにより抗体-システインチオール濃度を測定した。還元された抗体を0℃に冷却し、そしてDMSO中マレイミドカブロイル-バリリン-シトルリン-p-アミノベンゾイル-MMAE(vcMMAE)2.75等量で処理した。最終DMSO濃度は10%とすることにより薬剤が完全に溶解するようにした。0℃で40分の後、過剰なシステインを添加することにより未反応のvcMMAEがあればそれをクエンチングし、混合物を水で250mLに希釈した。コンジュゲートは上記した通りヒドロキシアパタイトカラム上で精製した。抗体-薬剤コンジュゲートを濃縮し、15mL Amicon Ultrafree30Kカットオフスピン濃縮装置を用いながら緩衝液をPBSに交換した。cAC10C6v1を限定数の等量のTCEP(2-カルボキシエチル)ホスフィン、Acros)で還元し、過剰なTCEPを除去することなくvcMMAEに以下の通りコンジュゲートした; 即ち、C6v1(2.1mg/mlまたは14.3μM; 74mg)35mlを37℃で2.5時間1mMDTPA含有PBS中、TCEP(57.1μM、100mM保存溶液より)4.0等

(48)

特表2008-521828(P2008-521828A)

量で処理した。

【0197】

還元程度はPD-10カラム (Amersham Biosciences) を通しながら還元反応物少量を精製し、そしてDTNBで抗体-システインチオール数を滴定することにより確認し、C6v1当たり5.7であることがわかった。還元された抗体を0℃に冷却し、DMSO 3.9ml中のvcMMAE 8.0等量で処理した(抗体チオールの濃度は73.5μMであり、vcMMAEの濃度は103.2μMであった)。0℃135分後、100mMシステイン0.4mlを添加することにより未反応のvcMMAEがあればそれをクエンチングし、混合物を水で250mlに希釈した。コンジュゲートを上記した通りヒドロキシアパタイトカラム上で精製した。cAC10-C6v1-vcMMAE (2.4mg/mlを20ml; 48mg) (C6v1-E6) を濃縮し、15mL Amicon Ultrafree 30Kカットオフスピン濃縮装置を用いながら緩衝液をPBSに交換した。

【0198】

抗体当たり2つおよび4つのMMAE分子を有する親cAC10抗体薬剤コンジュゲート(ACD)、即ち、それぞれ、C8-E2およびC8-E4の作成は報告されている(Hamblettら, Clin. Cancer Res. 15 7063-7070 (2004))。概すれば、方法では、mAbの部分的還元を行うことによりAb当たり~4の還元Cysを曝露させ、その後vc-MMAEとの反応を行う。C8-E4-混合物(またはC8-E4M)と称される部分的に負荷したcAC10-Val-Cit-MMAEを得た。

【0199】

C8-E2およびC8-E4は緩衝液A(50mMリン酸ナトリウム、2M NaCl、pH7.0)5カラム容よりも多くの量で平衡化させたToyoperalフェニル-650M HIC樹脂(Tosoh Bioscience, Montgomeryville, PA)上の分取用HIC(疎水性相互作用クロマトグラフィー)分画によりC8-E4Mから調製した。カラムに負荷する試料を調製するために、C8-E4混合物(12.9mg/ml)39mlを等容量の緩衝液A'(50mMリン酸ナトリウム、4M NaCl、pH7.0)と混合した。試料を負荷した後、カラムをA₂₈₀ベースラインとなるまで緩衝液Aで洗浄した。65%緩衝液A/35%緩衝液B(80%v/v50mMリン酸ナトリウム、pH7.0、20%v/vアセトニトリル)よりなる段階的勾配を用いながらC8-E2を溶出採取した。再度ベースラインとなった後に、30%緩衝液A/70%緩衝液Bよりなる段階的勾配を用いてC8-E4を溶出採取した。C8-E2およびC8-E4のピークは共にそれぞれのピーク高さの~20%となるまで採取した。30kDaの分子量カットオフのUltrafree-15遠心分離フィルター装置(Millipore, Billerica, MA)を用いて、目的画分をPBSに緩衝液交換した。

【0200】

(ii) 薬剤負荷の分析

薬剤負荷は250および280nmの吸光度の比(A₂₅₀/A₂₈₀)を測定することにより調べた。cAC10当たりのvcMMAEの数は実験的に(A₂₅₀/A₂₈₀-0.36)/0.0686であることがわかっている。ADCは流量1ml/分およびカラム温度30℃においてTosoh Bioscience エーテル-5PWカラム(パート08641)を用いながら疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)により分析した。溶媒Aは50mMリン酸ナトリウムpH7および2.5M NaClとした。溶媒Bは80%50mMリン酸ナトリウムpH7、10%2-プロパノールおよび10%アセトニトリルとした。15分間0%B一定、50分0~100%Bの直線勾配、0.1分100~0%Bの直線勾配、そして14.9分0%B一定とした。注入(典型的には90~100μL)は1容のADC(濃度は少なくとも3mg/ml)および1容の5M NaClとした。

(49)

特表2008-521828(P2008-521828A)

【0201】

H I CクロマトグラフィーのADCをAgilent Bioanalyzerを用いて分析した。タンパク質200チップは製造元の説明に従って変性非還元条件下に使用した。概すれば1mg/ml ADC 4μLを非還元ローディング緩衝液2μLと混合し、5分間100℃に加熱した。水(84μL)を添加し、この混合物6μLをチップの各ウェルに負荷した。

【0202】

ADCをPLRP-Sカラム(Polymer Laboratories part 1912-1802:1000A, Su, 2.1×50mm)上で分析した。流量は1ml/mlとし、カラム温度は80℃とした。溶媒Aは水中0.05%トリフルオロ酢酸、溶媒Bはアセトニトリル中0.04%トリフルオロ酢酸とした。3分間25%B一定、15分50%Bまで直線勾配、2分間95%Bまで直線勾配、1分間25%Bまで直線勾配、そして2分間25%B一定とした。注入は残存鎖間ジスルフィドを切断するために15分間37℃において20mM DTTで予め還元しておいた1mg/ml ADC 10~20μLとした。

【0203】

(結果)

cAC10システイン変異体のMMAEコンジュゲートを抗体の還元およびその後のv cMMAEによるアルキル化により作成した。280nmの吸光度におけるUV-VIS分析およびPLRPクロマトグラフィーの両方による各コンジュゲートcAC10システイン変異体の分析によれば、表4に示す通り、予想された薬剤負荷に近似する水準が達成されていた。

【0204】

【表4】

表4
cAC10システイン変異体v cMMAEコンジュゲートの分析のまとめ

cAC10 変異体	濃度 (mg/ml)	容量 (ml)	合計 (mg)	DTNB RSH/Ab	PLRP 薬剤 /ab	% 単量体	遊離薬剤
C2v1-E2	41	2.3	94.3	2.3	2.1	98.0%	<0.05%
C2v2-E2	5.6	0.6	3.4	2.3	2.0	99.4%	<0.05%
C4v1-E4	12.0	3.8	45.6	4.2	3.7	99.1%	<0.05%
C4v2-E4	12.4	4.0	49.6	4.0	3.5	98.7%	<0.05%
C4v3-E4	0.8	0.4	0.3	7.2	3.7	99%	<0.05%
C6v1-E6	12.5	3.3	40.6	5.7	5.7	98.7%	<0.05%

サイズ排除クロマトグラフィーによる分析によれば、表4に示すとおり全てのコンジュゲートが98%単量体かそれ以上よりなるものであった。この試験において記載した対照分子は親cAC10がMMAE 2分子(C8-E2)またはMMAE 4分子(C8-E4)のいずれかとコンジュゲートしたものとした。これらの2剤および4剤負荷MMAEコンジュゲートは親cAC10抗体の部分的還元により作成し、Hamblettら、Clin. Cancer Res. 15:7063-7070(2004)において前述の通り分析した。

【0205】

(cACシステイン変異体コンジュゲートのインビトロの細胞傷害性)

(手順)

cAC10システイン変異体コンジュゲートを投与したCD30+ Karpas 299細胞の増殖阻害はDNA合成を測定することにより調べた。コンジュゲートを92時間細胞と共にインキュベートし、その後37℃で4時間、[³H]-チミジン、0.5μCi/ウェルで標識した。細胞をフィルター上に採取し、シンチレーション液と混合し、Topcountシンチレーションカウンター(Packard Instruments,

(50)

特表2008-521828(P2008-521828A)

Meriden, CT)を用いて放射能を測定した。未投与の対照と相対比較した場合の取り込まれた放射能のパーセントをコンジュゲート濃度に対してプロットし、データをPrism4ソフトウェア(GraphPad Software Inc. San Diego, CA)を用いてシグモイド型の用量応答曲線にフィットさせた。あるいは、コンジュゲートとの92時間インキュベーション時間の後に50 μ MレサズリンをKarpas 299細胞に添加した。4時間のインキュベーション期間の後、染料の還元をFusion HT 蛍光プレートリーダー(Packard Instrument, Meriden, CT)を用いて測定した。

【0206】

(結果)

AC10システイン変異体C2v1、C4v1、C4v2およびC6v1のMMAEコンジュゲート(それぞれC2v1-E2、C4v1-E4、C4v2-E4およびC6v1-E6)の細胞傷害性をCD30⁺ Karpas 299細胞における [³H]-チミジン取り込み試験を用いて調べた。使用した対照コンジュゲートは、完全負荷親cAC10 MMAEコンジュゲート(C8-E8)(最も強力)と2剤負荷コンジュゲート(C8-E2)との間に位置する力価を有することがわかっている4剤負荷親cAC10(C8-E4)とした。図2Aに示す通り、C6v1-E6は0.012 nMの最低IC₅₀値を有していたのに対し、4剤負荷システイン変異体C4v1-E4およびC4v2-E4および4剤負荷親cAC10コンジュゲートC8-E4はそれぞれ0.020 nM、0.027 nMおよび0.018 nMの極めて同様のIC₅₀を有していた。図2Bに示す通り、C2v1-E2 MMAEコンジュゲートは0.029 nMのIC₅₀を有していた。次に、Karpas 299細胞におけるC2v1-E2およびC2v2-E2 MMAE薬剤コンジュゲートの両方のインビトロ細胞傷害性活性を評価した。細胞傷害性はコンジュゲートへの92時間連続曝露の後の培養物に導入されたレサズリン染料の還元により評価した。抗体当たり2 MMAE薬剤分子(C8-E2)にコンジュゲートしたcAC10を対照として使用した。C2v1-E2、C2v2-E2およびC8-E2でそれぞれ52.4 ng/ml、39.8 ng/mlおよび39.8 ng/mlと、3コンジュゲート全てが同様のIC₅₀値を有していた。これらのデータは、システイン変異体コンジュゲートが、部分還元により親cAC10抗体から作成した部分負荷MMAEコンジュゲートに対して、活性において近似匹敵するものであることを示している。

【0207】

(ヒトALCLの異種移植片モデルを用いたインビボのcAC10システイン変異体コンジュゲートの抗腫瘍活性)

(手順)

皮下疾患モデルを樹立するために、ALCL 5×10⁶ Karpas-299細胞をC.B-17 SCIDマウス(Harlan, Indianapolis, IN)の右体側に移植した。ADCによる治療は6~10匹の各群における腫瘍サイズが平均100 mm³となった時点で開始した。投与は単回注射とした。腫瘍体積は式(長さ×幅²)/2を用いて計算した。触診できない程度に縮小した腫瘍は完全な退行(CR)と定義した。腫瘍移植後100日を越えて持続した完全な退行は治癒と定義した。腫瘍体積が約100 mm³に達した時、動物を安楽死させた。

【0208】

(結果)

cAC10システイン変異体薬剤コンジュゲートの薬効をSCIDマウスにおけるALCLの皮下異種移植片モデルにおいて評価した。Karpas 299細胞をSCIDマウスの体側に移植し、100 mm³の平均体積となるまで腫瘍を増殖させた。腫瘍担持マウスは無作為に8~10匹の群に分割し、未投与のまま、または、cAC10システイン変異体MMAEコンジュゲートC2v1-E2、C4v1-E4またはC4v2-E2または部分MMAE負荷親cAC10コンジュゲートC8-E2およびC8-E4を単回用量試験において投与した。ADC用量は群当たり等しい濃度のMMAEが注射されるように

(51)

特表2008-521828(P2008-521828A)

正規化し、C8-E4、C4v2-E4およびc4v1-E4ではそれぞれ1mg/kg、1.14mg/kgおよび1.05mg/kgを注射し、そして、C8-E2およびC2v1-E2ではそれぞれ2mg/kgおよび1.9mg/kgとした。図3Aに示す通り、C2v1-E2はC8-E2と同様の抗腫瘍活性を示し、C8-E2を投与した全動物およびC2v1-E2を投与した8匹中6匹では完全な腫瘍退行が観察された。図3Bに示す通り、C4v1-E4およびC4v2-E4はC8-E4と同様の抗腫瘍活性を示した。完全な退行はC8-E4およびC4v2-E4の10匹中8匹およびC4v1-E4の10匹中6匹で観察された。

【0209】

総括すれば、システイン変異体から形成した2および4薬剤負荷ADCは、部分還元法により作成したC8-E4およびC8-E2コンジュゲートと同様のインビボ活性を有していた。

【0210】

(実施例2)

(抗体コンジュゲートの製造および分析)

(手順)

実施例1に記載の通り製造したcAC10の親および変異体抗体を、プロテインA、次にAEKTAexplorer (GE Healthcare, Piscataway, NJ) を用いたアニオン交換クロマトグラフィーにより精製した。概すれば、抗体を含有するコンディショニングされた培地を約10倍に濃縮し、旋回流過 (Millipore) によりPBS pH7.4に緩衝液交換した。内毒素除去のために4℃で一夜穏やかに攪拌しながら0.5% (v/v) Triton X-100 (Sigma, St. Louis, MO) で濃縮した試料を処理した後に、PBS pH7.4で予備平衡化したプロテインA (GE Healthcare) 上に負荷した。PBS、pH7.4、2〜3カラム容 (CV) の0.5% v/v Triton X-100、PBS、pH7.4中1M NaCl、次にPBS pH7.4で安定なベースラインに達するまでカラムを洗浄した。結合した抗体は30mM酢酸ナトリウムpH3.6でプロテインAから溶出させ、次に20mM Tris-HCl、10mM NaCl、1mM EDTA pH8.0 (緩衝液A) で透析した。合わせた抗体は次に緩衝液Aで予備平衡化させたQセファロース (GE Healthcare) に負荷し、2〜3CVの緩衝液A、インキュベートしながら5〜10CVの0.5% (v/v) Triton X-100含有緩衝液A、そして、5CVの緩衝液Aで洗浄した。段階的または直線的なNaCl勾配 (緩衝液A中10〜500mM NaCl) によりQセファロースから抗体を溶出させ、PBS、pH7.4で透析した。精製した抗体をSDS-PAGEおよびTSK-Gel G3000SW HPLCサイズ排除クロマトグラフィー (Tosoh Bioscience, Montgomeryville, PA) により分析した。

【0211】

cAC10Cys→Ser抗体変異体のMMAE分子2等量 (C2v1-E2、C2v2-E2) または4等量 (C4v1-E4、C4v2-E4およびC4v3-E4) とのコンジュゲーションでは、トリス (2-カルボキシエチル) ホスフィン (Acros Organics, Geel, Belgium) の数 (2.5〜4) 等量による還元、および過剰なトリス (2-カルボキシエチル) ホスフィンを除くことのないマレイミドカプロイル-バリン-シトルリン-p-アミノベンゾイル-MMAE (vcMMAE) へのコンジュゲーション (Doroninaら、前出) を行った。薬剤添加の前に、PD-10カラム (GE Healthcare) を通して還元反応物少量を精製し、そして5, 5'-ジチオビス (2-ニトロ安息香酸) で抗体システインチオール数を滴定することにより還元の程度を評価した (Ellman, Arch. Biochem. Biophys. 74: 443-450 (1958))。還元した抗体を0℃で60分間vcMMAEと反応させ、次に過剰なN-アセチルシステイン (Acros Organics) を添加することにより未反応のマレイミドカプロイル-Val-Cit-MMAEがある

(52)

特表2008-521828(P2008-521828A)

場合はそれをクエンチングした。次に反応混合物を水で5倍希釈し、そして、10mMリン酸ナトリウムpH7.0、10mM NaClで平衡化されているヒドロキシアパタイトカラム上に負荷した。カラムを5CVの同緩衝液で洗浄し、コンジュゲートを100mMリン酸ナトリウムpH7.0、10mM NaClで溶出した。コンジュゲートを濃縮し、Amicon Ultrafree遠心分離フィルター装置(Millipore)を用いてPBSに緩衝液交換した。

【0212】

抗体当たり4薬剤(範囲0~8薬剤)、即ちC8-E4混合物(C8-E4M)および抗体当たり2薬剤、即ちC8-E2Mの平均化学量論の親cAC10コンジュゲートの形成が報告されている(Hamblettら、前出)(Sunら、Bioconjug. Chem. 16:1282-1290(2005))。C8-E2Mを疎水性相互作用クロマトグラフィーに付して抗体当たり4(C8-E4)および2(C8-E2)MMAE分子を負荷されているコンジュゲートを前述の通り単離した(Hamblettら、前出)。

【0213】

248nmおよび280nmの波長におけるモル消衰係数を抗体(それぞれ 9.41×10^4 および $2.34 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$)および薬剤(それぞれ 1.50×10^3 および $1.59 \times 10^4 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$)について使用しながら薬剤負荷の化学量論を調べるために前述の通り(Hamblettら、前出)ADCを分析した。抗体重鎖および軽鎖への薬剤結合の位置は、PLRP-Sカラム(Polymer Laboratories, Amherst, MA; #1912-1802; 1000Å, 8μm, 2.1×150mm)および溶媒A(水中0.05%(v/v)トリフルオロ酢酸)および溶媒B(アセトニトリル中0.04%(v/v)トリフルオロ酢酸)を用いた逆相HPLCにより調べた。泳動条件(1ml/分、80℃)は、25%溶媒B一定(3分)、50%溶媒Bまで直線勾配(25分)、95%溶媒Bまで直線勾配(2分)、25%溶媒Bまで直線勾配(1分)および25%溶媒B一定を2分間とした。クロマトグラフィーの前にADC試料(10~20μl、1mg/ml)を15分間37℃で20mM DTTで還元し、残存する鎖間ジスルフィド結合を切断した。

【0214】

(結果)

cAC10親抗体(C8)を部分的に還元して抗体当たり平均2または4個のスルフィドリル基とし、次にvcMMAEと反応させた。相当するコンジュゲート産物C8-E2MおよびC8-E4MはそれぞれMMAEの2および4等量の平均負荷を有している。C8-E2MおよびC8-E4Mは抗体当たり0、2、4、6または8等量のMMAEを負荷された物質種の混合物である(Hamblettら、前出)。MMAEの2等量(C8-E2)または4等量(C8-E4)の何れかの均一な化学量論を有するコンジュゲートを前述の通り疎水性相互作用クロマトグラフィーによりC8-E2混合物から精製した(Hamblettら、前出)。操作された抗体変異体のMMAEコンジュゲートは抗体の還元とその後のvcMMAEとの反応により作製した。

【0215】

各ADCにつき、スペクトル分析(Hamblettら、前出)および逆相HPLC分析(Sunら、前出)による観察された薬剤負荷化学量論は予想されたものと緊密に合致していた。サイズ排除クロマトグラフィー後のピーク面積分析によれば、全てのADCが≥98%単量体であることが示唆された(Doroninaら、前出)。Cys→Ser変異体コンジュゲートの収率(89~96%)はC8-E2Mから精製したコンジュゲートC8-E4(11%)およびC8-E2(27%)と比較して大きく向上していた。還元条件下におけるADCのSDS-PAGE分析によれば、他のADCにおける未コンジュゲートの軽鎖と比較した場合のC2v2-E2、C8-E2、C4v2-E4、C8-E4およびC8-E4MにおけるMMAEコンジュゲート軽鎖の予想された低下した運動性が見られていた。コンジュゲートした重鎖の低下した運動性は、顕著度は低値であった。

(5 3)

特表2008-521828(P2008-521828A)

が、C8-E2およびC8-E4Mにおけるコンジュゲートした重鎖の負均一性は顕著であった(図1C)。

【0216】

還元条件下における逆相HPLCを用いてADCの負均一性を評価した。この方法はMMAE0または1等量を負荷された軽鎖(それぞれL-E0およびL-E1)ならびにMMAE0、1、2または3等量を負荷された重鎖(それぞれH-E0、H-E1、H-E2およびH-E3)を分解する。C8-E4M(図6A)は全ての6つの可能な物質種を含有する最も不均質なコンジュゲートである。C8-E4を形成するためのC8-E4Mの精製は不均質性を以下の4物質種: L-E0、L-E1、H-E1およびH-E2まで低減する(図6B)。cAC10Cys→Ser変異体の均質性は、それぞれC4v1-E4(図6C)およびC4v2-E4(図6D)について予想された単一の軽鎖および重鎖のピーク、L-E0+H-E2およびL-E1+H-E1の存在により実証される。

【0217】

(cAC10変異体および薬剤のコンジュゲートのインビトロの特徴付け)
(手順)

CD30陽性ALCL系統Karpas-299およびCD30陰性WSU-NHLをDeutsche Sammlung von Mikroorganism und Zellkulturen GmbH(Braunschweig, Germany)より入手した。L540cy、即ち異種移植片増殖に適合されたHD系統L540の誘導体はDr. Harald Stein(Institut fuer Pathologie, University Veinikum Benjamin Franklin, Berlin, Germany)により開発された。細胞系統は10%ウシ胎児血清を添加したRPMI-1640培地(Life Technologies, Gaithersburg, MD)中で増殖させた。

【0218】

cAC10変異体およびその相当するADCの競合結合を行うことにより抗原結合に対する変異および薬剤コンジュゲーションの影響を調べた。概すれば、CD30陽性Karpas-299細胞を、氷上で30分間、染色培地(50mM Tris-HCl pH8.0、0.9%NaCl(w/v)、0.5%ウシ血清アルブミン(w/v)、10μM EDTA)中ユーロピウム(Perkin Elmer, Boston, MA)で標識した1μg/ml cAC10の存在下、cAC10の親抗体、変異体または相当するADC(実施例1に記載の通り製造)の連続希釈物と混合し、次に氷冷染色培地で2回洗浄した。標識された細胞はFusion HTマイクロプレートリーダー(Perkin Elmer)を用いて検出した。試料のデータはベースライン補正し、1μg/ml cAC10-ユーロピウム単独で染色した細胞の蛍光で割った試料蛍光により計算した最大蛍光のパーセントとして報告した。

【0219】

cAC10Cys→Ser変異体コンジュゲートを投与したCD30陽性Karpas 299またはL540cy細胞またはCD30陰性WSU-NHL細胞の増殖阻害は、コンジュゲートを細胞と共に92時間インキュベートし、その後、37℃4時間50μMレサズリンと共にインキュベートすることにより調べた。染料の還元はFusion HTマイクロプレートリーダーを用いて測定した。データはPrism v4.01(GraphPad Software Inc, San Diego, CA)を用いて非最小自乗4パラメーターフィットにより分析した。

【0220】

(結果)

競合結合実験によれば、Cys→Ser変異(表1)およびMMAEコンジュゲーション(表5)の何れも抗原結合を損なわなかった。次に、cAC10Cys→Ser変異体コンジュゲートの細胞傷害性をCD30陽性(Karpas-299およびL540cy)および陰性(WSU-NHL)細胞系統において評価した。C2v1-E2およびC2

(54)

特表2008-521828(P2008-521828A)

v2-E2コンジュゲートは両方のCD30陽性細胞系統に対してC2-E2と極めて同様の力価を有していた(表5)。同様に、C4v1-E4、C4v2-E4、C8-E4MおよびC8-E4は試験した両方のCD30陽性細胞系統に対して同様の活性を示した(表5)。即ち、薬剤結合の化学量論の部位を厳密に定義することはコンジュゲートの細胞傷害性活性に有意な影響を与えなかった。2から4MMAE/Abに薬剤負荷量を増大させたところ、以前の観察(Hamblet et al., 前出)と合致して力価が増大した(IC_{50} の低下)。CD30陰性WSU-NHL細胞は全てのcAC10ADCに対して無反応であった。

【0221】

【表5】

表 5

抗体薬剤コンジュゲートの生成および特徴付け

cAC10 薬剤コン ジュゲート*	コンジュ ゲートの 収率%†	1 g当たり の薬剤: 方法1‡ 方法2‡	単量体%§ Karpas-299 への結合	Karpas-299 細胞傷害性 (IC_{50} , nM)	L540cy 細胞傷害性 (IC_{50} , nM)	単回用量 MTD (mg/kg)
C2v1-E2	92.7	2.0, 1.9	98.4	2.9 ± 0.3	0.28 ± 0.03	40
C2v2-E2	88.9	2.1, 1.8	98.5	2.5 ± 0.1 #	0.27 ± 0.02	60
C8-E2	27.4	2.0, 2.0	99.7	2.8 ± 0.2	0.28 ± 0.02	40
C8-E2M	97.3	2.0, 2.0	n/d	n/d	n/d	n/d
C4v1-E4	90.6	4.0, 3.8	99.2	3.2 ± 0.1	0.13 ± 0.01	20
C4v2-E4	96.0	4.1, 3.8	99.0	2.8 ± 0.2	0.12 ± 0.01	<20
C8-E4	10.8	4.0, 4.0	99.5	2.4 ± 0.3	0.18 ± 0.04	20
C8-E4M	95	4.4, 4.4	98.8	3.0 ± 0.4	0.07 ± 0.02	<20

全ADC調製物中の遊離の薬剤は検出限界未満であった(<0.05%)。
*ADCはそのcAC10変異体名(表1参照)薬剤MMAEの負荷量、および薬剤の化学量論が可変(M)であるか固定されているかにより識別される。例えば、C8-E4MおよびC8-E2Mはそれぞれ、1 g当たり平均4 (0~8の範囲) および2 (0~8の範囲) 等量のMMAEを負荷された親抗体cAC10を示す。固定された化学量論のADCであるC8-E4およびC8-E2は疎水性相互作用クロマトグラフィーによる可変化学量論のADCであるC8-E2Mの精製により得られた。

†精製された抗体のパーセントとして得られたコンジュゲートの収率。

‡方法1および方法2とは、波長248 nmおよび280 nmでの吸光度の比(Hamblet et al., 2004)ならびに還元条件下の逆相HPLC分析(図6)を指す。

§サイズ排除クロマトグラフィーにおけるピーク面積から推定。

|| 出発cAC10タンパク質を基準とした、疎水性相互作用クロマトグラフィー後の収率パーセント。

3以上の独立した実験の平均(±SEM)。

(インビボのCys-Ser変異体コンジュゲートの抗腫瘍活性)

(異種移植片モデル)

5 × 10⁶ Karpas-299またはL540cy細胞をC.B-17SCIDマウ

(55)

特表2008-521828(P2008-521828A)

ス(Harlan, Indianapolis, IN)の右体側に移植することにより、それぞれ未分化大細胞型リンパ腫またはホジキン病の皮下疾患モデルを樹立した。腫瘍体積は式 $(A \times B^2) / 2$ で計算し、ここでAおよびBはそれぞれ最も大きい、および次に大きい直行腫瘍寸法とした。平均腫瘍体積が 100mm^3 となったとき、腫瘍担持マウスを無作為に8〜10匹の群に分割した。マウスの群は未投与のままとするか、ADCの単回静脈内投与を行った。L540cy異種移植片試験の場合は、使用した用量は2剤/Abコンジュゲートの場合は6.0および12.0mg/kg、そして4剤/Abコンジュゲートの場合は3.0および6.0mg/kgとした。Karpas299異種移植片モデルの場合は、使用した用量は2剤/Abコンジュゲートの場合は0.5、1.0および2.0mg/kg、そして4剤/Abコンジュゲートの場合は0.5および1.0mg/kgとした。触診できない程度に縮小した腫瘍は完全な退行と定義した。腫瘍移植後100日を越えて持続した完全な退行は「治癒」と定義した。腫瘍体積が $\sim 1000\text{mm}^3$ に達したとき、動物を安楽死させた。

【0222】

(結果)

cAC10Cys→Ser変異体薬剤コンジュゲート、C2v1-E2、C2v2-E2、C4v1-E4およびC4v2-E4の薬効を、SCIDマウスにおいて、未分化大細胞型リンパ腫(Karpas-299)またはホジキン病(L540cy)の皮下異種移植片モデルにおいて親抗体C8-E2、C8-E4およびC8-E4Mのコンジュゲートと比較した。概すれば、 100mm^3 のL540cy腫瘍(平均の大きさ)を担持したマウスには単回、2剤/Abコンジュゲート(6.0または12.0mg/kg)または4剤/Abコンジュゲート(3.0または6.0mg/kg)または未投与のままとした。C2v1-E2およびC2v2-E2の投与への応答は同等であり、6.0および12.0mg/kg用量の両方において完全な退行が誘導された(図7A、7B)。C8-E2はC2v1-E2およびC2v2-E2よりも僅かに高力価であり、両方の用量水準で治癒が達成された(図3A、B)。2剤負荷コンジュゲートの単回用量を投与されたKarpas299異種移植片モデルは同様の応答の傾向を示し、C2v1-E2およびC2v2-E2で10匹中3匹の完全な退行およびC8-E2で10匹中8匹の完全な退行が1mg/kgの用量で達成された(データ示さず)。C4v1-E4、C4v2-E4、C8-E4およびC8-E4MのL540cy異種移植片モデルへの投与は同等の応答をもたらし、各ADCについて3および6mg/kgの両方において治癒が達成された(図7C、D)。0.5および1mg/kgにおける4剤負荷変異体のKarpas299モデルへの投与もまた分子間の差を示さなかった(データを示さず)。

【0223】

(最大耐容用量の決定および分析)

各ADCの単回用量耐容性をSprague-Dawleyラットにおいて決定した(Harlan, IN)。3匹のラットの群に40〜80mg/kgのC2v1-E2、C2v2-E2およびC8-E2ならびに20〜40mg/kgのC4v1-E4、C4v2-E4、C8-E4およびC8-E4Mを尾静脈を介して注射し、単回最大耐容用量(MTD)を決定した。ラットは14日間に渡り毎日モニタリングし、体重および臨床観察結果の両方を記録した。窮迫の顕著な兆候を発症したラットは安楽死させた。最大耐容用量は、>20%の体重減少または重度の窮迫兆候を何れの動物にも誘導しなかった最高用量として定義した。

【0224】

2剤負荷コンジュゲートについては、ラットには40、60および80mg/kgを投与した。40mg/kg用量は十分耐容性を示したのに対し、60mg/kg用量はC2v2-E2を投与したラットによってのみ十分な耐容性が示された。C2v1-E2の60mg/kgを注射した一匹は第7日に屠殺し、残余の2匹は第8日に最大体重減少6%を示したがその後は体重減少は回復した。C8-E2の60mg/kgを投与した一匹は11%の体重減少を示し、第11日に死亡していた。各2剤負荷ADCの80mg/kg用

(56)

特表2008-521828(P2008-521828A)

量には十分な耐容性が示されなかった。これらのデータに基づけば、C2v1-E2、C2v2-E2およびC8-E2のMTDはそれぞれ40、60および40mg/kgであることが分かった。4剤負荷ADCは各々20、30および40mg/kgで投与した。C4v1-E4およびC8-E4の20mg/kgを注射した動物は副作用を経験しなかったのに対し、C4v2-E4およびC8-E4Mの20mg/kgを投与された群の数匹は窮迫の兆候を示し、各群の一匹は第9日に屠殺した。各4剤負荷ADCの30および40mg/kgの高用量は耐容性が示されなかった。C4v1-E4およびC8-E4のMTDは20mg/kgであることがわかり、C4v2-E4およびC8-E4MのMTDは<20mg/kgであることがわかった。

【0225】

本明細書において言及または組み込んだ如何なる特許または特許出願も明確または絶対的に許可を付与されたわけではない。上記した考察は説明、解説および例示であり、添付の特許請求の範囲により定義される範囲を限定するものではない。

【0226】

特許出願、特許および学術文献を含む種々の参考文献を本明細書において引用したが、それらの各々の開示は参照により全体が本明細書に援用される。

【図面の簡単な説明】

【0227】

【図1】図1は抗体Cys→Ser変異体および相当する抗体薬剤コンジュゲート(ADC)の設計および分析を示す。(A)接触可能なシステインの位置(ひし形)、鎖間ジスルフィド結合(—)および後にコンジュゲートされる薬剤(+)を明示した抗体変異体ならびに薬剤のコンジュゲートの模式図。抗体およびADCはその変異体名称(表1参照)、および薬剤MMAEの負荷の化学量論により識別される。例えばC8-E8はcAC10親抗体(C8)中の全て8つの溶媒接触可能な鎖間システイン残基がMMAE(E8)にコンジュゲートしているADCを示す。(B)非還元条件下の抗体変異体のSDS-PAGE分析。HLL、HH、HL、HおよびLはそれぞれ抗体重鎖-軽鎖4量体、重鎖2量体、重鎖軽鎖2量体、重鎖および軽鎖に関する移行パターンを示す。(C)還元条件下のMMAEを有する抗体変異体コンジュゲートのSDS-PAGE分析。

【図2】図2はMC-vcMMAEにコンジュゲートした抗体システイン変異体および親cAC10抗体を用いた成育増殖試験の滴定プロファイルを示す。(A)cAC10ADCのC2v1-E2、C4v1-E4、C4v2-E4、C6v1-E6およびC8-E4の連続する希釈物をKarpas-299細胞と共に96時間インキュベートした。次に[H³]-TdRを添加し、その取り込みを測定した。(B)Karpas-299細胞はcAC10ADCのC2v1-E2、C2v2-E2およびC8-E2と共に96時間インキュベートした。次にレサズリンを添加して染料還元を測定した。

【図3】図3はMC-vcMMAEにコンジュゲートした抗体システイン変異体および親cAC10抗体を投与したKarpas-299皮下異種移植片を担持するSCIDマウスにおける単回用量薬効試験を示す。マウスには2mg/kgのC2v1-E2およびC8-E2(A)ならびに1mg/kgのC4v1-E4、C4v2-E4およびC8-E4(B)の単回用量を投与した。

【図4】図4はプラスミドマップpBSSK-AC10Hである。

【図5】図5はプラスミドマップpBSSK-AC10Lである。

【図6】図6は還元条件下のADCの逆相HPLC分析を示す。(A)C8-E4M。(B)C8-E4。(C)C4v1-E4。(D)C4v2-E4(表1参照)。ピークは248nmおよび280nmの波長におけるその吸収の比により識別した。L-E0およびL-E1はそれぞれMMAEの0または1等量を負荷した軽鎖を示すために使用し、H-E0、H-E1、H-E2およびH-E3はそれぞれMMAEの0、1、2または3等量を負荷した重鎖を示すために使用した。


【図7】図7はL540cy皮下異種移植片を担持するSCIDマウスにおける単回用量薬効試験を示す。マウスには腫瘍移植の12日後に単回用量のC2v1-E2、C2v2

(5 7)


特表2008-521828 (P2008-521828A)

-E 2およびC 8-E 2を6 m g / k g (A)または1 2 m g / k g (B)で投与した。
マウスにはC 4 v 1-E 4、C 4 v 2-E 4、C 8-E 4およびC 8-E 4 Mは3 m g /
k g (C)および6 m g / k g (D)で投与した。

【図1】



【図2】



特表2008-521828 (P2008-521828A)

【例4】

Figure 4

[illegible]

【例6】

Figure 6





Figure 7

2008521828000001.xml



(5 9)

特表2008-521828 (P2008-521828A)

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月17日(2007.8.17)

【配列表】1】

2008521828000001.app 明書

【補正対象項目名】配列表

【補正方法】追加

【補正の内容】

(6 0)

特表2008-521828(P2008-521828A)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US05/43257										
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC: C07K 16/00(2006.01);16/28(2006.01);A61K 39/395(2006.01);G01N 33/53(2006.01) USPC: 530/391.3,391.7;424/178.1,179.1,181.1;435/7.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC												
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 530/391.3,391.7; 424/178.1,179.1,181.1; 435/7.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, SCISEARCH, CAPLUS on STN; WEST, PGPub												
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category *</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>SUN M.M. Reduction-Alkylation Strategies for the Modification of Specific Monoclonal Antibody Disulfides Bioconjugate Chem, Vol 16, pages 1281-1290, see entire document, especially page 1285, col. 2, Figure 4.</td> <td>1-40</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>McDONAGH CF Engineered Antibody-drug Conjugates with Defined Sites and Stoichiometries of Drug Attachment Protein Eng Des Sel July 2006 Vol 19, No. 7, pages 299-307, see entire document, especially abstract.</td> <td>1-40</td> </tr> </tbody> </table>			Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	A	SUN M.M. Reduction-Alkylation Strategies for the Modification of Specific Monoclonal Antibody Disulfides Bioconjugate Chem, Vol 16, pages 1281-1290, see entire document, especially page 1285, col. 2, Figure 4.	1-40	A	McDONAGH CF Engineered Antibody-drug Conjugates with Defined Sites and Stoichiometries of Drug Attachment Protein Eng Des Sel July 2006 Vol 19, No. 7, pages 299-307, see entire document, especially abstract.	1-40	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.										
A	SUN M.M. Reduction-Alkylation Strategies for the Modification of Specific Monoclonal Antibody Disulfides Bioconjugate Chem, Vol 16, pages 1281-1290, see entire document, especially page 1285, col. 2, Figure 4.	1-40										
A	McDONAGH CF Engineered Antibody-drug Conjugates with Defined Sites and Stoichiometries of Drug Attachment Protein Eng Des Sel July 2006 Vol 19, No. 7, pages 299-307, see entire document, especially abstract.	1-40										
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.												
* Special categories of cited documents: <table border="0"> <tbody> <tr> <td>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</td> <td>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</td> </tr> <tr> <td>"E" earlier application or patent published on or after the international filing date</td> <td>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</td> </tr> <tr> <td>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</td> <td>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</td> </tr> <tr> <td>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</td> <td>"Z" document member of the same patent family</td> </tr> <tr> <td>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	"E" earlier application or patent published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"Z" document member of the same patent family	"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention											
"E" earlier application or patent published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone											
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art											
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"Z" document member of the same patent family											
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed												
Date of the actual completion of the international search 02 January 2007 (02.01.2007)		Date of mailing of the international search report 23 MAR 2007										
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (571) 273-3201		Authorized officer Phuong Huynh Telephone No. (571) 272-1600										

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

(6 1)

特表2008-521828(P2008-521828A)

(51)Int. Cl.	F I		テーマコード (参考)
C 0 7 K 16/28 (2006.01)	C 0 7 K	16/28	
C 0 7 K 19/00 (2006.01)	C 0 7 K	19/00	
C 1 2 P 21/02 (2006.01)	C 1 2 P	21/02	C
A 6 1 K 39/395 (2006.01)	A 6 1 K	39/395	C
A 6 1 K 38/00 (2006.01)	A 6 1 K	39/395	L
A 6 1 K 51/00 (2006.01)	A 6 1 K	37/02	
A 6 1 K 49/00 (2006.01)	A 6 1 K	49/02	A
A 6 1 P 31/04 (2006.01)	A 6 1 K	49/00	A
A 6 1 P 31/12 (2006.01)	A 6 1 K	39/395	D
A 6 1 P 31/00 (2006.01)	A 6 1 K	39/395	N
A 6 1 P 35/00 (2006.01)	A 6 1 P	31/04	
G 0 1 N 33/574 (2006.01)	A 6 1 P	31/12	
G 0 1 N 33/569 (2006.01)	A 6 1 P	31/00	
G 0 1 N 33/564 (2006.01)	A 6 1 P	35/00	
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	A 6 1 K	39/395	E
	A 6 1 K	39/395	Q
	A 6 1 K	39/395	R
	A 6 1 K	39/395	S
	A 6 1 K	39/395	T
	A 6 1 K	39/395	U
	G 0 1 N	33/574	
	G 0 1 N	33/569	B
	G 0 1 N	33/569	G
	G 0 1 N	33/564	
	C 1 2 N	15/00	A

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 マクドナグ, シャーロット
アメリカ合衆国 ワシントン 98021, ボセル, 30ティールエイチ ドライブ サウス
イースト 21823

(72)発明者 カーター, ボール
アメリカ合衆国 ワシントン 98021, ボセル, 30ティールエイチ ドライブ サウス
イースト 21823

F ターム(参考) 4B024 AA01 AA11 BA42 BA43 BA48 BA51 CA04 CA05 CA06 CA07
CA09 CA10 DA02 EA04 FA02 FA10 GA05 GA11 GA13 GA18
GA27 HA03 HA08 HA14
4B064 AG26 CA10 CA19 CC24 CE11 CE12 DA01 DA13
4C084 AA02 BA01 BA08 BA14 BA23 BA31 BA42 CA59 DA41 DA42
MA05 NA05 NA06 NA13 ZB26 ZB32 ZB33 ZB35
4C085 AA13 AA14 AA19 AA21 AA22 AA25 AA26 AA27 BA07 BA51

(6 2)

特表2008-521828(P2008-521828A)

	BB01	BB11	BB16	BB17	BB18	BB21	BB23	BB36	BB37	BB41
	BB43	CC07	CC08	CC21	DD51	DD62	EE01	EE05		
4H045	AA10	AA20	AA30	BA10	BA41	CA01	CA10	CA40	DA75	EA20
	EA50	FA72	FA74	GA23	GA26					

J P 2009- 538629 A 2009. 11. 12

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2009-538629**(P2009-538629A)**

(43) 公表日 平成21年11月12日(2009. 11. 12)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/09 (2006. 01)	C 1 2 N 15/00 Z N A A	2 G O 5 4
C O 7 K 16/28 (2006. 01)	C O 7 K 16/28	4 B O 2 4
C 1 2 N 5/10 (2006. 01)	C 1 2 N 5/00 B	4 B O 6 4
C 1 2 P 21/08 (2006. 01)	C 1 2 P 21/08	4 B O 6 5
A 6 1 K 39/395 (2006. 01)	A 6 1 K 39/395 D	4 C O 8 5
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 206 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2009-513419 (P2009-513419)	(71) 出願人	596168317
(86) (22) 出願日	平成19年5月29日 (2007. 5. 29)		ジェネンテック・インコーポレーテッド
(85) 翻訳文提出日	平成21年2月2日 (2009. 2. 2)		GENENTECH, INC.
(86) 国際出願番号	PCT/US2007/069889		アメリカ合衆国カリフォルニア・9408
(87) 国際公開番号	W02007/140371		O-4990・サウス・サン・フランシス
(87) 国際公開日	平成19年12月6日 (2007. 12. 6)		コ・ディーエヌエー・ウェイ・1
(31) 優先権主張番号	60/809, 328	(74) 代理人	100109726
(32) 優先日	平成18年5月30日 (2006. 5. 30)		弁理士 園田 吉隆
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(74) 代理人	100101199
(31) 優先権主張番号	60/908, 941		弁理士 小林 義敦
(32) 優先日	平成19年3月29日 (2007. 3. 29)	(72) 発明者	エベンス, アレン, ジェイ., ジュ
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ニア,
(31) 優先権主張番号	60/911, 829		アメリカ合衆国 カリフォルニア 940
(32) 優先日	平成19年4月13日 (2007. 4. 13)		70, サン カルロス, アロヨ アベ
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ニュー 1932
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 抗体およびイムノコンジュゲートとこれらの使用方法

(57) 【要約】

抗 C D 2 2 抗体およびそのイムノコンジュゲートが提供される。抗 C D 2 2 抗体およびそのイムノコンジュゲートの使用方法が提供される。

(2)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(a) 配列番号：9、10、19から23、32および33から選択されるアミノ酸配列を含むHVR-L1と、(b)

(1) 配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1、

(2) 配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2、

(3) 配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3、

(4) 配列番号：12のアミノ酸配列を含むHVR-L2、および、

(5) 配列番号：14のアミノ酸配列を含むHVR-L3

から選択される少なくとも1つ、2つ、3つ、4つ又は5つのHVRとを含んでなる、CD22に結合する抗体。

10

【請求項 2】

配列番号：10のコンセンサス配列に一致するアミノ酸配列を含むHVR-L1を含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 3】

さらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2、及び配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3を含んでなる、請求項2に記載の抗体。

【請求項 4】

HVR-L1が配列番号：9を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

20

【請求項 5】

HVR-L1が配列番号：19を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 6】

HVR-L1が配列番号：20を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

30

【請求項 7】

HVR-L1が配列番号：21を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 8】

HVR-L1が配列番号：22を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 9】

HVR-L1が配列番号：23を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

40

【請求項 10】

HVR-L1が配列番号：32を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 11】

HVR-L1が配列番号：33を含み、抗体がさらに、配列番号：2のアミノ酸配列を含むHVR-H1と、配列番号：4のアミノ酸配列を含むHVR-H2と、配列番号：6のアミノ酸配列を含むHVR-H3とを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

50

(3)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

【請求項 1 2】

さらに、V HサブグループIIIコンセンサスフレームワークおよびV LサブグループIコンセンサスフレームワークから選択される少なくとも1つのフレームワークを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 1 3】

抗体が、配列番号：16から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する重鎖可変ドメインを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 1 4】

抗体が、配列番号：17から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

10

【請求項 1 5】

抗体が、配列番号：18から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 1 6】

抗体が、配列番号：1、3、5及び7から選択される1つ、2つ、3つ又は4つのフレームワークアミノ酸配列を含む重鎖可変ドメインを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 1 7】

抗体が、配列番号：8、11、13及び15から選択される1つ、2つ、3つ又は4つのフレームワークアミノ酸配列を含む軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

20

【請求項 1 8】

さらに、配列番号：17から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項13に記載の抗体。

【請求項 1 9】

さらに、配列番号：18から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項13に記載の抗体。

【請求項 2 0】

抗体が、配列番号：88から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する重鎖を含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 2 1】

抗体が、配列番号：87から選択されるアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖を含んでなる、請求項1に記載の抗体。

30

【請求項 2 2】

抗体が、配列番号：88のアミノ酸配列を有する重鎖と配列番号：87のアミノ酸配列を有する軽鎖を含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 2 3】

配列番号：16のアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する重鎖可変ドメインを含んでなる、CD22に結合する抗体。

【請求項 2 4】

さらに、配列番号：17のアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項23に記載の抗体。

40

【請求項 2 5】

さらに、配列番号：18のアミノ酸配列に少なくとも90%の配列同一性を有する軽鎖可変ドメインを含んでなる、請求項23に記載の抗体。

【請求項 2 6】

抗体が、ハイブリドーマATCC受託番号PTA-7621(10F4.4.1)によって産生される抗体の1つ、2つ、3つ、4つ、5つ又は6つのHVRをを含んでなる、請求項1に記載の抗体。

【請求項 2 7】

抗体が、ハイブリドーマATCC受託番号PTA-7620(5E8.1.8)によって

50

(4)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

産生される抗体の１つ、２つ、３つ、４つ、５つ又は６つのＨＶＲを含んでなる抗体。

【請求項２８】

抗体がヒト化されている、請求項１に記載の抗体。

【請求項２９】

抗体がヒト化されている、請求項２３に記載の抗体。

【請求項３０】

ＣＤ２２が哺乳類のＣＤ２２である、請求項１に記載の抗体。

【請求項３１】

ＣＤ２２が齧歯目のＣＤ２２および霊長類のＣＤ２２から選択される、請求項３０に記載の抗体。

10

【請求項３２】

ＣＤ２２がヒトのＣＤ２２である、請求項３１に記載の抗体。

【請求項３３】

ＣＤ２２が哺乳類のＣＤ２２である、請求項２３に記載の抗体。

【請求項３４】

ＣＤ２２が齧歯目のＣＤ２２および霊長類ＣＤ２２から選択される、請求項３３に記載の抗体。

【請求項３５】

ＣＤ２２がヒトのＣＤ２２である、請求項３４に記載の抗体。

【請求項３６】

請求項１に記載の抗体をコードするポリヌクレオチド。

20

【請求項３７】

請求項２３に記載の抗体をコードするポリヌクレオチド。

【請求項３８】

請求項３６に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。

【請求項３９】

請求項３７に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。

【請求項４０】

請求項３８に記載のベクターを含む宿主細胞。

【請求項４１】

請求項３９に記載のベクターを含む宿主細胞。

30

【請求項４２】

宿主細胞が真核細胞である、請求項４０に記載の宿主細胞。

【請求項４３】

宿主細胞がＣＨＯ細胞である、請求項４２に記載の宿主細胞。

【請求項４４】

宿主細胞が真核細胞である、請求項４１に記載の宿主細胞。

【請求項４５】

宿主細胞がＣＨＯ細胞である、請求項４４に記載の宿主細胞。

【請求項４６】

a) 抗体をコードするポリヌクレオチドの発現に適切な条件下で請求項３８に記載の宿主細胞を培養し、b) 抗体を単離することを含んでなる、抗ＣＤ２２抗体の作製方法。

40

【請求項４７】

a) 抗体をコードするポリヌクレオチドの発現に適切な条件下で請求項３９に記載の宿主細胞を培養し、b) 抗体を単離することを含んでなる、抗ＣＤ２２抗体の作製方法。

【請求項４８】

ＣＤ２２が細胞の表面に発現される、請求項２８に記載の抗体。

【請求項４９】

細胞がＢ細胞である、請求項４８に記載の抗体。

【請求項５０】

50

(5)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

C D 2 2 が細胞の表面に発現される、請求項 2 9 に記載の抗体。

【請求項 5 1】

C D 2 2 が B 細胞である、請求項 5 0 に記載の抗体。

【請求項 5 2】

抗体が配列番号：2 7 のアミノ酸 2 2 - 2 4 0 の C D 2 2 の領域内のエピトープに結合する、請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 5 3】

抗体が配列番号：2 7 のアミノ酸 2 2 - 2 4 0 の C D 2 2 の領域内のエピトープに結合する、請求項 2 3 に記載の抗体。

【請求項 5 4】

B 細胞が B 細胞増殖性疾患と関係している、請求項 4 9 に記載の抗体。

【請求項 5 5】

B 細胞増殖性疾患が癌である、請求項 5 4 に記載の抗体。

【請求項 5 6】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(N H L)、中悪性度 N H L、再発性中悪性度 N H L、再発性低悪性度 N H L、抵抗性 N H L、抵抗性低悪性度 N H L、慢性リンパ球性白血病(C L L)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(H C L)、急性リンパ球性白血病(A L L)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 5 4 に記載の抗体。

【請求項 5 7】

B 細胞が B 細胞増殖性疾患と関係している、請求項 5 1 に記載の抗体。

【請求項 5 8】

B 細胞増殖性疾患が癌である、請求項 5 7 に記載の抗体。

【請求項 5 9】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(N H L)、中悪性度 N H L、再発性中悪性度 N H L、再発性低悪性度 N H L、抵抗性 N H L、抵抗性低悪性度 N H L、慢性リンパ球性白血病(C L L)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(H C L)、急性リンパ球性白血病(A L L)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 5 7 に記載の抗体。抗体がモノクローナル抗体である、請求項 1 から 1 4、1 6 から 2 3 及び 3 0 から 3 3 のいずれかに記載の抗体。

【請求項 6 0】

抗体がモノクローナル抗体である、請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 6 1】

抗体が F a b、F a b'-S H、F v、s c F v 又は(F a b')₂ 断片から選択される抗体断片である、請求項 6 0 に記載の抗体。

【請求項 6 2】

抗体がヒト化されている、請求項 6 0 に記載の抗体。

【請求項 6 3】

抗体がヒトである、請求項 6 0 に記載の抗体。

【請求項 6 4】

抗体がモノクローナル抗体である、請求項 2 3 に記載の抗体。

【請求項 6 5】

抗体が F a b、F a b'-S H、F v、s c F v 又は(F a b')₂ 断片から選択される抗体断片である、請求項 6 4 に記載の抗体。

【請求項 6 6】

抗体がヒト化されている、請求項 6 4 に記載の抗体。

【請求項 6 7】

抗体がヒトである、請求項 6 4 に記載の抗体。

【請求項 6 8】

抗体が、A T C C P T A - 7 6 2 1 (1 0 F 4 . 4 . 1) ; A T C C P T A - 7 6 2 0 (

10

20

30

40

50

(6)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

5 E 8 . 1 . 8) ; 及び、配列番号 : 8 8 の重鎖配列と配列番号 : 8 7 の軽鎖配列を含む抗体から選択した抗体と同じエピトープに結合する、請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 6 9】

抗体が、A T C C P T A - 7 6 2 1 (1 0 F 4 . 4 . 1) ; A T C C P T A - 7 6 2 0 (5 E 8 . 1 . 8) ; 及び、配列番号 : 8 8 の重鎖配列と配列番号 : 8 7 の軽鎖配列を含む抗体から選択した抗体と同じエピトープに結合する、請求項 2 3 に記載の抗体。

【請求項 7 0】

C D 2 2 への抗体の結合に許容される条件下で請求項 1 に記載の抗体に生体試料を接触させ、抗体と C D 2 2 との間で複合体が形成されるかどうかを検出することを含む、生体試料中の C D 2 2 の存在を検出する方法。

10

【請求項 7 1】

生体試料が B 細胞増殖性疾患があると疑われる患者のものである、請求項 7 0 に記載の方法。

【請求項 7 2】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫 (N H L) 、中悪性度 N H L 、再発性中悪性度 N H L 、再発性低悪性度 N H L 、抵抗性 N H L 、抵抗性低悪性度 N H L 、慢性リンパ球性白血病 (C L L) 、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病 (H C L) 、急性リンパ球性白血病 (A L L) およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 7 1 に記載の抗体。

【請求項 7 3】

20

C D 2 2 への抗体の結合に許容される条件下で請求項 2 3 に記載の抗体に生体試料を接触させ、抗体と C D 2 2 との間で複合体が形成されるかどうかを検出することを含む、生体試料中の C D 2 2 の存在を検出する方法。

【請求項 7 4】

生体試料が B 細胞増殖性疾患があると疑われる患者のものである、請求項 7 3 に記載の方法。

【請求項 7 5】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫 (N H L) 、中悪性度 N H L 、再発性中悪性度 N H L 、再発性低悪性度 N H L 、抵抗性 N H L 、抵抗性低悪性度 N H L 、慢性リンパ球性白血病 (C L L) 、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病 (H C L) 、急性リンパ球性白血病 (A L L) およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 7 4 に記載の抗体。

30

【請求項 7 6】

細胞障害性剤に共有結合的に付着した請求項 1 に記載の抗体を含んでなるイムノコンジュゲート。

【請求項 7 7】

細胞障害性剤に共有結合的に付着した請求項 2 3 に記載の抗体を含んでなるイムノコンジュゲート。

【請求項 7 8】

細胞障害性剤が、毒素、化学療法剤、薬剤成分、抗生物質、放射性同位体および核酸分解酵素から選択される、請求項 7 6 に記載のイムノコンジュゲート。

40

【請求項 7 9】

イムノコンジュゲートが、式 $A b - (L - D) p$ を有し、

(a) A b が請求項 1 に記載の抗体であり、

(b) L がリンカーであり、

(c) D が薬剤成分である、請求項 7 8 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 8 0】

L は、6 - マレイミドカプロイル (M C) 、マレイミドプロパノイル (M P) 、バリン - シトルリン (v a l - c i t) 、アラニン - フェニルアラニン (a l a - p h e) 、 p - アミノベンジルオキシカルボニル (P A B) 、 N - スクシンイミジル 4 (2 - ピリジルチオ) ペンタ

50

(7)

J P 2009-538629 A 2009.11.12


ノエート(S P P)、N-スクシンイミジル4-(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1カルボキシレート(S M C C)、及びN-スクシンイミジル(4-イオド-アセチル)アミノ安息香酸エステル(S I A B)から選択される、請求項79に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項81】


Dがアウリスタチン類およびドロスタチン類から選択される、請求項79に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項82】

Dが以下の式D_E又はD_Fの薬剤成分であり、



10



20

D_F

ここにおいて、R²およびR⁶は各々メチルであり、R³およびR⁴は各々イソプロピルであり、R⁷はsec-ブチルであり、各々のR⁸はCH₃、O-CH₃、OHおよびHから独立して選択され、R⁹はHであり、R¹⁰はアリールであり、Zは-O-又は-NHであり、R¹¹は、H、C₁-C₈アルキル、又は-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-O-CH₃であり、そしてR¹⁸は-C(R⁸)₂-C(R⁸)₂-アリールであり、そして、

30

(d) pはおよそ1から8まで変動する、
請求項81に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項83】

インビトロ又はインビボの細胞殺傷活性を有する、請求項76に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項84】

リンカーが抗体上のチオール基によって抗体に付着される、請求項79に記載のイムノコンジュゲート。

40

【請求項85】

リンカーがプロテアーゼによって切断される、請求項79に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項86】

リンカーがval-citジペプチドを含む、請求項80に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項87】

リンカーがp-アミノベンジルユニットを含む、請求項79に記載のイムノコンジュゲート。

50

(8)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

【請求項 8 8】

リンカーが 6-マレイミドカプロイルを含む、請求項 8 0 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 8 9】

薬剤が M M A E および M M A F から選択される、請求項 8 2 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 0】

薬剤が M M A E である、請求項 8 9 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 1】

薬剤が M M A F である、請求項 8 9 に記載のイムノコンジュゲート。

10

【請求項 9 2】

細胞障害性剤が、毒素、化学療法剤、薬剤成分、抗生物質、放射性同位体および核酸分解酵素から選択される、請求項 7 7 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 3】

イムノコンジュゲートが、式 $A b - (L - D) p$ を有し、

(a) A b が請求項 2 3 に記載の抗体であり、

(b) L がリンカーであり、

(c) D が薬剤成分である、

請求項 9 2 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 4】

20

L は、6-マレイミドカプロイル(M C)、マレイミドプロパノイル(M P)、バリン-シトルリン(v a l - c i t)、アラニン-フェニルアラニン(a l a - p h e)、p-アミノベンジルオキシカルボンイル(P A B)、N-スクシンイミジル 4 (2-ピリジルチオ)ペンタノエート(S P P)、N-スクシンイミジル 4 -(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1カルボキシレート(S M C C)、及びN-スクシンイミジル(4-イオド-アセチル)アミノ安息香酸エステル(S I A B)から選択される、請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 5】

リンカー、L がプロテアーゼによって切断される、請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 6】

30

L が v a l - c i t ジペプチドを含む、請求項 9 4 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 7】

L が p-アミノベンジルユニットを含む、請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 8】

p-アミノベンジルユニットが p-アミノベンジルオキシカルボンイル(P A B)を含む、請求項 9 7 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 9 9】

L が 6-マレイミドカプロイル(M C)を含む、請求項 9 4 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 0】

40

リンカーが 6-マレイミドカプロイルおよび p-アミノベンジルオキシカルボンイルを含む、請求項 9 4 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 1】

イムノコンジュゲートが式 $A b - (L - M M A E) p$ を有し、このとき L はリンカーであり、p は 2 から 5 まで変動する、請求項 7 9 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 2】

L が v a l - c i t を含む、請求項 1 0 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 3】

L が M C を含む、請求項 1 0 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 4】

50

(9)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

L が P A B を含む、請求項 1 0 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 5】

L が M C - P A B を含む、請求項 1 0 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 6】

イムノコンジュゲートが式 $A b - (L - M M A E) p$ を有し、このとき L はリンカーであり、p は 2 から 5 まで変動する、請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 7】

L が v a l - c i t を含む、請求項 1 0 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 0 8】

L が M C を含む、請求項 1 0 6 に記載のイムノコンジュゲート。

10

【請求項 1 0 9】

L が P A B を含む、請求項 1 0 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 0】

L が M C - P A B を含む、請求項 1 0 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 1】

イムノコンジュゲートが式 $A b - (L - M M A F) p$ を有し、このとき L はリンカーであり、p は 2 から 5 まで変動する、請求項 7 9 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 2】

L が v a l - c i t を含む、請求項 1 1 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 3】

L が M C を含む、請求項 1 1 1 に記載のイムノコンジュゲート。

20

【請求項 1 1 4】

L が P A B を含む、請求項 1 1 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 5】

L が M C - P A B を含む、請求項 1 1 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 6】

イムノコンジュゲートが式 $A b - (L - M M A F) p$ を有し、このとき L はリンカーであり、p は 2 から 5 まで変動する、請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 7】

L が v a l - c i t を含む、請求項 1 1 6 に記載のイムノコンジュゲート。

30

【請求項 1 1 8】

L が M C を含む、請求項 1 1 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 1 9】

L が P A B を含む、請求項 1 1 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 2 0】

L が M C - P A B を含む、請求項 1 1 6 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 2 1】

D がメイタンシノイドである、請求項 7 9 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 2 2】

D が D M 1、D M 3 および D M 4 から選択される、請求項 1 2 1 に記載のイムノコンジュゲート。

40

【請求項 1 2 3】

インビトロ又はインビボの細胞殺傷活性を有する、請求項 1 2 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 2 4】

リンカーが抗体上のチオール基によって抗体に付着される、請求項 1 2 1 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 1 2 5】

リンカー L は、N-スクシンイミジル 4-(2-ピリジルチオ)ペンタノエート(S P P)、N-スクシンイミジル 4-(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1 カルボキシレート(S

50

(10)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

M C C)、及びN-スクシンイミジル(4-イオド-アセチル)アミノ安息香酸エステル(S I A B)から選択される、請求項121に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項126】

薬剤がDM1である、請求項122に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項127】

LがSP Pを含む、請求項122に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項128】

LがSM C Cを含む、請求項122に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項129】

pが2から4である、請求項122に記載のイムノコンジュゲート。

10

【請求項130】

pが3から4である、請求項122に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項131】

Dがメイタンシノイドである、請求項93に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項132】

DがDM1、DM3およびDM4から選択される、請求項131に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項133】

インビトロ又はインビボの細胞殺傷活性を有する、請求項131に記載のイムノコンジュゲート。

20

【請求項134】

リンカーが抗体上のチオール基によって抗体に付着される、請求項131に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項135】

リンカーLは、N-スクシンイミジル4-(2-ピリジルチオ)ペンタノエート(SP P)、N-スクシンイミジル4-(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1カルボキシレート(SM C C)、及びN-スクシンイミジル(4-イオド-アセチル)アミノ安息香酸エステル(S I A B)から選択される、請求項131に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項136】

薬剤がDM1である、請求項132に記載のイムノコンジュゲート。

30

【請求項137】

LがSP Pを含む、請求項136に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項138】

LがSM C Cを含む、請求項136に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項139】

pが2から4である、請求項136に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項140】

pが3から4である、請求項136に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項141】

請求項79に記載のイムノコンジュゲートと薬学的に許容される担体含有してなる製薬的組成物。

40

【請求項142】

個体に請求項141に記載の製薬的組成物の有効量を投与することを含む、B細胞増殖性疾患を治療する方法。

【請求項143】

B細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(N H L)、中悪性度N H L、再発性中悪性度N H L、再発性低悪性度N H L、抵抗性N H L、抵抗性低悪性度N H L、慢性リンパ球性白血病(C L L)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(H C L)、急性リンパ球性白血病(A L L)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項142に記載の方法。

50

(11)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

【請求項 1 4 4】

請求項 9 3 に記載のイムノコンジュゲートと薬学的に許容される担体を含有してなる製薬的組成物。

【請求項 1 4 5】

個体に請求項 1 4 4 に記載の製薬的組成物の有効量を投与することを含む、B 細胞増殖性疾患を治療する方法。

【請求項 1 4 6】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(NHL)、中悪性度 NHL、再発性中悪性度 NHL、再発性低悪性度 NHL、抵抗性 NHL、抵抗性低悪性度 NHL、慢性リンパ球性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(HCL)、急性リンパ球性白血病(ALL)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 1 4 5 に記載の方法。

10

【請求項 1 4 7】

請求項 7 6、7 7、7 8 又は 9 2 に記載のイムノコンジュゲートと薬学的に許容される担体を含有してなる製薬的組成物。

【請求項 1 4 8】

個体に請求項 1 4 7 に記載の製薬的組成物の有効量を投与することを含む、B 細胞増殖性疾患を治療する方法。

【請求項 1 4 9】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(NHL)、中悪性度 NHL、再発性中悪性度 NHL、再発性低悪性度 NHL、抵抗性 NHL、抵抗性低悪性度 NHL、慢性リンパ球性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(HCL)、急性リンパ球性白血病(ALL)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 1 4 8 に記載の方法。

20

【請求項 1 5 0】

CD 2 2 へのイムノコンジュゲートの結合に許容される条件下で細胞を請求項 7 9 に記載のイムノコンジュゲートに曝すことを含む、B 細胞増殖を阻害する方法。

【請求項 1 5 1】

B 細胞増殖性疾患が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(NHL)、中悪性度 NHL、再発性中悪性度 NHL、再発性低悪性度 NHL、抵抗性 NHL、抵抗性低悪性度 NHL、慢性リンパ球性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(HCL)、急性リンパ球性白血病(ALL)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 1 5 0 に記載の方法。

30

【請求項 1 5 2】

B 細胞が異種移植片である、請求項 1 5 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 3】

インビトロで曝す、請求項 1 5 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 4】

インビボで曝す、請求項 1 5 0 に記載の方法。

【請求項 1 5 5】

抗体が 0 . 6 から 1 . 0 の範囲のチオール反応値を有する一又は複数の遊離したシステインアミノ酸を含むシステイン改変抗体であり、該システイン改変抗体は、親抗体の一又は複数のアミノ酸残基をシステインに置換することを含む方法によって調製される、請求項 1 に記載の抗体。

40

【請求項 1 5 6】

システイン改変抗体が親抗体よりもチオ反応性試薬との反応性が高い、請求項 1 5 5 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 5 7】

前記方法が、チオール反応試薬とシステイン改変抗体を反応させることによってシステイン改変抗体のチオール反応性を決定することを更に含み、

50

(12)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

該システイン改変抗体が親抗体よりもチオ反応性試薬との反応性が高い、請求項 1 5 5 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 5 8】

ー又は複数の遊離システインアミノ酸残基が軽鎖に位置する、請求項 1 5 5 のシステイン改変抗体。

【請求項 1 5 9】

抗体が共有結合で細胞障害性剤に付着したシステイン改変抗体を含むイムノコンジュゲートである、請求項 1 5 5 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 0】

細胞障害性剤が、毒素、化学療法剤、薬剤成分、抗生物質、放射性同位体および核酸分解酵素から選択される、請求項 1 5 9 に記載のシステイン改変抗体。

10

【請求項 1 6 1】

抗体が、キャプチャ標識、検出標識又は固体担体に共有結合して付着される、請求項 1 5 5 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 2】

抗体がビオチンキャプチャ標識に共有結合して付着される、請求項 1 6 1 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 3】

抗体が蛍光色素検出標識に共有結合して付着される、請求項 1 6 1 に記載のシステイン改変抗体。

20

【請求項 1 6 4】

蛍光色素が、フルオレセイントイプ、ローダミンタイプ、ダンシル、リサミン、シアニン、フィコエリトリン、テキサスレッドおよびこれらのアナログから選択される、請求項 1 6 3 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 5】

抗体が³H、¹¹C、¹⁴C、¹⁸F、³²P、³⁵S、⁶⁴Cu、⁶⁸Ga、⁸⁶Y、⁹⁹Tc、¹¹¹In、¹²³I、¹²⁴I、¹²⁵I、¹³¹I、¹³³Xe、¹⁷⁷Lu、²¹¹Atおよび²¹³Biから選択される放射性核種検出標識に共有結合して付着される、請求項 1 6 1 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 6】

抗体がキレートリガンドによって検出標識に共有結合して付着される、請求項 1 6 1 に記載のシステイン改変抗体。

30

【請求項 1 6 7】

キレートリガンドがDOTA、DOTP、DOTMA、DTPAおよびTETAから選択される、請求項 1 6 6 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 6 8】

抗体が0.6から1.0の範囲のチオール反応値を有するー又は複数の遊離したシステインアミノ酸を含むシステイン改変抗体であり、該システイン改変抗体は、親抗体のー又は複数のアミノ酸残基をシステインに置換することを含む方法によって調製される、請求項 2 3 に記載の抗体。

40

【請求項 1 6 9】

システイン改変抗体が親抗体よりもチオ反応性試薬との反応性が高い、請求項 1 6 8 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 7 0】

前記方法が、チオール反応試薬とシステイン改変抗体を反応させることによってシステイン改変抗体のチオール反応性を決定することを更に含み、該システイン改変抗体が親抗体よりもチオ反応性試薬との反応性が高い、請求項 1 6 8 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 1 7 1】

ー又は複数の遊離システインアミノ酸残基が軽鎖に位置する、請求項 1 6 8 のシステイ

50

(13)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

ン改変抗体。

【請求項 172】

抗体が共有結合で細胞障害性剤に付着したシステイン改変抗体を含むイムノコンジュゲートである、請求項 168 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 173】

細胞障害性剤が、毒素、化学療法剤、薬剤成分、抗生物質、放射性同位体および核酸分解酵素から選択される、請求項 172 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 174】

抗体が、キャプチャ標識、検出標識又は固体担体に共有結合して付着される、請求項 168 に記載のシステイン改変抗体。

10

【請求項 175】

抗体がビオチンキャプチャ標識に共有結合して付着される、請求項 174 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 176】

抗体が蛍光色素検出標識に共有結合して付着される、請求項 174 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 177】

蛍光色素が、フルオレセインタイプ、ローダミンタイプ、ダンシル、リサミン、シアニン、フィコエリトリン、テキサスレッドおよびこれらのアナログから選択される、請求項 176 に記載のシステイン改変抗体。

20

【請求項 178】

抗体が³H、¹¹C、¹⁴C、¹⁸F、³²P、³⁵S、⁶⁴Cu、⁶⁸Ga、⁸⁶Y、⁹⁹Tc、¹¹¹In、¹²³I、¹²⁴I、¹²⁵I、¹³¹I、¹³³Xe、¹⁷⁷Lu、²¹¹Atおよび²¹³Biから選択される放射性核種検出標識に共有結合して付着される、請求項 174 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 179】

抗体がキレートリガンドによって検出標識に共有結合して付着される、請求項 178 に記載のシステイン改変抗体。

【請求項 180】

キレートリガンドがDOTA、DOTP、DOTMA、DTPAおよびTETAから選択される、請求項 179 に記載のシステイン改変抗体。

30

【請求項 181】

リンカーが抗体上のチオール基によって抗体に付着される、請求項 93 に記載のイムノコンジュゲート。

【請求項 182】

アルブミン結合ペプチドを含む請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 183】

アルブミン結合ペプチドが配列番号：42 から 46 の中から選択される、請求項 182 に記載の抗体。

【請求項 184】

アルブミン結合ペプチドを含む請求項 23 に記載の抗体。

40

【請求項 185】

アルブミン結合ペプチドが配列番号：42 から 46 の中から選択される、請求項 184 に記載の抗体。

【請求項 186】

抗体がさらに、カバット番号付け慣例法による軽鎖の15、43、110、144、168 および205、及びEU番号付け慣例法による重鎖の41、88、115、118、120、171、172、282、375 および400 から選択される一又は複数の位置にシステインを含む、請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 187】

50

(14)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

システインが軽鎖の位置 205 にある、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 188】

システインが重鎖の位置 118 にある、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 189】

システインが重鎖の位置 400 にある、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 190】

抗体が、モノクローナル抗体、二重特異性抗体、キメラ抗体、ヒト抗体およびヒト化抗体から選択される、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 191】

抗体断片である、請求項 186 に記載の抗体。

10

【請求項 192】

抗体断片が Fab 断片である、請求項 191 に記載の抗体。

【請求項 193】

キメラ抗体、ヒト抗体又はヒト化抗体から選択される、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 194】

細菌内で産生される、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 195】

CHO 細胞内で産生される、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 196】

CD22 タンパク質を含むことが予測される試料中の CD22 タンパク質の存在を決定する方法であって、請求項 186 に記載の抗体に該試料を曝し、該試料中の該 CD22 タンパク質への該抗体の結合を決定することを含み、このとき該タンパク質に抗体が結合した場合に該試料中の該タンパク質の存在が示される方法。

20

【請求項 197】

前記試料が、前記 CD22 タンパク質を発現することが予測される細胞を含む、請求項 196 に記載の方法。

【請求項 198】

前記細胞が B 細胞である、請求項 196 に記載の方法。

【請求項 199】

抗体が、蛍光色素、放射性同位体、ビオチン又は金属-複合体形成リガンドから選択される標識に共有結合して付着される、請求項 196 に記載の方法。

30

【請求項 200】

請求項 186 に記載の抗 CD22 抗体と薬学的に許容可能な希釈液、担体又は賦形剤を含有してなる製薬的製剤。


【請求項 201】

抗体が、アウリスタチンないしはメイタンシノイドの薬剤成分に共有結合して付着され、その結果抗体薬剤コンジュゲートが形成される、請求項 186 に記載の抗体。

【請求項 202】

抗体 (Ab) とアウリスタチン又はメイタンシノイドの薬剤成分 (D) とを含んでなり、このとき該システイン改変抗体はリンカー成分 (L) によって一又は複数の遊離したシステインアミノ酸を介して D に付着しており、該化合物は以下の式 I を有し、

40



I

p が 1、2、3 又は 4 である、
請求項 201 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート。

【請求項 203】

p が 2 である、請求項 201 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

【請求項 204】

50

(15)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

L が、以下の式を有し、



ここで、

A はシステイン改変抗体 (A b) のシステインチオールに共有結合して付着されるストレッチャーユニットであり、

10

a は 0 又は 1 であり、

各々の W はそれぞれアミノ酸ユニットであり、


w は 0 から 12 まで変動する整数であり、

Y は薬剤成分に共有結合して付着されるスペーサーユニットであり、そして、y は 0、1 又は 2 である、

請求項 201 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

【請求項 205】

以下の式を有し、



20

このとき P A B がパラ-アミノベンジルカルバモイルであり、 R^{17} が、 $(CH_2)_r$ 、 $C_3 - C_8$ カルボサイクリル、 $O - (CH_2)_r$ 、アリーレン、 $(CH_2)_r$ - アリーレン、-アリーレン - $(CH_2)_r$ -、 $(CH_2)_r$ - $(C_3 - C_8$ カルボサイクリル)、 $(C_3 - C_8$ カルボサイクリル) - $(CH_2)_r$ 、 $C_3 - C_8$ ヘテロサイクリル、 $(CH_2)_r$ - $(C_3 - C_8$ ヘテロサイクリル)、- $(C_3 - C_8$ ヘテロサイクリル) - $(CH_2)_r$ -、- $(CH_2)_r$ $C(O)NR^b$ $(CH_2)_r$ -、- $(CH_2CH_2O)_r$ -、- $(CH_2CH_2O)_r$ - CH_2 -、- $(CH_2)_r$ $C(O)NR^b$ $(CH_2CH_2O)_r$ -、- $(CH_2)_r$ $C(O)NR^b$ $(CH_2CH_2O)_r$ - CH_2 -、- $(CH_2CH_2O)_r$ $C(O)NR^b$ $(CH_2CH_2O)_r$ - CH_2 -、及び - $(CH_2CH_2O)_r$ $C(O)NR^b$ $(CH_2)_r$ - から選択される二価のラジカルであり、 R^b が H、 $C_1 - C_6$ アルキル、フェニル又はベンジルであり、そして、r はそれぞれ 1 から 10 まで変動する整数である、請求項 204 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

30

【請求項 206】

W_w がバリン - シトルリンである、請求項 204 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

40

【請求項 207】


R^{17} が $(CH_2)_5$ 又は $(CH_2)_2$ である、請求項 204 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

【請求項 208】

以下の式を有する、請求項 204 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

(16)

J P 2009-538629 A 2009.11.12




【請求項 209】

R^{17} が $(CH_2)_5$ 又は $(CH_2)_2$ である、請求項 208 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

10

【請求項 210】

以下の式を有する、請求項 204 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。




20

【請求項 211】

L が S M C C、S P P 又は B M P E O である、請求項 202 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

【請求項 212】

D が以下の構造を有する M M A E であり、




30

ここで波線はリンカー L への付着部位を示す、請求項 202 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

【請求項 213】

D が以下の構造を有する M M A F であり、



40

ここで波線はリンカー L への付着部位を示す、請求項 202 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。


50

(17)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

【請求項 2 1 4】

D が以下の構造を有する D M 1 であり、



10

ここで波線はリンカー L への付着部位を示す、請求項 2 0 2 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

20

【請求項 2 1 5】

親抗 C D 2 2 抗体が、モノクローナル抗体、二重特異性抗体、キメラ抗体、ヒト抗体、ヒト化抗体および抗体断片から選択される、請求項 2 0 1 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。


【請求項 2 1 6】

抗体断片が F a b 断片である、請求項 2 0 1 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物。


【請求項 2 1 7】

以下の構造から選択される抗体-薬剤コンジュゲート化合物であって、

30



Ab-MC-vc-PAB-MMAF




Ab-MC-vc-PAB-MMAE

40


(18)

J P 2009- 538629 A 2009. 11. 12




Ab-MC-MMAE

10



Ab-MC-MMAF

20



Ab-BMPEO-DM1

30

このとき V a l はバリンであり、C i t はシトルリンであり、p は 1、2、3 又は 4 であり、そして A b は請求項 1 8 6 に記載の抗 C D 2 2 抗体である、抗体-薬剤コンジュゲート化合物。

40

【請求項 2 1 8】

アウリスタチンが M M A E 又は M M A F である、請求項 2 0 1 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート。

【請求項 2 1 9】

L が M C - v a l - c i t - P A B 又は M C である、請求項 2 0 2 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート。

【請求項 2 2 0】

B 細胞を検出するためのアッセイであって、

- (a) 細胞を請求項 1 9 9 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物にさらし、そして、
- (b) 細胞への抗体-薬剤コンジュゲート化合物の結合の程度を決定する

50

(19)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

ことを含むアッセイ。

【請求項 2 2 1】

細胞培養物培地中の哺乳類の癌性 B 細胞を請求項 2 0 1 に記載の抗体-薬剤コンジュゲート化合物によって処置することを含み、それによって癌性 B 細胞の増殖が抑制される、細胞の増殖を抑制する方法。

【請求項 2 2 2】

請求項 2 0 1 に記載の抗体-薬剤コンジュゲートと薬学的に許容可能な希釈液、担体又は賦形剤を含有してなる製薬的製剤。

【請求項 2 2 3】

患者に請求項 2 2 2 に記載の製薬的製剤を投与することを含む、癌の治療方法。

10

【請求項 2 2 4】

癌が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(NHL)、中悪性度NHL、再発性中悪性度NHL、再発性低悪性度NHL、抵抗性NHL、抵抗性低悪性度NHL、慢性リンパ球性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(HCL)、急性リンパ球性白血病(ALL)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 2 2 3 に記載の方法。

【請求項 2 2 5】

患者に、抗体-薬剤コンジュゲート化合物と組み合わせた細胞障害性剤が投与される、請求項 2 2 3 に記載の方法。

【請求項 2 2 6】

20

請求項 2 2 0 に記載の製薬的製剤と、
容器と、

C D 2 2 ポリペプチドの過剰発現に特徴がある癌を治療するために化合物が用いられうることを示しているパッケージ挿入物又はラベルとを具備する製造品。

【請求項 2 2 7】

癌が、リンパ腫、非ホジキンリンパ腫(NHL)、中悪性度NHL、再発性中悪性度NHL、再発性低悪性度NHL、抵抗性NHL、抵抗性低悪性度NHL、慢性リンパ球性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫、白血病、線毛細胞白血病(HCL)、急性リンパ球性白血病(ALL)およびマントル細胞リンパ腫から選択される、請求項 2 2 6 に記載の製造品。

30

【請求項 2 2 8】

抗体-薬剤コンジュゲート化合物の作製方法であって、請求項 1 8 6 に記載の抗 C D 2 2 抗体(Ab)とアウリスタチン又はメイタンシノイドの薬剤成分(D)とを含んでなり、このとき抗体はリンカー成分(L)によって一又は複数の改変したシステインアミノ酸を介してDに付着しており、該化合物は以下の式Iを有し、



このとき p は 1、2、3 又は 4 であり、

40

(a) 抗体の改変したシステイン基をリンカー試薬と反応させて、抗体-リンカー中間生成物 Ab-L を形成させる工程と、

(b) Ab-L を活性化された薬剤成分 D と反応させ、それによって抗体-薬剤コンジュゲートが形成される工程

を含んでなるか、

または、

(c) 薬剤成分の求核基をリンカー試薬と反応させて、薬剤-リンカー中間生成物 D-L を形成する工程と、

(d) D-L を抗体の改変されたシステイン基と反応させて、それによって抗体-薬剤コンジュゲートが形成される工程

50

(20)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

を含んでなる方法。

【請求項 2 2 9】

さらに、チャイニーズハムスター 卵巣 (C H O) 細胞において抗体を発現させる工程を含んでなる、請求項 2 2 8 に記載の方法。

【請求項 2 3 0】

さらに、発現された抗体を還元剤にて処理する工程を含んでなる、請求項 2 2 9 に記載の方法。

【請求項 2 3 1】

還元剤が T C E P および D T T から選択される、請求項 2 3 0 に記載の方法。

【請求項 2 3 2】

さらに、還元剤にて処理した後に、発現された抗体を酸化剤で処理する工程を含んでなる、請求項 2 3 0 に記載の方法。

【請求項 2 3 3】

酸化剤が、硫酸銅、デヒドロアスコルビン酸および空気から選択される、請求項 2 3 2 に記載の方法。

【請求項 2 3 4】

抗体が、配列番号：8 8、9 2 又は 9 3 のいずれか一から選択される重鎖配列を含む、請求項 1 8 6 に記載の抗体。

【請求項 2 3 5】

抗体が配列番号：8 7 又は 9 1 から選択される軽鎖配列を含む、請求項 1 8 6 に記載の抗体。

【請求項 2 3 6】

抗体が、配列番号：8 7 の軽鎖配列と配列番号：9 2 の重鎖配列を含む、請求項 1 8 6 に記載の抗体。

【請求項 2 3 7】

抗体が、配列番号：8 7 の軽鎖配列と配列番号：9 3 の重鎖配列を含む、請求項 1 8 6 に記載の抗体。

【請求項 2 3 8】

抗体が、配列番号：9 1 の軽鎖配列と配列番号：8 8 の重鎖配列を含む、請求項 1 8 6 に記載の抗体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

これは、米国特許法規則 1 . 5 3 (b) (1) に基づき出願した非仮出願であり、米国特許法 1 1 9 条 (e) に基づき、2 0 0 6 年 5 月 3 0 日に出願の米国仮特許出願第 6 0 / 8 0 9 3 2 8 号、2 0 0 7 年 3 月 2 9 日出願の米国仮特許出願第 6 0 / 9 0 8 9 4 1 号、及び 2 0 0 7 年 4 月 1 3 日出願の米国仮特許出願第 6 0 / 9 1 1 8 2 9 号の優先権を主張するものであり、その全体の開示内容が出典明記により本明細書に援用される。

本発明は抗 C D 2 2 抗体およびそのイムノコンジュゲートに関する。本発明はさらに、抗 C D 2 2 抗体およびそのイムノコンジュゲートを使用する方法に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

リンパ球は、造血過程の間に骨髄において生産される多種ある白血球のうちの 1 つである。リンパ球の 2 つの主な分類は、B リンパ球 (B 細胞) と T リンパ球 (T 細胞) である。ここで特に対象とするリンパ球は B 細胞である。

B 細胞は骨髄内で成熟して、その細胞表面上に抗原結合抗体を発現する骨髄を放出する。ナイーブ B 細胞がその膜結合性抗体に特異的な抗原と初めて遭遇すると、細胞は速やかに分化し、その子孫はメモリー B 細胞と「プラズマ細胞 (形質細胞、plasma cell) 」と呼ばれるエフェクター細胞に分化する。メモリー B 細胞は長い寿命を持ち、本来の親細胞と同じ特異性を有する膜結合性抗体を発現し続ける。プラズマ細胞は、膜結合性抗体を発現

10

20

30

40

50

(21)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

する代わりに、分泌型抗体を産生する。分泌された抗体は、体液性免疫の主要なエフェクター分子である。

【 0 0 0 3 】

B細胞関連の疾患には、悪性のリンパ腫(非ホジキンリンパ腫、NHL)、多発性骨髄腫、及び慢性リンパ球性白血病(CLL、B細胞白血病(CD5+Bリンパ球))が含まれるが、これらに限定されるものではない。主にBリンパ球から生じる癌の異種のグループである非ホジキンリンパ腫(NHL)は、すべての新しく診断された癌のおよそ4%を占める(Jemal, A.等, CA-Cancer J Clin, 52: 23-47, (2002))。中悪性度NHLは、成人NHLのおよそ30~40%をしめており(Harris, N.L.等, Hematol. J. 1: 53-66 (2001))、びまん性大B細胞リンパ腫(DLBCL)、マントル細胞リンパ腫(MCL)、末梢性T細胞リンパ腫、および未分化大細胞リンパ腫が含まれる。最前線の組合せ化学療法により、中悪性度NHL患者の半分未満が治癒し、ほとんどの患者は結局この疾患により死亡する(Fisher, R.I. Semin. Oncol. 27(suppl 12): 2-8 (2000))。

10

また、B細胞関連の疾患には自己免疫性疾患が含まれる。自己免疫性疾患は以前としてヒトの臨床的に重要な疾患である。その名の通り、自己免疫性疾患は身体自体の免疫系により作用する。病理学的メカニズムは自己免疫性疾患の個々の種類で異なるが、ある一般的なメカニズムは、身体の内因性タンパク質に対する特定の抗体(本明細書中では自己反応性抗体又は自己抗体と称する)の結合を伴う。医師および科学者は、関節リウマチ、多発性硬化症、血管炎、免疫媒介性の糖尿病、及び全身性エリテマトーデスなどの狼瘡を含む70以上の臨床的に異なった自己免疫性疾患を同定している。多くの自己免疫性疾患は、全部で200000足らずの個体に罹患しているほど稀であるが、これらの疾患は何百万ものアメリカ人、つまり集団の約5パーセントを苦しめており、多くの疾患は女性に偏って発症している。これらの疾患は長引くため、社会的及び財政的に莫大な負担が生じる。

20

【 0 0 0 4 】

B細胞表面抗原を標的とする細胞障害性剤はB細胞関連の癌治療の重要な焦点である。あるB細胞表面抗原はCD20である。キメラ(マウス/ヒト)抗CD20モノクローナル抗体であるリツキシマブ(リツキサン; Genentech, Inc. (South San Francisco, CA)およびIDEC Pharmaceutical Corp. (San Diego, CA))は、再発性又は抵抗性の軽度又は濾胞性NHL(Leonard, J.P.等, Clin. Canc. Res. 10: 5327-5334 (2004))の治療のために米国食品医薬品局の承認を得た第一治療抗体であった。

30

他のB細胞抗原、例としてCD19、CD22およびCD52は、リンパ腫の治療となりうる治療の標的を表す(Grillo-Lopez A.J.等, Curr Pharm Biotechnol, 2: 301-11, (2001))。CD22は、分化の成熟した段階のみにB細胞表面に発現される135kDaのB細胞に限定されるシアロ糖タンパク質である(Dorken, B.等, J. Immunol. 136: 4470-4479 (1986))。ヒトのCD22の主な形態は、細胞外ドメインに7つのイムノグロブリンスーパーファミリドメインを含むCD22βである(図1)(Wilson, G.L.等, J. Exp. Med. 173: 137-146 (1991))。変異形態であるCD22αは、イムノグロブリンスーパーファミリドメイン3および4を欠いている(Stamenkovic, I. and Seed, B., Nature 345: 74-77 (1990))。ヒトのCD22に対するリガンド結合は、イムノグロブリンスーパーファミリドメイン1および2(エピトープ1および2とも称する)と関係していることが示されている(Engel, P.等, J. Exp. Med. 181: 1581-1586, 1995)。

40

【 0 0 0 5 】

B細胞NHLにおいて、CD22発現は、中悪性度及び低悪性度の集団ではそれぞれ91%から99%まで変動する(Cesano, A.等, Blood 100: 350a (2002))。CD22は、B細胞活性化複合体の構成成分として(Sato, S.等, Semin. Immunol. 10: 287-296 (1998))、そして、接着分子として機能しうる(Engel, P.等, J. Immunol. 150: 4719-4732 (1993))。CD22欠損マウスのB細胞は寿命がより短く、アポトーシスを亢進することから、B細胞生存におけるこの抗原の重要な役割が示唆される(Otipoby, K.L.等, Nature (Lond) 384: 634-637 (1996))。その天然のリガンド(一又は複数)又は抗体との結合の後、CD

50

(22)

J P 2009-538629 A 2009.11.12

22は急速に内部移行され、原発性B細胞の強力な共刺激シグナルと腫瘍性B細胞のプロアポトーシスシグナルを生じさせる(Sato, S.等, *Immunity* 5:551-562 (1996))。

抗CD22抗体は、B細胞癌や他のB細胞増殖性疾患のための可能性のある治療方法として研究されている。このような抗CD22抗体には、RFB4(Mansfield, E.等, *Blood* 90:2020-2026 (1997))、CMC-544(DiJoseph, J.F., *Blood* 103:1807-1814 (2004))およびLL2(Pawlak-Byczkowska, E.J.等, *Cancer Res.* 49:4568-4577 (1989))が含まれる。LL2抗体(以前はHPB-2と呼ばれる)は、CD22抗原に対するIgG2aマウスモノクローナル抗体である(Pawlak-Byczkowska, E.J.等 (1989), *supra*)。インビトロ免疫組織学的な評価により、LL2抗体が51の試験したB細胞NHL試料のうちの50と反応するが、他の悪性腫瘍又は正常な非リンパ腫組織とは反応しないことが示された

10

【0006】

細胞障害性又は細胞分裂停止性の薬剤、つまり、癌の治療において腫瘍細胞を殺す又は阻害するための薬剤の局所運搬のために抗体-薬剤コンジュゲートを使う(Syrigos and Epenetos (1999) *Anticancer Research* 19:605-614; Niculescu-Duvaz and Springer (1997) *Adv. Drg Del. Rev.* 26:151-172; 米国特許第4975278号)と、薬剤成分を腫瘍へ目的通りに運搬して、そこで細胞内蓄積させることが可能となる。コンジュゲートさせていない薬剤を全身投与すると、排除しようとする腫瘍細胞だけでなく正常な細胞に許容されないレベルの毒性が生じうる(Baldwin等, (1986) *Lancet* pp. (Mar. 15, 1986): 603-05; Thorpe, (1985) "Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review," in *Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications*, A. Pinchera等 (ed.s), pp. 475-506)。したがって、毒性を最小限にした最大限の有効性が追求される。ポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体はこれらの計画に有用であることが報告されている(Rowland等, (1986) *Cancer Immunol. Immunother.*, 21:183-87)。これらの方法に用いる薬剤には、ダウノマイシン、ドキソルピシン、メトトレキサートおよびビンデシンが含まれる(Rowland等, *Cancer Immunol. Immunother.* 21:183-87 (1986))。抗体-毒素コンジュゲートに用いる毒素には、ジフテリア毒素などの細菌性毒素、リシンなどの植物毒、ゲルダナマイシン(Kerr等 (1997) *Bioconjugate Chem* 8(6): 781-784; Mandler等 (2000) *Journal of the Nat. Cancer Inst.* 92(19): 1573-1581; Mandler等 (2000) *Bioorganic & Med. Chem Letters* 10:1025-1028; Mandler等 (2002) *Bioconjugate Chem* 13:786-791)、メイタンシノイド(欧州特許第1391213号; Liu等, (1996) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 93:8618-8623)、及びカリケアマイシン(Lode等, (1998) *Cancer Res.* 58:2928; Hinman等, (1993) *Cancer Res.* 53:3336-3342)などの小分子毒素が含まれる。該毒素は、チューブリン結合、DNA結合又はトポイソメラーゼ阻害などの機能によりその細胞障害性及び細胞分裂停止性の効果に影響しうる(Meyer, D.L. and Senter, P.D. "Recent Advances in Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy" in *Annual Reports in Medicinal Chemistry*, Vol 38 (2003) Chapter 23, 229-237)。ある種の細胞障害性剤は、大きな抗体又はタンパク質レセプターリガンドにコンジュゲートした場合に、不活性又は活性が低減する傾向がある。

20

30

【0007】

ゼバリン(ZEVALINTM)(イブリツモマブチウキセタン(ibritumomab tiuxetan), Biogen/Idec)は正常及び悪性のBリンパ球の細胞表面上にみられるCD20抗原に対するマウスIgG1κモノクローナル抗体と¹¹¹In又は⁹⁰Y放射性同位体とがチオウレアリンカーキレート剤にて結合した抗体-放射性同位体コンジュゲートである(Wseman等, (2000) *Eur. Jour. Nucl. Med.* 27(7):766-77; Wseman等, (2002) *Blood* 99(12):4336-42; Wtzig等, (2002) *J. Clin. Oncol.* 20(10):2453-63; Wtzig等, (2002) *J. Clin. Oncol.* 20(15):3262-69)。ゼバリンはB細胞非ホジキンリンパ球(NHL)に対して活性を有するが、投与によってほとんどの患者に重症かつ長期の血球減少を引き起こす。カリケアマイシンに連結したhuCD33抗体からなる抗体薬剤コンジュゲートであるマイロターゲットM(MLOTARG)(登録商標)(ゲムツズマブオゾガミシン(gemtuzumab ozogamicin), Wyeth Phar

40

50